

抗血小板薬・抗凝固薬（抗血小板作用を有する薬剤を含む）の手術前休薬期間の目安

※ 現在薬価収載されている薬の一覧です。当院採用薬以外の薬も記載してい

長崎百合野病院 薬局

2024年4月10日改訂

|                       | 品 名                                                  | 半 減 期               | 手術前休薬日数             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 抗<br>血<br>小<br>板<br>薬 | アスピリン                                                | 0.4hr               | 7日前                 |
|                       | アンプラーグ錠50mg・100mg<br>後発品：サルボグレラート塩酸塩                 | 0.7hr               | 1日前                 |
|                       | エパデールcap300mg・S300mg・S600mg・S900mg<br>後発品：イコサペント酸エチル | —                   | 7日前                 |
|                       | エフィエント錠2.5mg・3.75mg・5mg・20mg                         | 0.9±0.4hr           | 14日前                |
|                       | オパルモン錠5μg<br>後発品：リマプロストアルファデクス                       | 0.8hr               | 1日前                 |
|                       | ケアロードLA錠60μg<br>ベラサスLA錠60μg<br>(プロサイリン、ドルナーの徐放剤)     | 3.9±1.1hr           | 1日前                 |
|                       | バイアスピリン錠100mg<br>後発品、アスピリン腸溶錠                        | 0.4hr               | 7日前                 |
|                       | パナルジン錠100mg・細粒10%<br>後発品：チクロピジン塩酸塩                   | 1.6hr               | 7日前<br>(大手術10～14日前) |
|                       | バスサミン配合錠A81mg(バファリンの後発)<br>他後発品：ニトギス、ファモター           | 0.4hr               | 7日前                 |
|                       | プラビックス錠25mg・75mg<br>後発品：クロピドグレル                      | 6.9±0.9hr           | 14日前                |
|                       | ブリリント錠60mg・90mg                                      | 8.7hr               | 5日以上前               |
|                       | プレタールOD錠50mg・100mg・散20%<br>後発品：シロスタゾール               | α相：2.2hr<br>β相：18hr | 3日前                 |
|                       | プロサイリン錠20μg<br>ドルナー錠20μg<br>後発品：ベラプロストNa             | 1.1hr               | 1日前                 |
|                       | ペルサンチン錠12.5mg・25mg・100mg<br>後発品：ジピリダモール              | 1.7hr               | 1～2日前               |
|                       | キャブピリン配合錠<br>(アスピリン100mg + タケキャブ10mg)                | 0.4±0.1hr           | 7日前                 |
|                       | コンプラビン配合錠 (プラビックス75mg+アスピリン100mg)<br>後発品：ロレアス        | —                   | 14日前                |
|                       | タケルダ配合錠<br>(アスピリン100mg+ランソプラゾール15mg)                 | 0.5±0.2hr           | 7日前                 |