

消毒薬・吸入薬・生理食塩水等の開封後の使用期限

○安全に使用するためのポイント

- ①開封日時を容器に記載する。
- ②薬液中に異物の混入や異常を認めた際はその時点で廃棄する。
- ③直射日光や高温を避けて適切な温度で保管する。
- ④容器の口や蓋の内側に手指が触れないよう取り扱う。触れた場合は廃棄する。
- ⑤薬液を注ぐ時の水の跳ね返りが薬液の中に混入しない様注意する。

分類	区分	採用薬品名	開封後の期限
消毒剤	中水準	テキサント6%	3か月
		擦式手指消毒剤（ウエルセプト等）	6か月
		消毒用エタノールメン（エレファコットン）	4日間（開封日含）
		ポピドンヨード外用液10%	6か月
		ポピドンヨードスクラブ液7.5%	6か月
		ハイポアルコール	6か月
		マスキンR・エタノール液0.5w/v%	6か月
	低水準	オラネジン消毒液1.5%	24時間
		ヒビスクラブ消毒液4%	3か月
		マスキン液5w/v%	3か月
		マスキン水0.5w/v%	3か月
吸入剤		喘息発作吸入セット等	1週間冷所
市販製剤		生理食塩水（細口）	24時間
		注射用水（細口）	24時間
		精製水	24時間