

肺血栓塞栓予防策

弾性包帯使用の適応とその巻き方について

○弾性包帯使用の適応

弾性ストッキング装着の適応であるが、下記の状態がある場合は、弾性ストッキングを装着せず、弾性包帯で代替する。

- 下肢の太さ、長さが、弾性ストッキングの規格に合わない患者
- 下肢変形が強い場合
- 下肢浮腫が強い場合

○弾性包帯の巻き方

準備：弾性包帯（エラスコット）

皮膚が弱い患者には、保湿クリームを十分塗り、弾性包帯を巻く

圧迫圧：足関節部16～20mmHg ふくらはぎ部12mmHg

★適切な圧で巻くには練習が必要。

患者さんに巻く前に、足関節部に圧力計をあてて、圧を確認しながら練習する。
（圧力計は東2階病棟管理です）

- ①足先から環行帯で巻き始める
- ②包帯が2/3ずつ重なるように、螺旋帯で巻く
- ③足関節部にきたら足関節を90度に保ち、足関節部は麦穂帯で巻く
（足関節部はゆるみやすいので）
- ④下腿は螺旋帯にて、膝下2cmまで巻き上げる
- ⑤巻き終わりは、環行帯、巻き返しをしない

○弾性包帯観察の注意点

- ①包帯のゆるみがないか
- ②包帯のしわがないか
- ③痺れ、痛みが生じていないか
- ④皮膚色、爪に色に異常はないか

包帯の緩み防止のため、巻き直す時間を10時20時と決めているが、この時間以外でも、左記の異常を認めた場合は、速やかに包帯の巻き直しを行う。