

臀部の表皮剥離やびらん、もしくは下痢が続く時の処置の方法

●下痢の原因を突き止め、排便コントロールを行う

●薬剤を使用時の処置（医師に薬剤の処方を依頼する）

油分が強く、撥水効果があり、パウダーがびらん部に付着して湿潤環境が保てる以下の薬剤を用いて処置を行う。

① 下痢便が1日3回以下の時


アズノールパウダー（アズノール軟膏とアダプトストーマパウダーを7:3で混ぜた物）

② 下痢便が1日4回以上の時

亜鉛華軟膏パウダー（亜鉛華軟膏とアダプトストーマパウダーを7:3で混ぜた物）

1)アズノールパウダーの処置の方法 傷があるところに厚めに1日1回から2回塗布する。

2)亜鉛華軟膏パウダーの処置の方法



①亜鉛華軟膏を右写真のように、皮膚びらん部が見えなくなるくらいに塗布する。

②オムツ交換のたびに臀部をチェックし、軟膏が薄くなっているようであれば、重ねて軟膏を塗布する。

③便が、軟膏についている場合は、特に目立つところだけをつまむようにしてとり除く。取れない場合は無理にとらない。軟膏部分が薄くなっているところに重ねて軟膏を塗布するにとどめる。

④軟膏を取り除き、すべてを塗りなおすのは、1日1回の陰部ケアのときのみとする。陰部ケア時の処置の方法は以下の通り。

亜鉛華軟膏処置実施中の陰部ケアについて

準備	陰部洗浄のための微温湯、ハイゼガーゼ、手袋、ゴミ袋、サニーナ、ビオレ、亜鉛華軟膏パウダー
手順	亜鉛華軟膏パウダーは水分でははがれにくいので、水分は使用しない。サニーナを使用し除去する。サニーナを、ハイゼガーゼに含ませて、やさしく拭き取っていく。
	軟膏が全て拭き取れたら、ビオレをよく泡立てて、陰部肛門周囲を、やさしく泡洗浄し、微温湯で洗い流す（微温湯を使用するのはこのとき1回/日のみ）
	乾いたハイゼガーゼ等で水分を拭き取り、亜鉛華軟膏パウダーを上記写真のように塗布する



ケアのポイント

蒸しタオルや微温湯の使用は、皮膚のバリア機能を低下、もしくは、失わせてしまうので、陰部ケア時の1日1回のみとします。陰部ケア時以外に、便汚染等で、ケアが必要な時は、冷ましたタオルや冷ました微温湯を使用するか、又は、サニーナを使用してケアを行いましょう。