

当院採用インスリンの作用時間、最大作用発現時間、作用持続時間

分類	インスリン製剤		作用発現時間	最大作用時間	作用持続時間
超速効型	インスリンアスパルトBS注ソロスター		10～20分	1～3時間	3～5時間
速効型	ノボリンR注フレックスペン		30分	1～3時間	8時間
	ヒューマリンR注 1000単位/10mlバイアル		30分～1時間		5～7時間
中間型	ノボリンN注フレックスペン	懸濁液 使用前に 攪拌	1.5時間	4～12時間	24時間
	ヒューマリンN注 1000単位/10mlバイアル		1～3時間	8～10時間	18～24時間
混合型	超速効型＋中間型 ノボラピット30ミックス注フレックスペン		10～20分	1～4時間	24時間
	超速効型＋中間型 ノボラピット50ミックス注フレックスペン				
	速効型＋中間型 ノボリン30R注フレックスペン		30分	2～8時間	24時間
配合溶解	超速効型＋持効型 ライゾデク配合注フレックスタッチ		10～20分	1～3時間	>42時間
持効型	インスリングラルギンBS注ミリオペン		1～2時間	明らかな ピークなし	24時間
	トレシーバ注フレックスタッチ		該当なし（定常状態） 定常状態で作用持続		>42時間