

	品 名	半 減 期	手術前休薬日数
抗凝固薬	イグザレルト錠・細粒 10mg・15mg 後発品：リバーロキサバン	5－13hr	1 日前
	エリキュース錠2.5mg・5mg	6－8hr	1－2 日前
	プラザキサcap75mg・110mg	約12hr	1 日前 (大手術2日以上前)
	リクシアナ錠15mg・30mg・60mg	4.9hr	1 日前
	ワーファリン錠0.5mg・1mg・5mg・顆粒0.2% ワルファリンK錠0.5mg・1mg・2mg・細粒0.2%	36hr	4－5 日前
抗血小板作用を有する薬剤	ケタスcap10mg	12hr	3 日前
	コメリアンコーワ錠50mg・100mg 後発品：ジラゼプ塩酸塩	4hr	2－3 日前
	セロクラール錠10mg・20mg 後発品：イフェンプロジル酒石酸塩	1.4hr	1－2 日前
	ロトリガ粒状カプセル2g 後発品：オメガ-3脂肪酸エチル	—	7 日前
	ロコルナール錠50mg・100mg 後発品：トラピジル	6hr	2－3 日前

ヘパリンの術前投与マニュアル

指示確認

抗血栓薬の中止指示、ヘパリン置換の有無の指示確認を行う。

ヘパリン置換

ヘパリン置換を行う場合、抗血栓薬中止翌日の午前9時より24時間持続静注を行なう。

ヘパリンNa注5千単位 2V + 生食500ml

下記のタイミングでAPTTを測定し、APTTが55-80秒程度になるよう、ヘパリンの投与量を調節する。
APTTが短い場合は目安としてヘパリン5千単位を次回投与分より追加する。

【APTT測定タイミングの目安】

①ヘパリン置換翌日 ②ヘパリン増減の翌日 ③手術前日

手術当日

手術4-6時間前にヘパリンを中止。(中止時間を具体的に指示すること)

術後

術後数日以内に抗血栓薬を開始し、必要であればヘパリンの併用を行なう。