

血管外漏出時の予防策と注意すべき薬剤



予 防 策

- ① 脆弱な血管や環流の悪い血管は避ける。
- ② 手背、手関節部、肘窩などの関節部、腱や神経が存在する部位はできるだけ避ける。
- ③ 抗癌剤等、危険性が高いものは医師が直接行う。
- ④ 刺入部の観察が容易にできるよう固定を工夫する。
- ⑤ 点滴中は、できるだけ安静を保てるよう配慮する。
- ⑥ ポンプ使用中は、特に、刺入部観察を頻回に行う。
- ⑦ 造影CT・MRI検査時は、

造影剤の入ったシリンジに圧をかけて急速に血管に注入するので、**針は22G以上を選択する**。
生食ロックにて22G針で留置してあるルートを使用する場合は、検査前に、病棟で生理食塩液100mlをつなぎ、滴下させてみて、漏れがないのを確認してから検査におろす。

血管外漏出について注意すべき注射剤

① 抗癌剤全般	現在、当院では採用薬なし
② 造影剤全般	オムニパーク ウログラフィン ビリスコピン 等
③ 血管収縮薬	アドレナリン注、ボスミン注、エホチール注、ノルアドレナリン注、ドパミン塩酸塩注
④ 強アルカリ性製剤	アレビアチン注、タケブロン静注用、ゾビラックス点滴静注用、カンレノ酸カリウム静注用、フロセミド注、ダントリウム静注用、ネオフィリン注、フェジン静注、メイロン静注、イソゾール注射用、プロスタルモンF注射液、スルバシリン静注用
⑤ 補正用の電解質で濃いもの	アスパラカリウム注、KCL注、カルチコール注射液
⑤ 高浸透圧薬	アミノレバン点滴静注用、アレビアチン注、グリセオール注、50%ブドウ糖液、ビーフリード輸液、メイロン静注、マンニトール注射液、ホリゾン注射液
⑥ その他	アタラックスP注射液、注射用フサン、ナファモスタット注、ディプリバン注、プロポフォール注、ドブトレックス注射液、バンコマイシン注