

抗癌剤の取扱い（注射の場合）

調剤は全て薬局内のクリーンベンチで、薬剤師が行なう

- ①薬局から届いた薬剤の取扱いは、全て手袋を装着し実施する。
- ②点滴終了後は、輸液セットが接続された状態でハザードボックスへ廃棄する。
- ③抗癌剤投与後４８時間以内に患者の排泄物を取り扱うときには、二重の手袋、ガウン、必要に応じ保護メガネなどを着用する。排泄物は水洗時、蓋を閉めて二度水を流す。
- ④抗癌剤投与後４８時間以内に汚染したリネンを取り扱うときには、二重の手袋、ガウン、必要に応じて保護メガネ等を着用し、二重のビニール袋にいれ、他のものと分けて洗濯する。

抗癌剤の被爆や汚染の処理

- ・皮膚に付着したときは直ちに十分量の流水で洗いその後石鹸を用いて洗う。
- ・目に入ったときは直ちに水中に顔をつけて、瞬きを繰り返し行なうか、流水で１５分以上洗い流す。その後眼科を受診する。
- ・衣服に付着した時は、直ちにゴム手袋を着用して付着部位を流水で洗い更に洗剤で洗う。高度に汚染した場合は他の物と一緒に洗濯しない。
- ・床や作業台等が汚染した場合は、ゴム手袋を着用し、汚染箇所を吸水マットでふき取り、薬液周辺からペーパータオルなどで拭いて処理する。

抗癌剤の取り扱いと、抗癌剤曝露時や汚染時の処理

薬剤の調剤は、全て薬局内のクリーンベンチで、薬剤師が実施する。

- ① 薬剤の取扱いは 全て手袋を装着し、目の高さより低い位置（目への飛散防止）で取り扱う。
- ② 点滴終了後は セットが接続された状態でハザードボックスへ廃棄する。
- ③ 投与後24時間以内に

患者の排泄物を
取り扱うときは

二重の手袋・ガウン・必要に応じて保護メガネ等を着用し、
排泄物の水洗時は、蓋を閉めて2度水を流す。

汚染したリネン類を
取り扱うときは

二重の手袋・ガウン・必要に応じて保護メガネ等を着用し、
二重のビニール袋に入れ、他の物とは分けて洗濯する。

抗癌剤の曝露や汚染の処理

皮膚に付着した
時

直ちに十分な量の流水で洗い、その後石鹸を用いて洗う。

目に入った時

水中に顔をつけて、瞬きを繰り返し行うか、流水で15分以上
洗い流す。その後、眼科を受診する。

衣服に付着した
時

直ちにゴム手袋を着用して付着部位を流水で洗い、更に洗剤で
洗う。高度に汚染した場合は、他の物と一緒に洗濯しない。

床や作業台が
汚染した時

ゴム手袋を着用し、汚染箇所を吸水マットで拭き取り、薬液周辺
からペーパータオルで拭いて処理する。