

転倒転落 評価表

スコアの合計	
転・転スコア1(1～ 5点)	転倒転落を起こす可能性がある
転・転スコア2(6～15点)	転倒転落をおこしやすい
転・転スコア3(16点以上)	転倒転落をよく起こす シグナル表示

項目	チェックポイント	患者評価					
		月 日		月 日		月 日	
		チェック	点数	チェック	点数	チェック	点数
A 年齢 チェックで1点	70歳以上						
B 既往歴 1年以内 どこかにチェックがあれば3点	転倒・転落したことがある						
	気を失ったことがある(低血糖、起立性低血圧等)						
	入院の原因が転倒である						
C 感覚 どこかにチェックがあれば1点	視野、視力障害がある						
	聴力障害がある						
D 活動領域 どこかにチェックがあれば4点	手足に麻痺やしびれがある						
	手足に拘縮・変形がある						
	平衡バランスが悪い						
	足腰が不自由である						
	車椅子・杖・歩行器を使用している						
	歩行が安定していない						
	移動の際、介助が必要である						
	自分で動くことができる						
E 認知力 どこかにチェックがあれば3点	つじつまの合わない言動が度々ある						
	少し前の言動が思い出せないことがよくある						
	説明したことを理解できない						
F 薬剤 各々1点	睡眠安定剤						
	降圧利尿剤						
	鎮痛剤						
	浣腸、緩下剤						
G 排泄 ベッド上排泄を含む 各々2点	便や尿が間に合わず漏らすことがある						
	便や尿をしたい感じがいつもある						
	トイレ介助が必要						
	夜間トイレに行く						
	ポータブルトイレを使用している						
H 性格 どこかにチェックがあれば3点	なんでも自分でやろうとする方である						
	遠慮がちで人にものを頼みにくい方である						
●その他の情報及びアセスメント		合計点数					
		転・転スコア					
		看護師サイン					

●その他の情報及びアセスメント

転倒転落 評価表

スコアの合計	
転・転スコア1(1～ 5点)	転倒転落を起こす可能性がある
転・転スコア2(6～15点)	転倒転落をおこしやすい
転・転スコア3(16点以上)	転倒転落をよく起こす シグナル表示

項目	チェックポイント	患者評価					
		月 日		月 日		月 日	
		チェック	点数	チェック	点数	チェック	点数
A 年齢 チェックで1点	70歳以上						
B 既往歴 1年以内 どこかにチェックがあれば3点	転倒・転落したことがある						
	気を失ったことがある(低血糖、起立性低血圧等)						
C 感覚 どこかにチェックがあれば1点	視野、視力障害がある						
	聴力障害がある						
D 活動領域 どこかにチェックがあれば4点	手足に麻痺やしびれがある						
	手足に拘縮・変形がある						
	平衡バランスが悪い						
	足腰が不自由である						
	車椅子・杖・歩行器を使用している						
	歩行が安定していない						
	移動の際、介助が必要である						
	自分で立つことができる						
E 認知力 どこかにチェックがあれば3点	つじつまの合わない言動が度々ある						
	少し前の言動が思い出せないことがよくある						
	説明してもナースコールを押さない						
F 薬剤 各々1点	睡眠安定剤						
	降圧利尿剤						
	鎮痛剤						
	浣腸、緩下剤						
G 排泄 ベッド上排泄を含む 各々2点	便や尿が間に合わず漏らすことがある						
	便や尿をしたい感じがいつもある						
	トイレ介助が必要						
	夜間トイレに行く						
	ポータブルトイレを使用している						
H 性格 どこかにチェックがあれば3点	なんでも自分でやろうとする方である						
	遠慮がちで人にものを頼みにくい方である						
●その他の情報及びアセスメント		合計点数					
		転・転スコア					
		看護師サイン					
●その他の情報及びアセスメント							

.....

.....

.....

転倒転落 評価表

スコアの合計	
転・転スコア1(1～ 5点)	転倒転落を起こす可能性がある
転・転スコア2(6～15点)	転倒転落をおこしやすい
転・転スコア3(16点以上)	転倒転落をよく起こす シグナル表示

項目	チェックポイント	患者評価					
		入院時		入院3日目			
		月 日		月 日		月 日	
		チェック	点数	チェック	点数	チェック	点数
A 年齢 チェックで1点	70歳以上						
B 既往歴 1年以内 どこかにチェックがあれば3点	転倒・転落したことがある						
	気を失ったことがある(低血糖、起立性低血圧等)						
C 感覚 どこかにチェックがあれば1点	視野、視力障害がある						
	聴力障害がある						
D 活動領域 どこかにチェックがあれば4点	手足に麻痺やしびれがある						
	手足に拘縮・変形がある						
	平衡バランスが悪い						
	足腰が不自由である						
	車椅子・杖・歩行器を使用している						
	歩行が安定していない						
	移動の際、介助が必要である						
E 認知力 どこかにチェックがあれば3点	つじつまの合わない言動が度々ある						
	少し前の言動が思い出せないことがよくある						
F 薬剤 各々1点	睡眠安定剤						
	降圧利尿剤						
	鎮痛剤						
	浣腸、緩下剤						
G 排泄 ベッド上排泄を含む 各々2点	便や尿が間に合わず漏らすことがある						
	便や尿をしたい感じがいつもある						
	トイレ介助が必要						
	夜間トイレに行く						
	ポータブルトイレを使用している						
H 性格 どこかにチェックがあれば3点	なんでも自分でやろうとする方である						
	遠慮がちで人にものを頼みにくい方である						
合計点数							
転・転スコア							
看護師サイン							

●その他の情報及びアセスメント

転倒転落 評価表

スコアの合計	
転・転スコア1(1～ 5点)	転倒転落を起こす可能性がある
転・転スコア2(6～15点)	転倒転落をおこしやすい
転・転スコア3(16点以上)	転倒転落をよく起こす シグナル表示

項目	チェックポイント	患者評価					
		月 日		月 日		月 日	
		チェック	点数	チェック	点数	チェック	点数
A 年齢 チェックで1点	70歳以上						
B 既往歴 1年以内 どこかにチェックがあれば3点	転倒・転落したことがある						
	気を失ったことがある(低血糖、起立性低血圧等)						
C 感覚 どこかにチェックがあれば1点	視野、視力障害がある						
	聴力障害がある						
D 活動領域 どこかにチェックがあれば4点	手足に麻痺やしびれがある						
	手足に拘縮・変形がある						
	平衡バランスが悪い						
	足腰が不自由である						
	車椅子・杖・歩行器を使用している						
	歩行が安定していない						
	移動の際、介助が必要である						
E 認知力 どこかにチェックがあれば3点	つじつまの合わない言動が度々ある						
	少し前の言動が思い出せないことがよくある						
F 薬剤 各々1点	睡眠安定剤						
	降圧利尿剤						
	鎮痛剤						
	浣腸、緩下剤						
G 排泄 ベッド上排泄を含む 各々2点	便や尿が間に合わず漏らすことがある						
	便や尿をしたい感じがいつもある						
	トイレ介助が必要						
	夜間トイレに行く						
	ポータブルトイレを使用している						
H 性格 どこかにチェックがあれば3点	なんでも自分でやろうとする方である						
	遠慮がちで人にものを頼みにくい方である						
合計点数							
転・転スコア							
看護師サイン							

●その他の情報及びアセスメント

転倒転落を防ぐために注意していただきたいこと 転・転スコア2



説明年月日 年 月 日

様

1	ナースコールの使用方法是看護師がご説明します。
2	ご用がありましたら、遠慮なくナースコールを押して下さい。移動される時は、看護師が介助し同行いたしますのでナースコールでお知らせください。
3	廊下を歩行される時は、必ず手すりをご使用ください。
4	ズボンのすそを踏む可能性があります。長い場合はすそをおりましょう。 スリッパではなく、ゴム底の運動靴をはくことをお勧めします。
5	立ち上がる時は、オーバーテーブルや床頭台、点滴スタンド、歩行器などにつかまらないようにしましょう。
6	ベッドからの転落を防止するためにベッド柵を使用いたします。ベッドから降りす時はナースコールを押して下さい。ご自分でベッドから降りられる方は、ベッドの乗り降りを一緒に練習します。
7	(鎮痛剤 睡眠安定剤) をお飲みになっているので、足元がふらつく可能性があります。特に注意して下さい。 降圧利尿剤をお飲のみにになっているので、尿の回数が多くなる場合があります。あわててトイレに行くと転ぶ可能性が高くなるので、少し余裕をもっていきましょう。また寝る前には排泄を済ませるようにしておきましょう。
8	補聴器をお持ちの場合はご使用ください。補聴器の調整が必要な方は、使えるように調整して下さい。
☆	転倒・転落した場合は、すぐに看護師にご連絡下さい。

ご協力をお願いします。

看護師

転倒転落を防ぐために注意していただきたいこと 転・転スコア3



説明年月日 年 月 日 様

1	ナースコールの使用方法是看護師がご説明します。
2	ご用がありましたら、遠慮なくナースコールを押して下さい。移動される時は、看護師が介助し同行いたしますのでナースコールでお知らせください。
3	廊下を歩行される時は、必ず手すりをご使用ください。
4	ズボンのすそを踏む可能性があります。長い場合はすそをおりましょう。 スリッパではなく、ゴム底の運動靴をはくことをお勧めします。
5	立ち上がる時は、オーバーテーブルや床頭台、点滴スタンド、歩行器などにつかまらないようにしましょう。
6	ベッドからの転落を防止するためにベッド柵を使用いたします。ベッドから降りす時はナースコールを押して下さい。ご自分でベッドから降りられる方は、ベッドの乗り降りを一緒に練習します。
7	（ 鎮痛剤 ・ 睡眠安定剤 ）をお飲みになっているので、足元がふらつく可能性があります。特に注意して下さい。 降圧利尿剤を飲んでいるので、尿の回数が多くなる場合があります。あわててトイレに行くと転ぶ可能性が高くなるので、少し余裕をもっていきましょう。また寝る前には排泄を済ませるようにしておきましょう。
8	補聴器をお持ちの場合はご使用ください。補聴器の調整が必要な方は、使えるように調整して下さい。
9	状況によってはナースステーションに近い部屋への移動をお願いすることがあります。
10	安全を守るため、やむを得ず、体動感知型ナースコール（ベッドから起き上がった時、床に足を付けると、自動的にナースコールがなるシステム）を使用させていただきます。
☆	転倒・転落した場合は、すぐに看護師にご連絡下さい。

ご協力をお願いします。

看護師

ケアの展開シート 転倒転落予防の 標準看護計画 転・転スコア2

看護目標	家族や医療者のサポートをうけながら、転倒転落を防止するための注意点が分かり回避行動がとれる		
小目標	1) 転倒転落を防止するための注意点がわかる 2) 転倒転落を防止するための行動がとれる		
OP) 1.	☐ ① 排泄パターン ☐ ② 排泄方法・介助方法(トイレ・ポータブルトイレ・便尿器・オムツ・カテーテル留置など) ☐ ③ 歩行状態(麻痺・拘縮の程度・安定性・足腰の不自由の有無) ☐ ④ 補助具(車椅子・杖・歩行器)の利用の有無と適正 ☐ ⑤ 移動時に必要な介助 ☐ ⑥ ベッドの高さの適正、ベッドからの乗り降りの方向 ☐ ⑦ 寝巻の裾の長さ、履物は適切か ☐ ⑧ 発熱や血圧の変化によるふらつき、めまいの有無 ☐ ⑨ 鎮痛剤・睡眠剤・降圧利尿剤使用時の歩行状態、排泄パターンの変化 ☐ ⑩ 説明に対する理解(表情、その後の言動) ☐ ⑪ 視野・視力(説明文が見えるか) ☐ ⑫ 聴力(説明の声が聞こえるか、聞こえやすい方向は右か左か)		
OP) 2.	☐ ① 消灯前に排泄についての声掛けと誘導をする ☐ ② 移動方法にあった介助と見守り ☐ ③ 環境整備 ☐ a ベッドの高さ・ストッパーの固定の確認 ☐ b ベッド柵の使用(右頭側・右足側・左頭側・左足側・右中央・左中央)計_____本 ☐ c ベッドを乗り降りする側の整理整頓 ☐ d ラウンドのたびに履物を履きやすい方向・位置に置く ☐ e ナースコールを使用可能な位置にセットする ☐ f キャスター付きのものについては、ストッパーを確認する ☐ ④ 必要に応じてパトロールを行う(日中 _____ 時間ごと・夜間 _____ 時間ごと) ☐ ⑤ ネームバンドへ「見守りテープ」を貼り、見守りを行う		
EP) 3.	☐ ① ナースコールの使用方法 試験使用を行う ☐ ② 必要時ナースコールを押すこと(排泄時・歩行時・その他 _____) ☐ ③ 歩行時手すりを使用すること ☐ ④ 適正な寝巻の裾の長さや履物の選択方法 ☐ ⑤ 立ち上がるときにオーバーテーブル・床頭台・点滴スタンドなどにつかまらない		

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ☐ ⑥ | ベッド柵使用の必要性の説明と同意 |
| ☐ ⑦ | 鎮痛剤・睡眠剤・降圧利尿剤を使用している場合の副作用について |
| ☐ ⑧ | 難聴の程度によっては補聴器の使用を勧める。また必要時調整をお願いする |

月日	番号	実行内容、結果など	実行者

ケアの展開シート 転倒転落予防の
標準看護計画 転・転スコア3

看護目標	家族や医療者のサポートをうけながら、転倒転落を防止するための注意点が分かり回避行動がとれる		
小目標	1) 転倒転落を防止するための注意点がわかる 2) 転倒転落を防止するための行動がとれる 3) 転倒転落を防止するための適切な支援が受けられる		
OP)1	☐ ① 排泄パターン ☐ ② 排泄方法・介助方法(トイレ・ポータブルトイレ・便尿器・オムツ・カテーテル留置など) ☐ ③ 歩行状態(麻痺・拘縮の程度・安定性・足腰の不自由の有無) ☐ ④ 補助具(車椅子・杖・歩行器)の利用の有無と適正 ☐ ⑤ 移動時に必要な介助 ☐ ⑥ ベッドの高さの適正、ベッドからの乗り降りの方向 ☐ ⑦ 寝巻の裾の長さ、履物は適切か ☐ ⑧ 発熱や血圧の変化によるふらつき、めまいの有無 ☐ ⑨ 鎮痛剤・睡眠剤・降圧利尿剤使用時の歩行状態、排泄パターンの変化 ☐ ⑩ 説明に対する理解(表情、その後の言動) ☐ ⑪ 視野・視力(説明文が見えるか) ☐ ⑫ 聴力(説明の声が聞こえるか、聞こえやすい方向は右か左か)		
OT)2	☐ ① 消灯前に排泄についての声掛けと誘導をする ☐ ② 移動方法にあった介助と見守り ☐ ③ 環境整備 ☐ a ベッドの高さ・ストッパーの固定の確認 ☐ b ベッド柵の使用(右頭側・右足側・左頭側・左足側・右中央・左中央)計_____本 ☐ c ベッドを乗り降りする側の整理整頓 ☐ d ラウンドのたびに履物を履きやすい方向・位置に置く ☐ e ナースコールを使用可能な位置にセットする ☐ f キャスター付きのものについては、ストッパーを確認する ☐ ④ 必要に応じたパトロールを行う(日中 _____ 時間ごと・夜間 _____ 時間ごと) ☐ ⑥ ナースステーションに近い部屋への移動を検討 ☐ ⑦ 状況により体動感知型ナースコールの装着を検討 ☐ ⑧ ベッド周囲にマットやまくらなどで保護を行い、ショックを和らげる工夫を行う		
OE)3	☐ ① ナースコールの使用方法 試験使用を行う ☐ ② 必要時ナースコールを押すこと(排泄時・歩行時・その他 _____) ☐ ③ 歩行時手すりを使用すること ☐ ④ 適正な寝巻の裾の長さや履物の選択方法 ☐ ⑤ 立ち上がるときにオーバーテーブル・床頭台・点滴スタンドなどにつかまらない ☐ ⑥ 鎮痛剤・睡眠剤・降圧利尿剤を使用している場合の副作用について ☐ ⑦ 難聴の程度によっては補聴器の使用を勧める。また必要時調整をお願いする		

	☐ ⑧ 転室の必要性の説明と同意		
	☐ ⑨ ベッド柵使用の必要性の説明と同意		
	☐ ⑩ 体動感知型ナースコール装着による身体行動制限の必要性の説明と同意		
月日	番号	実行内容、結果など	実行者

患者・ご家族の皆さんへ ～転倒転落を予防するために～

患者さんが入院して生活される病院の環境は、住み慣れた家庭とは異なります。

当院では、転倒転落の可能性を考え、細心の注意を払っておりますが、生活環境の変化に病気やけがなどによる体力・運動機能の低下が加わると、思いもかけない転倒転落事故につながる可能性があります。安全を高めるため、患者さんやそのご家族と共に、安全対策について考え実行していきたいと思っております。



入院に際して、ご注意いただきたいこと

①メガネ、補聴器は、御愛用のものがありませんでしたらお持ちください。杖は先端に、ゴムキャップやゴムカバーを装着した滑らないものが適しています。



②足腰が不自由な方や、歩行が不安定な方には、ゴム底の運動靴をお勧めします。履きなれた靴がありましたらお持ちください。

③パジャマのズボンのすそを踏む可能性があります。長い場合はすそをおりましょう。ご自分の寝巻をお持ちになる方は、身体にあった長さにしておきましょう。

現在、転倒転落防止対策に関するDVDを、その視聴が必要だと思われる患者さんに、見ていただいております。ご家族の方も、ご希望があれば見ていただくことが可能です。看護師、またはリハビリスタッフにお申し出ください。

転倒転落事故防止手順

外来	● 外来でアナムネーゼを聴取する場合 ① 患者とその家族に、説明用紙や動画などを用いて、入院という環境変化で転倒リスクが高くなることを説明する。 ② 患者家族と共に、転倒転落評価表を用いて転倒リスクを評価する。 ③ 外来看護師から入院病棟担当看護師へ、転倒リスクの申し送りを行う。
病棟	● 病棟でアナムネーゼを聴取する場合 外来手順①② ④ 転・転スコアに応じた「標準看護計画」を選択する。 ⑤ 患者とその家族に看護計画を説明し共有する。 ⑥ 患者用の説明用紙を患者または家族に渡し説明する。 (看護計画の項目の教育指導の実施) ⑦ 入院後3日目、転倒転落発生時、状態の変化、環境の変化(転棟等)が起こった場合は、患者と共に、評価表に沿って再評価する。

●発熱等による即日入院の際は、

入院前の状況(歩行、認知症、排泄パターン)が、変化している場合があるので、注意が必要。
特に、夜間に排泄等で移動する場合は、ベッド周囲や廊下の暗さでも、患者の視界・視野が確保できるかを、夜勤看護師は確認する。

●ベッド柵を使用する場合は

柵が、患者の行動の妨げにならないよう、取り付け位置に配慮する。

●車椅子や歩行器、ポータブルトイレなどが、患者の近くにあると、

患者は自分で動かそうとするので

歩行が自立していない患者に対しては、患者の目の届くところには置かないようにする。

●「ナースコールを押して下さい」という説明をしても

遠慮からコールしない患者もいる。一人で動くと転倒転落のリスクが高い患者には、説明もした上で、コールを必ず手の届くところに置く、握らせておく、患者の見えるところに張り紙をする等、プラスの対策を立てる。

●転倒リスクの高い患者は、

ネームバンドを黄色にかえて、情報を共有する。



転倒転落 評価表

スコアの合計	
転・転スコア1(1～ 5点)	転倒転落を起こす可能性がある
転・転スコア2(6～15点)	転倒転落をおこしやすい
転・転スコア3(16点以上)	転倒転落をよく起こす シグナル表示

項目	チェックポイント	患者評価					
		月 日		月 日		月 日	
		チェック	点数	チェック	点数	チェック	点数
A 年齢 チェックで1点	70歳以上						
B 既往歴 1年以内 どこかにチェックがあれば3点	転倒・転落したことがある						
	気を失ったことがある(低血糖、起立性低血圧等)						
	入院の原因が転倒である						
C 感覚 どこかにチェックがあれば1点	視野、視力障害がある						
	聴力障害がある						
D 活動領域 どこかにチェックがあれば4点	手足に麻痺やしびれがある						
	手足に拘縮・変形がある						
	平衡バランスが悪い						
	足腰が不自由である						
	車椅子・杖・歩行器を使用している						
	歩行が安定していない						
	移動の際、介助が必要である						
	自分で動くことができる						
E 認知力 どこかにチェックがあれば3点	つじつまの合わない言動が度々ある						
	少し前の言動が思い出せないことがよくある						
	説明したことを理解できない						
F 薬剤 各々1点	睡眠安定剤						
	降圧利尿剤						
	鎮痛剤						
	浣腸、緩下剤						
G 排泄 ベッド上排泄を含む 各々2点	便や尿が間に合わず漏らすことがある						
	便や尿をしたい感じがいつもある						
	トイレ介助が必要						
	夜間トイレに行く						
	ポータブルトイレを使用している						
H 性格 どこかにチェックがあれば3点	なんでも自分でやろうとする方である						
	遠慮がちで人にものを頼みにくい方である						
●その他の情報及びアセスメント		合計点数					
		転・転スコア					
		看護師サイン					

●その他の情報及びアセスメント