

簡易懸濁法について

簡易懸濁法とは、錠剤粉碎や脱カプセルをせずに、錠剤・カプセル剤をそのまま温湯（55℃）に入れて、崩壊・懸濁させ、経鼻胃管、胃ろう、腸ろうより経管投与する方法。

簡易懸濁できない薬剤、水で溶かさなければいけない薬剤、一緒に溶かすことで配合変化をおこしやすい薬剤があるので、開始する前に、必ず薬局に確認する。
水薬がある場合は、単独で準備し投与する。

手順

配合変化や安定性の問題で懸濁後10分で投与することを考えて準備する。

- ①ポットから70℃のお湯をコップに移す。
- ②懸濁ボトルの蓋を外し、薬剤をそのまま入れる。
- ③お湯を入れたコップから湯を20ml懸濁ボトルに移し、蓋をして10分置いておく。
10分以内に薬剤が崩壊懸濁していれば10分を待たず投与してよい。懸濁液の長時間放置は有効成分の分解や配合変化等の危険がある為、10分を超えて放置しない。
- ④配合変化をできるだけ回避するために、投与直前に、懸濁ボトルの蓋をおさえながらゆっくり転倒混和する。
- ⑤薬剤が溶解したことを確認して患者のもとにもっていく。
- ⑥微温湯20mlでチューブ内をフラッシュし、懸濁ボトルをチューブに接続してゆっくり薬剤を注入する。
- ⑦注入後は圧をかけたままチューブを折り曲げて懸濁ボトルを外す（逆流防止の為）。
- ⑧チューブ内を微温湯20mlでフラッシュし終了。

懸濁ボトル(以下ボトルという)の決まり

- ・ボトルには名前と生年月日を直接マジックで記入する。
- ・ボトルは1患者1トレイで準備する。
- ・ボトルは1週間で新しいものと交換する。



○なぜ、55℃・10分？

カプセルは37℃±2℃の湯で10分以内に溶けると日本薬局方で規定されています。しかし実務上37℃の温度を保持することはむずかしいので10分たっても37℃以下にならない55℃のお湯を使用するとしています。

○どうやったら55℃が作れる？ 2つの方法があります。

- ①70℃のお湯をカップに注ぎそこから懸濁ボトルに移して準備すると、ちょうど55℃になる。
- ②沸騰したポットのお湯と水を2:1に合わせると55℃になる。

