

よく使用される臨時薬剤の「警告・禁忌事項」

薬 剤 名	警 告 ・ 禁 忌	
ジクロフェナク坐剤	警 告	幼少児、高齢者または、消耗性疾患患者は過度の体温低下、血圧低下によるショック症状
	禁 忌	消化性潰瘍、重篤な血液異常・肝腎障害・高血圧症・心機能不全、アスピリン喘息、妊婦、トリアムテレン投与中、直腸炎、直腸出血、痔疾、インフルエンザ臨床経過中の脳炎・脳症
アセトアミノフェン坐剤	禁 忌	重篤な肝腎障害
ソセゴン(注)	禁 忌	頭蓋内圧上昇、頭部障害、重篤な呼吸抑制・全身状態の著しい悪化患者 ナルメフェン塩酸塩水和物を投与中又は投与中止後1週間以内の患者
ブスコパン(注)	禁 忌	出血性大腸炎、閉塞隅角緑内障、前立腺肥大による排尿障害のある患者、重篤な心疾患のある患者、麻痺性イレウス、本剤に過敏症のある患者
	原 則 禁 忌	細菌性下痢患者
デエビゴ(錠)	禁 忌	重度の肝機能障害
ソルピデム(錠)	警 告	もうろう状態、睡眠随伴症状(夢遊症状等)の発現と中途覚醒時の健忘
	禁 忌	重篤な肝障害、重症筋無力症、急性閉塞隅角緑内障 本剤により睡眠随伴症状として異常行動を発現したことがある患者
	原 則 禁 忌	肺性心、肺気腫、気管支喘息及び脳血管障害の急性期等で呼吸機能が高度に低下している場合
フロセミド(注)	禁 忌	無尿、肝性昏睡、Na・K減少、スルホンアミド系薬過敏症、デスモプレシン酢酸塩水和物(男性における夜間多尿による夜間頻尿)投与中
ナウゼリン坐剤	禁 忌	妊婦、消化管出血、機械的イレウス、消化管穿孔、プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍
塩酸メクロプラミド(注) (プリンペラン注)	禁 忌	褐色細胞腫、消化管出血・穿孔、器質的閉塞
アタラックスP(注)	禁 忌	セチリジン・ピペラジン誘導体・アミノフィリン・エチレンジアミン過敏症既往歴 ポルフィリン症、妊婦
セルシン(注)	禁 忌	重症筋無力症、急性閉塞隅角緑内障、リトナビル投与中、ショック、昏睡、バイタルサインの悪い急性アルコール中毒
ニフェジピン	禁 忌	心原性ショック
ペルジピン(注) ニフェジピン(注)	警 告	脳出血急性期の患者及び脳卒中急性期で頭蓋内圧が亢進している患者
	禁 忌	急性心不全で高度大動脈弁狭窄・僧帽弁狭窄、肥大型閉塞性心筋症、低血圧症、心原性ショック、重篤な急性心筋梗塞