

●配合変化を起こしやすい酸性注射剤・アルカリ性注射剤

★アレビアチンをルートする時は、前後に生理食塩水をフラッシュするか、別ルートで行う。
他の薬剤については、注意して観察しながら投与する。

酸性注射剤	pH	アルカリ性注射剤	pH
点滴静注用ミノマイシン	2.0 - 3.5	アレビアチン注	12.0
ノルアドレナリン	2.3 - 5.0	ダントリウム静注用	9.0 - 10.5
ボスミン注	2.3 - 5.0	カンレノ酸カリウム静注用	9.0 - 10.0
セファランチン注射液	2.5 - 3.5	フェジン静注	9.0 - 10.0
塩酸メクロプラミド (プリンペラン)	2.5 - 4.5	スルバシリン静注用(ユナシンS)	9.0 - 9.1
塩酸バンコマイシン	2.5 - 4.5	フロセミド注	8.6 - 9.6
ドブトレックス注射液	2.7 - 3.3	ネオフィリン注	8.0 - 10.0
ミダゾラム注射液	2.8 - 3.8	メイロン静注7%	7.6 - 8.6

●ロセフィン静注用について

「カルシウム」を含有する輸液に対して配合変化をおこすので、投与前後に生食10mlでフラッシュする。

カルシウム(Ca²⁺)を含有する当院採用薬

ラクテック ラクテックG フィジオ140 ビーフリード フルカリック1号2号3号
カルチコール5ml 大塚塩カル20ml エルネオパNF 1号2号

＜安全対策＞ 上記の輸液が本体輸液である場合、薬局は、ロセフィンに「前後に生食10mlでフラッシュ」のテープを貼り、生食注シリンジ2本と「本体輸液一時中止中」のカードを一緒に払い出す。ロセフィンを投与中は本体輸液を一時的に中止するが、本体輸液にこのカードをかけることで、本体輸液の誤投与や再開始忘れを防止する。

●原則単独投与の薬剤

薬剤名	側管から投与する場合
タケプロン静注用	主管を止めて 生食 または ブドウ糖 で前後フラッシュ
ケイツーN静注	主管を止めて 生食 または ブドウ糖 で前後フラッシュ
ラスビック点滴静注	主管を止めて 生食 または ブドウ糖 で前後フラッシュ
フェジン静注	主管を止めて ブドウ糖 で前後フラッシュ