

当院採用のインスリン製剤

インスリン製剤などの保管・使用期限



①ペン型タイプは、使用開始後は、直射日光の当たらない室温(涼しいところ)で保管する。

②使用期限を過ぎたものは廃棄する。

分 類	インスリン製剤	使用期限	保管方法
超 速 効 型	インスリンアスパルトBS注ソロスター	4週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
速 効 型	ノボリンR注フレックスペン	6週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
	ヒューマリンR注(10mlバイアル)	4週間	冷蔵庫
中 間 型	ノボリンN注フレックスペン	6週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
	ヒューマリンN注(10mlバイアル)	4週間	冷蔵庫
混 合 型	超速効型＋中間型 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	4週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
	超速効型＋中間型 ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	4週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
	速効型＋中間型 ノボリン30R注フレックスペン	6週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
	超速効型＋持効型 ライゾデグ配合注フレクスタッチ	4週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
持 効 型	インスリングルルギンBS注ミリオペン	4週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
	トレシーバ注フレクスタッチ	8週間	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
GLP-1製剤 消化管ホル モン(インス リンとは異な ります)	ビクトーザ	30日	冷蔵庫、使用開始後は室温保管
持効型イン スリン＋ GLP-1	ゾルトファイ配合注フレクスタッチ	室温(30℃以下)3週間 室温(25℃以下)4週間 冷蔵庫(2～8℃)4週間	

2026年 薬局 改定