

輸血チェックリスト

①	☐ 年 月 日 血液製剤 () を () 単位 施行																				
	☐ 患者又は家族への説明																				
	☐ 輸血同意書の確認																				
②	☐ 検査科での輸血バッグ受領時、看護師と検査技師、2名で確認し、看護師は、「輸血依頼控えの輸血製剤払い出し前確認項目」の「確認者」欄にサインをする。但し、時間外にて、検査技師不在の場合は、看護師2名で確認し、「確認者」欄へそれぞれがサインをして、受領する。																				
	☐ 輸血施行前、医師・看護師又は、看護師2名で確認し、右サイン欄にサインする。																				
	☐ 照合確認 (輸血依頼控え・輸血バック・血液型データ(カルテ)による)																				
	<table border="1"><tr><td>☐ 患者氏名</td><td>()</td></tr><tr><td>☐ 血液型</td><td>(型・RH)</td></tr><tr><td>☐ 血液製剤の種類</td><td>()</td></tr><tr><td>☐ 量</td><td>(単位)</td></tr><tr><td>☐ 施行日</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td>☐ 照射</td><td></td></tr><tr><td>☐ 有効期限</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td>☐ 凝血塊</td><td>有 ・ 無</td></tr><tr><td>☐ 混濁</td><td>有 ・ 無</td></tr><tr><td>☐ バック破損</td><td>有 ・ 無</td></tr></table>	☐ 患者氏名	()	☐ 血液型	(型・RH)	☐ 血液製剤の種類	()	☐ 量	(単位)	☐ 施行日	年 月 日	☐ 照射		☐ 有効期限	年 月 日	☐ 凝血塊	有 ・ 無	☐ 混濁	有 ・ 無	☐ バック破損	有 ・ 無
☐ 患者氏名	()																				
☐ 血液型	(型・RH)																				
☐ 血液製剤の種類	()																				
☐ 量	(単位)																				
☐ 施行日	年 月 日																				
☐ 照射																					
☐ 有効期限	年 月 日																				
☐ 凝血塊	有 ・ 無																				
☐ 混濁	有 ・ 無																				
☐ バック破損	有 ・ 無																				
	輸血に異常がないことを 輸血開始前に 看護記録に残す																				
	☐ 患者認証業務画面を開き、輸血バックのバーコードを、バーコードリーダーを使用して、3箇所(製造番号・血液型・血液製剤の種類)読み取り輸血実施に入る。																				
	☐ 輸血バックに名前を直接記入する。																				
	☐ 患者にフルネーム、生年月日、血液型を言ってもらい、輸血バッグとネームバンドで照合し確認する。 ※ネームバンドの血型の印字がない場合は転記はせず、血液型の印字されたネームバンドを準備する。																				
	☐ 生理食塩水100mlをAセットにつなぎルートをとる。留置針は20Gが第1選択。血管が細い場合でも22G以上の留置針とする。																				
	☐ 逆流を確認し、輸血バッグをつないだ輸血セットをAセットの側管に接続する。																				
	☐ 開始後15分はベッドサイドで観察。輸血開始時、生理食塩水はクランプし、輸血のみ投与する。																				
	☐ 開始前、開始15分後は、必ず、バイタルサインのチェックと観察を行い、記録する。																				
	☐ 終了後、輸血ルートを維持しておく場合：側管の輸血セットを外し、本体Aセット内の血液製剤を生理食塩水で流した後、生食ロックして終了する。																				
	☐ 複数の輸血バックを続けて投与する場合は、その都度、輸血バックに新しいセットを準備する。 原則、「1バック1輸血セット」で投与する。																				
	☐ 終了時、バイタルサインのチェックと観察を行い記録する。																				
	☐ PCの輸血オーダーから輸血実施に入り、終了した輸血バッグのバーコード(3箇所)をバーコードリーダーで3箇所読み取り、実施入力を行う。																				
	☐ 指示医へ輸血終了・状態報告し、「輸血依頼控え」の副作用欄にチェック、サインを依頼する。																				
	☐ 記載した「輸血依頼控え」を検査科へ提出する。																				

- 1 輸血当日にチェックリストを起こす。
- 2 ☐は☑をする。
- 3 同日、同血液製剤を複数バック使用する場合は、この時2バック目からのチェックリストは、②のみをチェックする。
- 4 青字のチェック項目は、単独ルート1バック目の時に施行しチェックする。
- 5 緑字の項目については、その日の血液製剤すべてが終了した時、施行しチェックする。