

ME - 310 Probabilidade II
Prof. Caio Azevedo
Segundo semestre de 2009, Data: 30/09/2009
Prova I

Leia atentamente as instruções abaixo:

- Tenha em mãos somente: lápis, borracha e caneta.
- Leia atentamente cada uma das questões.
- Enuncie, claramente, todos os resultados que você utilizar.
- Em caso de dúvida, levante-se e dirija-se ao professor. Pergunte somente o que for imprescindível.
- Entregue todas as folhas que você recebeu, inclusive os rascunhos e a prova propriamente, informando o que deve ser corrigido.
- Faça a prova, preferencialmente, à caneta, e procure ser organizado. Se fizer à lápis, destaque, à caneta, sua resposta.
- Não proceda de maneira indevida como: conversar durante a prova, utilizar-se de material que não permitido, emprestar material à colegas, sem autorização do professor e atender o telefone celular (a não ser em casos de EXTREMA URGÊNCIA). Isso acarretará em nota 0 na prova.
- Se precisar de algum material, inclusive calculadora, levante-se e dirija-se ao professor.
- A prova terá duração de 2 horas, improrrogáveis, das 14h às 16h.

Faça uma excelente prova!!

Questões


1. Seja X uma v.a.c., $X \sim \text{Weibull}(k, \lambda)$, $(k, \lambda) \in (0, +\infty)^2$, cuja f.d.p é dada por:

$$f_X(x) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

Responda os itens:

- a) Prove que f_X é de fato uma f.d.p (0,2 pontos)?
- b) Calcule a f.d.a (F_X) de X e a escreva usando funções indicadoras (0,2 pontos).
- c) Calcule $\mathcal{E}(X^s)$, $s > 0$ (0,6 pontos).
- d) Calcule $\mathcal{E}(X)$ e $\mathcal{V}(X)$ (0,2 pontos).

2. Seja X uma v.a.c, cuja f.d.p é dada por: $f_X(x) = (1/2) [\theta \mathbb{1}_{(0,1)}(x) + \mathbb{1}_{[1,2]}(x) + (1 - \theta) \mathbb{1}_{(2,3)}(x)]$, $\theta \in (0, \frac{1}{2}]$. Responda aos itens:
- Prove que f_X é de fato uma f.d.p (0,4 pontos).
 - Encontre a f.d.a de X , (F_X) e a escreva usando funções indicadoras (0,4 pontos).
 - Verifique que F_X satisfaz a seguinte propriedade (1,0 ponto):
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$
 - Calcule $\mathcal{E}(X)$, $\mathcal{V}(X)$ (1,0 ponto).
 - Calcule $Md(X)$ (1,0 ponto).
3. Seja (X, Y) um vetor aleatório contínuo, cuja f.d.p é dada por $f_{(X,Y)}(x, y) = c \mathbb{1}_A(x, y)$, em que A é a região definida pelo triângulo abaixo:



- Escreva $f_{(X,Y)}$, primeiramente, com x variando em função de y , depois com y variando em função de x . Determine o valor de c de modo que $f_{(X,Y)}$ seja de fato uma f.d.p. (0,5 pontos)
- Encontre as f.d.p.'s marginais de X e de Y . Identifique suas distribuições (1,0 ponto).
- Calcule a $\mathcal{E}(X)$, $\mathcal{E}(Y)$, $\mathcal{V}(X)$ e $\mathcal{V}(Y)$ (1,0 ponto).
- Calcule a f.d.p condicional de $X|Y$. Identifique sua distribuição (0,5 pontos).
- Calcule $\mathcal{E}(X)$ através da f.d.p. obtida no item d). O resultado é o mesmo daquele obtido no item c)? Sua conclusão era esperada? Justifique adequadamente sua resposta (2,0 pontos).

Legenda

- v.a.c: variável aleatória contínua.
- f.d.p: função densidade de probabilidade ou função de probabilidade.
- f.d.a: função de distribuição acumulada.

Formulário

- $\forall r > 0, \Gamma(r) = \begin{cases} (r-1)!, & \text{se } r \text{ for inteiro.} \\ \int_0^\infty x^{r-1} e^{-x} dx, & \text{se } r \text{ não for inteiro.} \end{cases}$
- $\forall r > 0 \Gamma(r) = r\Gamma(r-1)$.
- Sejam X e Y duas v.a.'s quaisquer, então: $\mathcal{E}(X) = \mathcal{E}(\mathcal{E}(X|Y))$.
- Sejam X e Y duas v.a.'s quaisquer, então: $\mathcal{E}(X+Y) = \mathcal{E}(X) + \mathcal{E}(Y)$.
- Se $X \sim \text{Beta}(a, b), a, b > 0$, então $f_X(x) = \frac{1}{\beta(a,b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$, $\beta(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$.
Nesse caso $\mathcal{E}(X) = \frac{a}{a+b}$ e $\mathcal{V}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$.
- Se $X \sim U(a, b), a, b > 0$ (Uniforme), então $f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{(a,b)}(x)$, $\mathcal{E}(X) = \frac{a+b}{2}$.