

Gabarito da Prova 1 de MA311 - Cálculo III - Turma Z - 06/09/2012

1.ª Questão. (2 pontos) Encontre um fator integrante e resolva a equação

$$(x + 2)\sin y dx + x \cos y dy = 0.$$

Resolução: Sendo $M(x, y) = (x + 2)\sin y$ e $N(x, y) = x \cos y$, temos

$$M_y = (x + 2) \cos y \neq N_x = \cos y.$$

Portanto, a equação não é exata. Procuremos um fator integrante:

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{(x + 2) \cos y - \cos y}{x \cos y} = \frac{x + 1}{x},$$

que só depende de x . Logo um fator integrante dependendo de x é dado pela solução da equação

$$\mu' = \frac{x + 1}{x} \mu.$$

Notemos que a equação é separável:

$$\frac{d\mu}{\mu} = \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx, \text{ integrando obtemos } \ln(\mu) = x + \ln x, \text{ assim } \mu(x) = xe^x. \quad (1 \text{ ponto})$$

Multiplicando a equação pelo fator integrante obtemos uma equação exata:

$$xe^x(x + 2)\sin y dx + x^2 e^x \cos y dy = 0.$$

Logo sabemos que existe $\psi(x, y)$ tal que $\psi_x = xe^x(x + 2)\sin y$ e $\psi_y = x^2 e^x \cos y$. Integrando $\tilde{N}(x, y)$ em relação a y e mantendo x constante, obtemos

$$\psi(x, y) = \int x^2 e^x \cos y dy = x^2 e^x \sin y + h(x).$$

Assim,

$$\psi_x = 2xe^x \sin y + x^2 e^x \sin y + h'(x) = xe^x(x + 2)\sin y.$$

Então

$$h'(x) = 0 \Rightarrow h(x) = \text{constante}.$$

Deste modo, a solução geral é dada implicitamente por

$$\psi(x, y) = x^2 e^x \sin y = C. \quad 1 \text{ ponto}$$

2.ª Questão. (2 pontos) (0,5)(a) Sem resolver o problema, responda:

o problema $\frac{dy}{dx} = (1 - x^2 - y^2)^{\frac{1}{2}}$, $y(0) = 0$ admite solução única?

(0,5) (b) Sem resolver o problema, determine um intervalo no qual a solução certamente existe:

$$xy' - 2y = x^2 + 1, \quad y(1) = y_0.$$

(1,0) (c) Resolva o item (b) para $y_0 = \frac{1}{2}$.

Resolução: (a) Verifiquemos as hipóteses do TEU para equações não lineares de 1.ª ordem. $f(x, y) = (1 - x^2 - y^2)^{\frac{1}{2}}$ está bem definida e é contínua para $1 - x^2 - y^2 \geq 0$ ou seja, para $x^2 + y^2 \leq 1$. Calculemos a derivada com relação a y : $f_y = -\frac{y}{(1 - x^2 - y^2)^{\frac{1}{2}}}$ que é um quociente de $g(x, y) = -y$ que é contínua para todo (x, y) e $h(x, y) = (1 - x^2 - y^2)^{\frac{1}{2}}$ que é contínua para $x^2 + y^2 \leq 1$ e se anula em $x^2 + y^2 = 1$. Por tanto f_y é contínua em $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$. (0,25 pontos)

Como podemos tomar um retângulo aberto contendo o ponto $(0, 0)$ e contido na região D , pelo TEU, o problema admite solução única em algum intervalo aberto contendo $x_0 = 0$. (0,25 pontos)

(b) A equação é linear de 1a. ordem: $y' - \frac{2}{x}y = \frac{x^2+1}{x}$ com $p(x) = -\frac{2}{x}$ e $g(x) = \frac{x^2+1}{x}$, que são contínuas para todo $x \neq 0$, ou seja, nos intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$. (0,25 pontos)

Como $x_0 = 1$ pertence ao intervalo $(0, +\infty)$ pelo TEU concluímos que a solução certamente existe no intervalo $(0, +\infty)$. (0,25 pontos)

(c) Com a equação na forma: $y' - \frac{2}{x}y = \frac{x^2+1}{x}$, o fator integrante é:

$$\mu(t) = \exp\left(-2 \int \frac{1}{x} dx\right) = \exp(-2 \ln x) = \exp(\ln x^{-2}) = x^{-2}. \quad (0, 3 \text{ pontos})$$

Multiplicamos a equação na forma padrão por x^{-2} e reescrevemos

$$x^{-2}y' - 2x^{-3}y = x^{-2}\frac{x^2+1}{x} \iff (x^{-2}y)' = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}.$$

Integramos

$$x^{-2}y = \int \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} dx + C = \ln x - \frac{1}{2x^2} + C \Rightarrow y = x^2 \ln x - \frac{1}{2} + Cx^2. \quad (0, 5 \text{ pontos})$$

Utilizando a condição inicial $y(1) = 0$, determinamos o valor para C :

$$y(1) = -\frac{1}{2} + C = \frac{1}{2}, \quad \text{logo} \quad C = 1.$$

A solução do problema de valor inicial é:

$$y = x^2 \ln x - \frac{1}{2} + x^2. \quad (0, 2 \text{ pontos})$$

3.ª Questão.(1,5 pontos) Encontre a solução geral explícita da equação

$$x \frac{dy}{dx} = y + xe^{y/x}.$$

Resolução: Dividindo por x , obtemos a equação

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + e^{y/x}.$$

Como o lado direito da equação acima depende somente do quociente y/x , isso mostra que a equação é homogênea. (0,5 pontos)

Fazendo a mudança de variável $v = y/x$ a equação acima se transforma na equação separável

$$v + x \frac{dv}{dx} = v + e^v \quad \text{ou} \quad e^{-v} dv = \frac{dx}{x}.$$

Integrando

$$-e^{-v} = \ln|x| + C,$$

e voltando á variável original

$$-e^{-y/x} = \ln|x| + C \implies y = -x \ln(\ln|x|^{-1} - C). \quad (1 \text{ ponto})$$

4.ª Questão.(2 pontos) Considere a equação diferencial

$$y^{(4)} - y' = 2te^t + \cos t + 3t$$

(a) Encontre a solução da equação homogênea. Dica: $r^3 - 1 = (r - 1)(r^2 + r + 1)$.

(b) Usando o método de coeficientes indeterminados encontre uma forma da solução particular SEM calcular os coeficientes.

Resolução: (a) A equação homogênea associada é $y^{(4)} - y' = 0$.

A equação característica é: $r^4 - r = r(r^3 - 1) = r(r - 1)(r^2 + r + 1)$.

Raízes: $r_1 = 0$, $r_2 = 1$ para $(r^2 + r + 1) = 0$ temos as raízes complexas conjugadas: $\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

O conjunto fundamental de soluções é: $y_1 = e^{0t} = 1$, $y_2 = e^t$, $y_3 = e^{-\frac{t}{2}} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$ e $y_4 = e^{-\frac{t}{2}} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$.

A solução geral da homogênea é:

$$y_h = c_1 + c_2 e^t + c_3 e^{-\frac{t}{2}} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + c_4 e^{-\frac{t}{2}} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t). \quad (1 \text{ ponto})$$

(b) Como $g(t) = 2te^t + \cos t + 3t$ consideramos três problemas separadamente.

Consideremos primeiro a equação: $y^{(4)} - y' = 2te^t$. Como e^t é solução da homogênea, uma solução particular será da a forma $Y_1 = t(At + B)e^t$.

Consideremos agora a equação $y^{(4)} - y' = \cos t$. Uma solução particular terá a forma $Y_2 = C \cos t + D \sin t$.

Consideremos a equação: $y^{(4)} - y' = 3t$. Como as constantes são soluções da homogênea, uma solução particular será da a forma $Y_3 = t(Et + F)$.

Portanto, uma solução particular terá a forma:

$$y_p = Y_1 + Y_2 + Y_3 = t(At + B)e^t + C \cos t + D \sin t + t(Et + F). \quad (1 \text{ ponto})$$

5.ª Questão. Considere a equação diferencial ordinária

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = x^3(x+2), \quad x > 0.$$

(a) **(1,5 pontos)** Sabendo que a função $y_1 = x$ é uma solução da equação homogênea associada, aplique o *método de redução de ordem* para encontrar uma outra solução y_2 que seja linearmente independente com y_1 . Verifique que y_1 e y_2 são linearmente independentes.

(b) **(1 ponto)** Usando o método de variação dos parâmetros determine a solução geral da equação não homogênea.

Resolução: (a) Pelo *método de redução de ordem* procuramos uma solução $y_2 = v(x)y_1 = v(x)x$, onde $v(x)$ é uma função a ser determinada. Derivando e substituindo na equação, temos que v' satisfaz a equação linear de ordem um

$$x^3 v'' - x^3 v' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad v'' = v'. \quad 1 \text{ ponto}$$

Então $v'(x) = e^x$ e portanto $v(x) = e^x$. Assim, uma segunda solução é

$$y_2 = xe^x. \quad 0,3 \text{ pontos}$$

Calculamos o Wronskiano para verificar que y_1 e y_2 são l.i.,

$$W(x, xe^x)(x) = \begin{vmatrix} x & xe^x \\ 1 & e^x + xe^x \end{vmatrix} = x(e^x + xe^x) - xe^x = x^2 e^x.$$

Como o Wronskiano não é identicamente nulo ($x > 0$), as funções são l.i. **0,2 pontos**

(b) Pelo método de variação dos parâmetros procuramos a solução geral na forma

$$y = u(x)y_1 + v(x)y_2 = u(x)x + v(x)xe^x,$$

onde u' e v' satisfazem o sistema

$$\begin{cases} u'y_1 + v'y_2 = 0, \\ u'y'_1 + v'y'_2 = x(x+2), \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'x + v'xe^x = 0, \\ u' + v'(e^x + xe^x) = x(x+2), \end{cases}$$

Calculemos o Wronskiano

$$W(x, xe^x) = \begin{vmatrix} x & xe^x \\ 1 & e^x + xe^x \end{vmatrix} = x^2 e^x.$$

Pela regra de Cramer

$$u' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & xe^x \\ x(x+2) & e^x + xe^x \end{vmatrix}}{x^2 e^x} = -\frac{x^2 e^x (x+2)}{x^2 e^x} = -(x+2) \Rightarrow u = -\frac{x^2}{2} - 2x + c_1,$$

$$v' = \frac{\begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & x(x+2) \end{vmatrix}}{x^2 e^x} = \frac{x^2(x+2)}{x^2 e^x} = e^{-x}(x+2) \Rightarrow$$

$$v = \int e^{-x}(x+2)dx = -e^{-x}(x+2) + \int e^{-x}dx = -e^{-x}(x+3) + c_2.$$

Portanto a solução geral é:

$$y = u(x)x + v(x)xe^x = \left(-\frac{x^2}{2} - 2x + c_1\right)x + \left(-e^{-x}(x+3) + c_2\right)xe^x = (c_1 - 3)x + c_2e^x - \frac{x^3}{2} - 3x^2.$$