

2ª Prova

MA-311 - Noturno — Cálculo III

1º Semestre de 2011

Nome:

RA:

Assinatura:

Prof.:

Esta prova tem um total de 5 questões valendo 10 pontos. Para maximizar seu tempo procure não gastar em cada questão, em minutos, mais do que 10 vezes o seu valor em pontos. É essencial justificar detalhadamente todas as respostas.

Escreva suas respostas de forma clara e evite toda e qualquer rasura. Use o verso das páginas de questões para rascunho, se necessário.

NÃO DESTAQUE AS PÁGINAS DA PROVA!

1	2.0	
2	2.0	
3	2.0	
4	1.5	
5	2.5	
Total	10.0	

Não é permitido o uso de calculadoras!

1. (2.0 pontos) Resolva por transformada de Laplace o seguinte PVI:

$$y'' + 2y' + 5y = 2\delta(t - \pi)$$

onde $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$.

2. (2.0 pontos)

- (a) Usar a formula $\mathcal{L}\{\int_0^t f(\tau)d\tau\} = F(s)/s$ (cf. tabela) para calcular a inversa da transformada de Laplace de

$$G(s) = \frac{1}{s(s^2 - 1)}.$$

- (b) Usar a propriedade de convolução para calcular a inversa da transformada de Laplace de:

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}.$$

3. (3.5 pontos) Considere o sistema

$$\begin{cases} x_1' = \frac{-3}{2}x_1 + x_2 + 2\sqrt{t} e^{-t} \\ x_2' = \frac{-1}{4}x_1 + \frac{-1}{2}x_2 + e^{-t} \end{cases}$$

- (a) (2.0) Escreva a solução geral do sistema homogêneo associado na forma $\mathbf{x}(t) = \Psi(t)C$ onde $\Psi(t)$ é uma matriz 2×2 e $C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$.

- (b) (1.5) Resolva o sistema linear algébrico $\Psi(t)U'(t) = g(t)$ para $U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}$ onde $g(t) = \begin{pmatrix} 2\sqrt{t} e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}$ e encontre uma solução particular do sistema.

4. (2.5 pontos)

- (a) (0.5) Estude a convergência da sequência quando $n \rightarrow \infty$. Se convergir calcule o limite e se divergir justifique:

$$(n)^{\frac{1}{n}}.$$

- (b) (1.0) Calcule a soma da série:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{3} \ 5^{n+1} + \pi 7^{n-2}}{8^{n-1}}.$$

- (c) (1.0) Verifique se a série converge condicionalmente, absolutamente ou diverge:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k!}{k^k}.$$

Questão 1.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'' + 2y' + 5y\} &= \mathcal{L}\{2\delta(t - \pi)\} \\ \mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{2y'\} + \mathcal{L}\{5y\} &= 2\mathcal{L}\{\delta(t - \pi)\}\end{aligned}$$

0,2 pontos até aqui.

$$\begin{aligned}s^2\mathcal{L}\{y\} - sy(0) - y'(0) + 2[s\mathcal{L}\{y\} - y(0)] + 5\mathcal{L}\{y\} &= 2e^{\pi s} \\ (s^2 + 2s + 5)\mathcal{L}\{y\} - s - 2 &= 2e^{\pi s} \\ \mathcal{L}\{y\} &= \frac{s+2}{s^2 + 2s + 5} + \frac{2e^{\pi s}}{s^2 + 2s + 5}\end{aligned}$$

+ 0,6

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{s+2}{(s+1)^2 + 4} + \frac{2e^{\pi s}}{(s+1)^2 + 4}$$

+ 0,2

$$= \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4} + \frac{1}{(s+1)^2 + 4} + \frac{2e^{\pi s}}{(s+1)^2 + 4}$$

+ 0,2

$$\begin{aligned}y &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2 + 4} + \frac{1}{(s+1)^2 + 4} + \frac{2e^{\pi s}}{(s+1)^2 + 4}\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2 + 4}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2 + 4}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2e^{\pi s}}{(s+1)^2 + 4}\right\}\end{aligned}$$

+ 0,2

$$y = e^{-t} \cos 2t + \frac{1}{2}e^{-t} \sin 2t + u_{\pi}(t)e^{-(t-\pi)} \sin 2(t - \pi).$$

+ 0,6

Questão 2. (a) Tomando $F(s) = \frac{1}{s^2-1}$, temos $G(s) = F(s)/s$,

0,2

logo, pela fórmula dada, vem que $\mathcal{L}^{-1}\{G\} = \int_0^t f(\tau)d\tau$, onde

$$f = \mathcal{L}^{-1}\{F\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-1}\right\}$$

+ 0,2

$$= \sinh t.$$

+ 0,2

Assim,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\{G\} &= \int_0^t \sinh \tau d\tau \\ &= \cosh \tau \Big|_0^t\end{aligned}$$

+ 0,2

$$= \cosh t - 1.$$

+ 0,2

(b) Sejam $G(s) = \frac{1}{s+1}$ e $H(s) = \frac{1}{s+2}$. Então $F(s) = G(s)H(s)$ e

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = e^{-2t}, \quad g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = e^{-t}.$$

+ 0,4

Portanto,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} &= \mathcal{L}^{-1}\{G(s)H(s)\} = \int_0^t e^{-(t-\tau)} e^{-2\tau} d\tau \\ &= e^{-t} \int_0^t e^{-\tau} d\tau = -e^{-t} e^{-\tau} \Big|_0^t = e^{-t} - e^{-2t}. \end{aligned}$$

+ 0,6

Questão 3.

O sistema dado é um sistema linear não-homogêneo:

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{g}(t),$$

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{t}e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} \equiv \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

0,1

(a)

Autovalores:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -\frac{3}{2} - r & 1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} - r \end{vmatrix} &= 0 \\ (-\frac{3}{2} - r)(-\frac{1}{2} - r) + \frac{1}{4} &= 0 \\ r^2 + 2r + 1 = 0, \quad (r + 1)^2 &= 0 \\ r = -1 : & \quad \text{autovalor (repetido) de multiplicidade dois.} \end{aligned}$$

+ 0,3

Autovetores:

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} - (-1) & 1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} - (-1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-\frac{1}{2}a + b = 0, \quad b = \frac{1}{2}a$$

Logo, os autovetores (associados ao único autovalor $r = -1$) são da forma

$$\begin{pmatrix} a \\ \frac{1}{2}a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

+ 0,3

Tomando $a = 2$, obtemos a solução

$$\mathbf{x}^1 = e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

do sistema homogêneo associado, $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.

+ 0,4

Solução linearmente de \mathbf{x}^1 :

$$\mathbf{x}^2 = te^{-t}V_1 + e^{-t}V_2, \quad (A - (-1))V_2 = V_1, \quad V_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

+ 0,2

Calculando V_2 :

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}a + b = 2 \\ -\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b = 1 \end{cases}$$

$$-\frac{1}{2}a + b = 2, \quad b = 2 + \frac{1}{2}a.$$

Tomando $a = 0$, obtemos $V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

+ 0,3

e

$$\mathbf{x}^2 = te^{-t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2te^{-t} \\ (2+t)e^{-t} \end{pmatrix}.$$

+ 0,1

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} \mathbf{x}^1 & \mathbf{x}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} & 2te^{-t} \\ e^{-t} & (2+t)e^{-t} \end{pmatrix}$$

é uma matriz fundamental

+ 0,2

e a solução geral do sistema homogêneo é então

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= c_1\mathbf{x}^1 + c_2\mathbf{x}^2 \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}) \\ &= \begin{pmatrix} \mathbf{x}^1 & \mathbf{x}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \\ &= \Psi(t) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2e^{-t} & 2te^{-t} \\ e^{-t} & (2+t)e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

+ 0,2

(b)

$$e^{-t} \begin{pmatrix} 2 & 2t \\ 1 & 2+t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{t}e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} u'_1 + tu'_2 = \sqrt{t} \\ u'_1 + (2+t)u'_2 = 1 \end{cases}$$

$$2u'_2 = 1 - \sqrt{t}, \quad u'_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t}$$

$$u'_1 = \sqrt{t} - tu'_2 = \sqrt{t} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}t^{3/2}.$$

0,5

Uma solução particular do sistema dado (não-homogêneo):

$$\mathbf{x}_P = \Psi(t)U(t) \quad (\Psi(t)U'(t) = \mathbf{g}(t))$$

+ 0,3

$$\begin{aligned} u_1 &= \int \left(\sqrt{t} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}t^{3/2} \right) dt = \frac{2}{3}t^{3/2} - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{5}t^{5/2} \quad (+c) \\ u_2 &= \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t} \right) dt = \frac{1}{2}t - \frac{1}{3}t^{3/2} \quad (+c) \end{aligned}$$

+ 0,2

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_P &= \Psi(t)U(t) \\ &= e^{-t} \begin{pmatrix} 2 & 2t \\ 1 & 2+t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3}t^{3/2} - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{5}t^{5/2} \\ \frac{1}{2}t - \frac{1}{3}t^{3/2} \end{pmatrix} \\ &= e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \left[\frac{2}{3}t^{3/2} - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{5}t^{5/2} \right] + 2t \left[\frac{1}{2}t - \frac{1}{3}t^{3/2} \right] \\ \left[\frac{2}{3}t^{3/2} - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{5}t^{5/2} \right] + (2+t) \left[\frac{1}{2}t - \frac{1}{3}t^{3/2} \right] \end{pmatrix} \\ &= e^{-t} \begin{pmatrix} \frac{4}{3}t^{3/2} + 2\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3}t\right)t^{5/2} + \frac{1}{2}t^2 \\ \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3}t\right)t^{5/2} + \frac{1}{4}t^2 + t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

+ 0,5

Questão 4. (a) Notemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln n}.$$

Como $\frac{1}{n} \ln n = f(n)$ onde $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ e

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad (\text{L'Hospital}),$$

+ 0,3

segue que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln n} = e^0 = 1,$$

já que a função exponencial é contínua.

+ 0,2

(b) Observemos que

$$a_n = \frac{\sqrt{3} 5^{n+1} + \pi 7^{n-2}}{8^{n-1}} = 25\sqrt{3} \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1} + \frac{\pi}{7} \left(\frac{7}{8}\right)^{n-1}.$$

+ 0,3

Logo,

$$\begin{aligned}
\sum_{n=2}^{\infty} a_n &= 25\sqrt{3} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1} + \frac{\pi}{7} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^{n-1} \\
&= 25\sqrt{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{8}\right)^k + \frac{\pi}{7} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^k \\
&= 25\sqrt{3} \frac{5}{8} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{8}\right)^{k-1} + \frac{\pi}{7} \frac{7}{8} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^{k-1} \\
&= \frac{125\sqrt{3}}{8} \frac{1}{1 - \frac{5}{8}} + \frac{\pi}{8} \frac{1}{1 - \frac{7}{8}} \\
&= \frac{125}{\sqrt{3}} + \pi
\end{aligned}$$

+ 0,7

(c) Fazendo $a_k = (-1)^k \frac{k!}{k^k}$, temos

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \frac{(k+1)!}{(k+1)^{k+1}} \frac{k^k}{k!} = \frac{k^k}{(k+1)^k}$$

0,3

$$= \left(\frac{k}{k+1}\right)^k = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k}.$$

Como

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k} = \frac{1}{e} < 1,$$

+ 0,4

pelo Teste da Razão obtemos que a série é absolutamente convergente.

+ 0,3