

2,5 pts. Questão 1:

$$\begin{aligned} f_x &= 2x + 2xy = 0 \Rightarrow x(1 + y) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } y = -1. \\ f_y &= 2y + x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = -2y. \end{aligned} \quad (1)$$

$$x = 0 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} y = 0 \Rightarrow (0, 0) \text{ é um ponto crítico.}$$

$$y = -1 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \Rightarrow (\pm\sqrt{2}, -1) \text{ são pontos críticos.} \quad | 1, 5 \text{ pts.}$$

$$D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (2 + 2y)2 - (2x)^2. \quad | 0, 5 \text{ pts.}$$

$$D(0, 0) = 4 > 0 \text{ e } f_{xx}(0, 0) = 2 > 0 \Rightarrow (0, 0) \text{ é ponto de mínimo local.}$$

$$D(\pm\sqrt{2}, -1) = -8 < 0 \Rightarrow (\pm\sqrt{2}, -1) \text{ são pontos de sela.} \quad | 0, 5 \text{ pts.}$$

2,5 pts. Questão 2:

$$\begin{cases} \nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \\ g(x, y, z) = x^2 + 10y^2 + z^2 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8 = 2\lambda x & (i) \\ 0 = 20\lambda y & (ii) \\ -4 = 2\lambda z & (iii) \end{cases}$$

$$0 \stackrel{(ii)}{=} 20\lambda y \Rightarrow y = 0 \stackrel{(i),(iii)}{\Rightarrow} x = \frac{4}{\lambda} \text{ e } z = -\frac{2}{\lambda} \stackrel{g(x,y,z)}{\Rightarrow} \frac{16}{\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 5 \Rightarrow \lambda = \pm 2$$

$$\Rightarrow (2, 0, 1) \text{ e } (-2, 0, 1) \text{ são os candidatos a máximo ou mínimo.} \quad | 1, 5 \text{ pts.}$$

$$\text{Comparando } f(2, 0, 1) \text{ com } f(-2, 0, 1), \text{ temos que } f(2, 0, 1) = 20 \text{ é o máximo e}$$

$$f(-2, 0, 1) = -20 \text{ é o mínimo.} \quad | 1, 0 \text{ pts.}$$

2,5 pts. Questão 3:

$$\text{Intersecções das parábolas } x = y^2 \text{ e } x = 2 - y^2 : y^2 = 2 - y^2 \Rightarrow y = \pm 1.$$

$$\text{Disto e do fato que a região está no primeiro quadrante, ela será dada por}$$

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq 2 - y^2\}.$$

$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2-y^2} y \, dx dy \quad | 1, 5 \text{ pts.} \quad = 2 \int_0^1 y - y^3 \, dy = 2 \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{2}. \quad | 1, 0 \text{ pts.}$$

2,5 pts. Questão 4:

$$(a) \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin x^3 \, dx dy = \int_0^1 \int_0^{x^2} \sin x^3 \, dy dx = \int_0^1 x^2 \sin x^3 \, dx = -\frac{\cos x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}(1 - \cos 1). \quad | 0, 5 \text{ pts.} \quad | 0, 75 \text{ pts.}$$

$$(b) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 \cos \theta - r^2 \sin \theta \, dr d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 \cos \theta \, dr d\theta = \left(\frac{r^3}{3} \Big|_0^1 \right) \left(\sin \theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{2}{3}. \quad | 0, 5 \text{ pts.} \quad | 0, 75 \text{ pts.}$$