表示论

CosmicBlue01

2026 年 11 月 4 日

目录

1 代数 **3**

1.1 代数 3
1.2 子代数 4
1.3 子代数的交 6
1.4 代数直和 6
1.5 代数理想 7
1.6 商代数 8
1.7 代数同态 9

2 模 **11**

2.1 模 11
2.2 子模 11
2.3 子模的交 12
2.4 模的直和 12
2.5 商模 12
2.6 不可约模与不可分解模 12
2.7 模同态 13
2.8 双模 14
2.9 代数上的模 14

3 表示 **16**

3.1 表示 16
3.2 表示论的直观解释 17
3.3 表示同态 18
3.4 忠实表示 19

1 代数

1.1 代数

Definition 1.1 (K-代数) 给定域 K, 称 A 为 K 上的代数, 若:

(1) A 是 K-线性空间;

(2) 存在二元运算 $m\colon A\times A\to A$, $(a,b)\mapsto ab$, 使得

(i) 存在 $1\in A$, 使 $1\cdot a=a\cdot 1=a$, $\forall a\in A$;

(ii) $\forall a,b,c\in A$, $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$;

(iii) m 是双线性的, 即

$$\begin{aligned} a\cdot(b+c)&=a\cdot b+a\cdot c, & a\cdot(kb)&=k(a\cdot b),\\ (a+b)\cdot c&=a\cdot c+b\cdot c, & (ka)\cdot b&=k(a\cdot b), \end{aligned}$$

其中 $a,b,c\in A$, $k\in K$.

称 m 为 A 的乘法.

Example 1.2

(1) 给定数域 F, 多项式环 $F[x]$ 是 F-代数.

(2) 给定数域 F, 全体 n 阶方阵 $M_n(F)$ 是 F-代数, 称为全矩阵代数.

(3) 设 V 为 F-线性空间, 则 $\mathrm{End}(V)$ 是 F-代数.

(4) Hamilton 四元数 $\mathbb{H}=\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1,i,j,k\}$ 是 $\mathbb{R}$-代数, 其乘法表为

$\cdot$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

(5) 群代数. 给定群 G, 域 K, 记 $KG=\mathrm{span}_K\{g\mid g\in G\}$, 其中对 $g,g'\in G$, $g\cdot g'$ 用 G 中的乘法定义为 $gg'\in G$. 可以证明 KG 为 K-代数.

Example 1.3 群 $\mathbb{Z}_2=\langle g\mid g^2=1\rangle$. 作同态 $\mathbb{Z}_2\to M_2(K)$:

$$1\longmapsto\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad -1\longmapsto\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

于是

$$K\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_K \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

为群代数.

1.2 子代数

Definition 1.4 (子代数) 设 A 为 F-代数, $\emptyset \neq B \subseteq A$, 称 B 为 A 的子代数, 若:

(1) $1_A \in B$ (单位元必须和 A 中的一样);

(2) B 在 A 的运算下构成 F-代数.

Remark 1.5 群的定义中不要求子集的单位元与整个群一致, 因为乘法封闭性已经保证了这一点; 子代数则不同, 必须显式要求 $1_A \in B$.

Remark 1.6 对 Definition 1.4 中 (1) 的举例. $M_n(F)$ 和 $M_{n+1}(F)$ 为 F-代数, 存在嵌入 $\lambda\colon M_n(F) \hookrightarrow M_{n+1}(F)$, 让

$$A_{n\times n} \longmapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

在嵌入 λ 意义下 $M_n(F) \leq M_{n+1}(F)$. 但是 $M_{n+1}(F)$ 的单位元 $I_{n+1} \notin M_n(F)$, 故 $M_n(F)$ 不是 $M_{n+1}(F)$ 的子代数.

Example 1.7

(1) $F \subseteq F[x]$ 为子代数. 设 $B \subseteq F[x]$ 为子代数, 且 $1, x \in B$, 那么 $B = F[x] = \langle x \rangle$ ($\langle 1, x \rangle = F[x]$, 但一般默认 $\langle \cdot \rangle$ 包含 F, 故简记为 $\langle x \rangle$). 考虑: $\langle x^2 \rangle = \mathrm{span}_F\{1, x^2, x^4, \dots, x^{2n}, \dots\}$.

Remark 1.8 $F[x]$ 的每个子代数是否都形如 $B = \langle f_1, \dots, f_n \rangle$? 这个问题与 Hilbert 基定理有关, 此处不展开.

Example 1.9 全矩阵代数 $M_n(F)$ 的子代数:

(1) 上三角矩阵 (常记为 B) 的全体为子代数;

(2) 对角矩阵 (常记为 T) 的全体为子代数.

Example 1.10 $F\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_F \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(F)$ 为子代数.

进一步地, 可定义 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle = \{1, g, g^2\}$, 同态 $\mathbb{Z}_3 \to M_3(F)$:

$$g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$F\mathbb{Z}_3 = \operatorname{span}_F \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

于是, 对一般的 n 令 $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1\rangle = \{1, g, \dots, g^{n-1}\}$, 并把 g 映到循环置换矩阵

$$g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

即得 $\mathbb{Z}_n$ 的一个矩阵实现.

Example 1.11 (子群代数) 设 $H < G$, 则 $FH \subseteq FG$ 为子代数.

Remark 1.12 由 $FH \subseteq FG$ 不能推出 $H < G$. 反例: 取 $F = \mathbb{C}$, 仍考虑 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle$, $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{1, g, g^2\}$, 记 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$. 现考虑元素

$$a = \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) \in \mathbb{C}\mathbb{Z}_3.$$

直接计算得

$$a^2 = \frac{1}{9}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right)^2 = \frac{1}{9}\left(3 + 3\omega g + 3\omega^2 g^2\right) = \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) = a.$$

这说明 a 是幂等的. 取 $B = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{1, a\}$. 由 $a^2 = a$ 知 B 对乘法封闭, 故 $B \subseteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 为子代数, 但 $\{1, a\}$ 不是 $\mathbb{Z}_3$ 的子群. 子代数结构因此比子群丰富.

Example 1.13 四元数代数 $\mathbb{H}$ 中每个非零元都可逆. 设 $x = a + bi + cj + dk$ (a, b, c, d 不全为 0), $\bar{x} = a - bi - cj - dk$, 则

$$x^{-1} = \frac{\bar{x}}{|x|^2} = \frac{a - bi - cj - dk}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Definition 1.14 (可除代数) 称代数 A 是可除代数, 若 A 中每个非零元都有逆元.

Theorem 1.15 (Frobenius) $\mathbb{R}$ 上有限维可除代数只有 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$.

1.3 子代数的交

Proposition 1.16 设 $B_1, B_2 \subseteq A$ 为 A 的子代数, 则 $B_1 \cap B_2$ 仍为 A 的子代数.

Proof. 1_A 同时属于 B_1 与 B_2, 故 $1_A \in B_1 \cap B_2$. 设 $x, y \in B_1 \cap B_2$, $k \in F$. 因为 B_1, B_2 都是子代数, 所以 $x+y$, kx, xy 同时属于 B_1 与 B_2, 即属于 $B_1 \cap B_2$. 于是 $B_1 \cap B_2$ 在 A 的运算下构成 F-代数, 且与 A 有相同的单位元, 故为 A 的子代数. ■

1.4 代数直和

Definition 1.17 (外直和) 设 A_1, A_2 为 F-代数, A_1, A_2 的外直和记作 $A_1 \times A_2$, 定义为 A_1, A_2 的 Cartesian 积:

$$A_1 \times A_2 = \{(a_1, a_2) \mid a_i \in A_i,\ i = 1, 2\},$$

直和上运算定义如下:

$$\begin{aligned}
&\text{加法: } (a_1, a_2) + (a_1', a_2') = (a_1 + a_1', a_2 + a_2'),\\
&\text{数乘: } k \cdot (a_1, a_2) = (ka_1, ka_2),\\
&\text{乘法: } (a_1, a_2) \cdot (a_1', a_2') = (a_1 a_1', a_2 a_2'),
\end{aligned}$$

其中 $k \in F$, $a_i, a_i' \in A_i$. 直和的单位元为 $(1_{A_1}, 1_{A_2})$.

通常可将 (a_1, a_2) 写作 $a_1 + a_2$ (不是代数上的加法). 这种写法蕴含内直和的思想, 将 A_1, A_2 视为 $A_1 \times A_2$ 的子空间, 即可构造嵌入 $\lambda\colon A_1 \hookrightarrow A_1 \times A_2$, $a_1 \mapsto (a_1, 0)$, 对 A_2 类似. 内直和 (记作 $A_1 \oplus A_2$) 需满足:

(1) $\forall a \in A_1 \oplus A_2$, $\exists!\, a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$, $a = a_1 + a_2$;

(2) $A_1 \cap A_2 = \{0\}$.

在这种记法下, 有

$$a_1 + a_2 = (a_1, 0) + (0, a_2) = (a_1, a_2), \qquad a_1 \cdot a_2 = (a_1, 0) \cdot (0, a_2) = (0, 0) = 0.$$

内直和在时, 内外直和没有本质区别, 故统一记作 $A_1 \oplus A_2$, 而不加区分.

Remark 1.18 A_1, A_2 都不是 $A_1 \oplus A_2$ 的子代数. 按 Definition 1.4 的第 (1) 条, 子代数必须与 $A_1 \oplus A_2$ 有相同的单位元; 而 A_1 的单位元是 $(1, 0)$, $A_1 \oplus A_2$ 的单位元是 $(1, 1)$, 二者不同.

Example 1.19

(1) 设 $M_{n_1}(F)$, $M_{n_2}(F)$ 均为 F-代数, 则

$$M_{n_1}(F) \oplus M_{n_2}(F) = \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \,\middle|\, A \in M_{n_1}(F),\ B \in M_{n_2}(F) \right\}.$$

(2) 代数 $F[x]$. 设 $B_1 = F[x^2]$, $B_2 = F[x^3]$, 则 B_1, B_2 均为 $F[x]$ 的子代数, 空间的和 $B_1 + B_2$ 构成代数 $F\langle x^2, x^3\rangle$. B_1, B_2 没有内直和, 因为 $B_1 \cap B_2 = F[x^6] \neq \{0\}$. 此外, 外直和 $B_1 \times B_2$ 与 $F\langle x^2, x^3\rangle$ 不同构, 因为对 $b_1 \in B_1$, $b_2 \in B_2$ 有 $(b_1, 0) \cdot (0, b_2) = 0$, 这意味着 $B_1 \times B_2$ 有零因子.

1.5 代数理想

Definition 1.20 (理想) 设 A 为 F-代数, 称子空间 $I \subseteq A$ 是 A 的左 (右) 理想, 若 $AI \subseteq I$ ($IA \subseteq I$). 若 I 既是左理想, 又是右理想, 则称 I 是理想. 左理想记作 $I \trianglelefteq_l A$, 右理想记作 $I \trianglelefteq_r A$, 理想记作 $I \trianglelefteq A$.

左右的区分: 理想是" 吸收" A 中元素, 从左吸收即在乘 A 中元素, 类似定义" 右".

Remark 1.21 A_1, A_2 都是 $A_1 \oplus A_2$ 的理想.

Proof. 只证 A_1. 设 $a_1, a_1' \in A_1$, $a_2 \in A_2$, 有

$$\begin{aligned}(a_1 + a_2) \cdot a_1' &= a_1 \cdot a_1' + a_2 \cdot a_1' = a_1 \cdot a_1' + 0 = a_1 a_1' \in A_1,\\ a_1' \cdot (a_1 + a_2) &= a_1' \cdot a_1 + a_1' \cdot a_2 = a_1' a_1 + 0 = a_1' a_1 \in A_1.\end{aligned}$$

从而 $(A_1 \oplus A_2) \cdot A_1 \subseteq A_1$, 且 $A_1 \cdot (A_1 \oplus A_2) \subseteq A_1$. 故 $A_1 \trianglelefteq (A_1 \oplus A_2)$. ■

Example 1.22

(1) 考虑全矩阵代数 $M_n(F)$. 设 $I_l \trianglelefteq_l M_n(F)$, $I_r \trianglelefteq_r M_n(F)$, 那么 I_l 中元素有形式 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_i \in F^{n\times 1}$. 这些列向量中的某些为 0, 其余列任意, 即形如 (其中 0 为零列)

$$\begin{pmatrix}\alpha_{i_1} & 0 & \alpha_{i_2} & 0 & \cdots & 0 & \alpha_{i_k} & 0 & \cdots\end{pmatrix}, \qquad \alpha_{i_j} \in F^{n\times 1}.$$

类似, I_r 中元素有形式 $(\beta_1, \dots, \beta_n)^{\mathrm{T}}$, $\beta_i \in F^{1\times n}$, 这些行向量中的某些为 0, 其余行任意, 即形如 (其中 0 为零行)

$$\begin{pmatrix}\beta_{j_1}\\ 0\\ \beta_{j_2}\\ 0\\ \vdots\\ \beta_{j_k}\\ 0\end{pmatrix}, \qquad \beta_{j_i} \in F^{1\times n}.$$

设 $I \trianglelefteq M_n(F)$, 则 I 必然同时为左理想和右理想, 故只能 $I = \{0\}$ 或 $M_n(F)$.

Definition 1.23 (单代数) 称代数 A 是单代数, 若 A 没有非平凡理想 (即只有 $\{0\}$ 和 A 本身).

Theorem 1.24 $\mathbb{C}$ 上所有有限维单代数只有 $M_n(\mathbb{C})$.

Example 1.25 $\mathbb{H}$ 是单代数. 设 $I \trianglelefteq \mathbb{H}$, 若 $I \neq \{0\}$, 取 $0 \neq x \in I$. 既然 $\mathbb{H}$ 是可除代数, 故 $\exists x^{-1} \in \mathbb{H}$, 有 $x^{-1}x = x \cdot x^{-1} = 1 \in I$, $\Rightarrow I = \mathbb{H}$. 于是 $\mathbb{H}$ 的理想只有 $\{0\}$ 和 $\mathbb{H}$, 故为单代数.

Example 1.26 回忆 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle = \{1, g, g^2\}$, $F\mathbb{Z}_3 = \mathrm{span}_F\{1, g, g^2\}$. 令 $F = \mathbb{C}$, 仍取 $a = \frac{1}{3}(1 + \omega g + \omega^2 g^2)$, 其中 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$, 则 $I = \mathrm{span}_F\{a\} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{a\} \subseteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 为子空间 (不是子代数!). 下面说明 $I \trianglelefteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$. 由于 $\mathbb{Z}_3$ 交换, 只需证 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 \cdot I \subseteq I$; 又只需对基验证.

$$
\begin{aligned}
g \ \cdot a &= g \cdot \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) = \frac{1}{3}\left(g + \omega g^2 + \omega^2\right) = \frac{1}{3} \cdot \omega^2 \left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) = \omega^2 a \in I, \\
g^2 \cdot a &= g \cdot (g \cdot a) = \omega^2 \cdot g \cdot a = \omega^4 a = \omega a \in I.
\end{aligned}
$$

故 $I \trianglelefteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$.

1.6 商代数

给定代数 A, 子空间 I. 自然 A 是线性空间, 那么便可以构成商空间 A/I, 其中 $A/I = \{[a] \mid a \in A\}$, $[a]$ 为 a 的等价类, 即 $\forall a, b \in A$, $[a] = [b] \Leftrightarrow a - b \in I$. 加法与数乘在商空间 A/I 上自然良定义. 若希望 A/I 为代数, 则要在其上定义乘法. 一个自然的想法是定义

$$
A/I \times A/I \longrightarrow A/I\colon \quad ([a], [b]) \longmapsto [ab].
$$

需要验证该定义合理, 即运算结果不依赖代表元的选取. 这就要求 I 为理想. 我们说明: I 为理想时, 该运算是 well-defined 的.

Proof. 只证一边. 设 $[a] = [a']$, 要证 $[ab] = [a'b]$. 由假设有 $a - a' \in I$, 右理想条件有 $(a - a')b \in I$ $(b \in A)$, 则 $ab - a'b \in I \Rightarrow [ab] = [a'b]$. ∎

Definition 1.27 (商代数) 称在上述乘法定义下形成的代数 A/I 为 A 模去 I 形成的商代数.

Remark 1.28 I 为理想是必要的, 我们用一个例子来说明: 取全矩阵代数 $M_2(F)$, 设 $I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, x \in F \right\}$. 显然, I 为子空间而不是理想.

设

$$
a = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}
$$

在商空间 $M_2(F)/I$ 中. 由于 $i \in I$, 故 $[i] = [0]$. 按定义计算两个乘法:

$$[a] \cdot [i] = [a \cdot i] = \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right] = \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right],$$

$$[a] \cdot [0] = [a \cdot 0] = [0].$$

显然 $\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \neq [0]$, 则乘法结果依赖于代表元的选取, 此时乘法不是 well-defined 的.

Example 1.29 设 A_1, A_2 为 F-代数, 记 $A = A_1 \oplus A_2$, 那么 $A/A_1 \cong A_2$, $A/A_2 \cong A_1$.

Proof. 只证明 $A/A_1 \cong A_2$. 为方便, 写对 $\forall a = a_1 + a_2$, $a_{1,2} \in A_{1,2}$, 记 $\pi_2 a = a_2$. 取 $[a], [b] \in A/A_1$, 若 $[a] = [b]$, 那么 $a - b \in A_1$. 注意此时的 A_1 是嵌入意义下的, 即 A_1 中元素形如 $(a_1, 0)$, 于是 $\pi_2 a = \pi_2 b$. 写 $\varphi \colon A/A_1 \to A_2$, $[a] \mapsto \pi_2 a$. 由上面的说明 φ 是单射; 又 φ 显然为满射, 故 φ 为双射. 又:

$$\varphi([a][b]) = \varphi([ab]) = \pi_2(ab) = \pi_2(a)\pi_2(b) = \varphi([a])\varphi([b]), \quad \forall a, b \in A.$$

故 φ 是同态, 从而 φ 为同构, 有 $A/A_1 \cong A_2$. ■

1.7 代数同态

Definition 1.30 (代数同态) 设 A, B 为 K-代数, 称线性映射 $f \colon A \to B$ 为同态, 若:

(1) $\forall a, b \in A$, $f(ab) = f(a)f(b)$;

(2) $f(1_A) = 1_B$.

若 f 是单射, 则称 f 是单同态. 若 f 是满射, 则称 f 是满同态. 若 f 是双射, 则称 f 是同构, 此时记 $A \cong B$.

Example 1.31

(1) 线性空间 V, $\dim(V) = n$, V 有一组基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. V 上线性变换 $\sigma \in \mathrm{End}(V)$, 给出 $\sigma(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A$, $A \in M_n(K)$. $\sigma \mapsto A_\sigma$ 是代数同态 (实际上 $\mathrm{End}(V) \cong M_n(K)$).

(2) $f \colon K\mathbb{Z}_2 \to M_2(K)$,

$$1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad g \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为代数同态.

Definition 1.32 (典范同态) 设 A 是代数, $I \trianglelefteq A$, 映射 $\pi \colon A \to A/I$, $a \mapsto [a]$, 称 π 为典范同态.

Example 1.33 设 $A=K[x]$, 任取 $a_0\in K$, 记理想 $I_{a_0}=(x-a_0)$. 则 $\pi_{a_0}\colon K[x]\to K[x]/I_{a_0}$ 为典范同态. 可以考察元素的像, 以 x, x^2 为例. $x\mapsto[x]$, 由于 $I_{a_0}=(x-a_0)$, 则 $x-a_0\in I_{a_0}\Rightarrow[x]=[a_0]$. $x^2\mapsto[x^2]$, 则 $[x^2]=[x]^2=[a_0]^2=[a_0^2]$.

Theorem 1.34 (同态基本定理) 设 $f\colon A\to B$ 为代数同态, 则

(1) $\operatorname{Ker}(f)=\{a\in A\mid f(a)=0\}\trianglelefteq A$;

(2) $\operatorname{Im}(f)=\{b\in B\mid\exists a\in A,\ \text{s.t. } f(a)=b\}\subseteq B$ 为 B 的子代数;

(3) $A/\operatorname{Ker}(f)\cong\operatorname{Im}(f)$.

Proof. (1) $\forall a\in A$, $a_0\in\operatorname{Ker}(f)$, 有

$$f(a\cdot a_0)=f(a)\cdot f(a_0)=f(a)\cdot 0=0\Rightarrow a\cdot a_0\in\operatorname{Ker}(f)\Rightarrow A\cdot\operatorname{Ker}(f)\subseteq\operatorname{Ker}(f),$$
$$f(a_0\cdot a)=f(a_0)\cdot f(a)=0\cdot f(a)=0\Rightarrow a_0\cdot a\in\operatorname{Ker}(f)\Rightarrow\operatorname{Ker}(f)\cdot A\subseteq\operatorname{Ker}(f).$$

于是 $\operatorname{Ker}(f)\trianglelefteq A$.

(2) $\operatorname{Im}(f)\subseteq B$ 是显然的, 只要说明 $\operatorname{Im}(f)$ 是代数. 即 $\operatorname{Im}(f)$ 对加法, 数乘, 乘法封闭; 其余性质由 B 中自然继承. 取 $b_{1,2}\in\operatorname{Im}(f)$, 则 $\exists a_{1,2}\in A$, s.t. $f(a_{1,2})=b_{1,2}$.

由于 f 是线性映射 (参看 Definition 1.30), 故

$$b_1+b_2=f(a_1)+f(a_2)=f(a_1+a_2)\in\operatorname{Im}(f),$$
$$kb_1=kf(a_1)=f(ka_1)\in\operatorname{Im}(f),$$

其中 $k\in K$. 其次 $b_1b_2=f(a_1)f(a_2)=f(a_1a_2)\in\operatorname{Im}(f)$. 故 $\operatorname{Im}(f)$ 是 B 的子代数.

(3) 定义映射 $\varphi\colon A/\operatorname{Ker}(f)\to\operatorname{Im}(f)$, $[a]\mapsto f(a)$. 下面说明 φ 是同构. 先说明 φ 是同态: $\varphi([1])=f(1_A)=1_B$, 且

$$\varphi([a][b])=\varphi([ab])=f(ab)=f(a)f(b)=\varphi([a])\varphi([b]),$$

其中 $a,b\in A$. 故 φ 是同态. 下证 φ 是双射.

(i) φ 是单射. 设 $f(a_1)=f(a_2)\Rightarrow f(a_1-a_2)=0\Rightarrow a_1-a_2\in\operatorname{Ker}(f)\Rightarrow[a_1]=[a_2]$. 得证.

(ii) φ 是满射. $\forall b\in\operatorname{Im}(f)$, $\exists a\in A$, $f(a)=b$. 故总有 $[a]\in A/\operatorname{Ker}(f)$, s.t. $\varphi([a])=f(a)=b$.

综合以上, φ 是同构, 故 $A/\operatorname{Ker}(f)\cong\operatorname{Im}(f)$. ■

Example 1.35

(1) 设 $A=K[x]$. $\forall a\in K$, 记同态 $f_a\colon K[x]\to K[a]$, $p(x)\mapsto p(a)$. 于是 $\operatorname{Im}(f_a)=K[a]$, $\operatorname{Ker}(f_a)=(x-a)$, 从而

$$K[x]/(x-a)\cong K[a].$$

2 模

2.1 模

Definition 2.1 (左模) 设 R 为环, M 为加法群. 称 M 为一个左 R-模, 记作 ${}_RM$, 若存在运算

$$R \times M \longrightarrow M, \qquad (r, m) \longmapsto r \cdot m,$$

使得

(1) $(r_1 r_2) \cdot m = r_1 \cdot (r_2 \cdot m)$;

(2) $1_R \cdot m = m$;

(3) $(r_1 + r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m$;

(4) $r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$.

其中 $r, r_1, r_2 \in R$, $m, m_1, m_2 \in M$.

上述映射 $R \times M \to M$ 也记作 $R \curvearrowright M$, 表示 R 作用在 M 上. 类似地可定义右 R-模, 其运算为 $M \times R \to M$. 此后若不特别声明, 模均指左模.

Example 2.2 (1) 设 R 为环, 以 $(r, a) \mapsto ra$ 定义 R 在自身的左作用, 则 R 是一个左 R-模, 称为正则模.

(2) 设 R 为环, $I \trianglelefteq R$ 为理想, 以 $(r, [r']) \mapsto [rr']$ 定义 R 在 R/I 上的作用, 则 R/I 是一个左 R-模. 这里需要验证该映射是良定义的: 若 $[r] = [r']$, 则 $r - r' \in I$, 从而 $rr'' - r'r'' \in I$, 即 $[rr''] = [r'r'']$, 其中 $r, r', r'' \in R$.

(3) 取整数环 $\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 记 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$.

(4) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, 但 $\mathbb{Q}$ 不能作用在 $\mathbb{Z}$ 上. 若不然, 设 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为一个作用, 则 $1 \cdot 1 = 1$. 记 $a = \frac{1}{2} \cdot 1 \in \mathbb{Z}$, 由 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot 1 = 1$ 得 $a + a = 2a = 1$, 与 $a \in \mathbb{Z}$ 矛盾. 进一步, 设 $n > 1$, 考虑 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的作用. 令 $c = \frac{1}{n} \cdot [1]$. 由 $1 \cdot [1] = [1]$ 得

$$[1] = 1 \cdot [1] = n \cdot c = 0,$$

矛盾. 故这样的作用只在 $n = 1$ 时才可能存在.

2.2 子模

Definition 2.3 (子模) 设 M 为左 R-模, $N < M$ 为子加群. 称 N 为 M 的子模, 若对任意 $r \in R$, $n \in N$, 都有 $r \cdot n \in N$.

2.3 子模的交

Proposition 2.4 设 M_1, M_2 为左 R-模 M 的子模, 则 $M_1 \cap M_2$ 仍为 M 的子模.

Proof. 0 同时属于 M_1 与 M_2, 故 $M_1 \cap M_2$ 非空. 设 $x, y \in M_1 \cap M_2$, $r \in R$. 因为 M_1, M_2 都是子模, 所以 $x - y$ 与 $r \cdot x$ 同时属于 M_1 与 M_2, 即属于 $M_1 \cap M_2$. 故 $M_1 \cap M_2$ 为 M 的子模. ■

2.4 模的直和

Definition 2.5 (直和) 设 M_1, M_2 为左 R-模. M_1, M_2 的直和记为 $M_1 \oplus M_2$, 定义为 $M_1 \times M_2$, 其上作用为

$$R \curvearrowright M_1 \oplus M_2, \qquad (r, (m_1, m_2)) \longmapsto (r \cdot m_1, r \cdot m_2),$$

其中 $r \in R$, $(m_1, m_2) \in M_1 \times M_2$.

通常可将 (m_1, m_2) 写作 $m_1 + m_2$ (这不是加法). 在此记号下作用可写为

$$r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2.$$

2.5 商模

Definition 2.6 (商模) 设 R 为环, M 为左 R-模, $N \leq M$ 为 M 的子模. 商群 M/N 在运算 $r \cdot [m] \mapsto [rm]$ 下形成左 R-模, 其中 $r \in R$, $m \in M$. 称 M/N 为 M 模去 N 形成的商模.

Remark 2.7 加群 M 默认是 Abel 群, 因此任意子群均正规, 故商群总是存在的.

2.6 不可约模与不可分解模

Definition 2.8 设 M 为左 R-模.

(1) 称 M 是不可约的, 若 M 没有非平凡的子模, 即 M 没有除 $\{0\}$ 和 M 以外的子模. 这样的 M 也称为单模.

(2) 称 M 是不可分解的, 若 M 不能写成两个真子模的直和.

Remark 2.9 (1) 不可约模一定是不可分解模.

(2) 任何模都可以写为一些不可分解模的直和.

Example 2.10 (1) 设 $R = M_n(K)$. R 的不可约模形如 $(\alpha, 0, \ldots, 0)$, 其中 $\alpha \in K^{n \times 1}$, 即只有

第一列非零的矩阵:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 回忆 $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1 \rangle$, 记 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{n}\right)$. 取

$$e_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{-kj} g^j, \qquad U_k = \mathrm{span}_K\{e_k\}.$$

注意

$$g \cdot e_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{-kj} g^{j+1} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{m=1}^{n} \omega^{-k(m-1)} g^m = \frac{1}{\sqrt{n}}\, \omega^k \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{-km} g^m = \omega^k e_k,$$

故 U_k 为 $K\mathbb{Z}_n$ 的不可约子模. 此外直接验证可得 $e_k^2 = e_k$, $e_k e_l = 0$ $(k \neq l)$, $\sum_{k=0}^{n-1} e_k = 1$, 因此

$$K\mathbb{Z}_n = \bigoplus_{k=0}^{n-1} U_k.$$

(3) 任取左 R-模 M, 可以找到 M 的一个不可约真子模 M_1, 并有嵌入 $M_1 \hookrightarrow M$ 与满射 $M \twoheadrightarrow M/M_1$. 记 $M_1' = M/M_1$, 即

$$M_1 \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/M_1 = M_1'.$$

再以 M_1' 为起点, 取不可约真子模 $M_2 \hookrightarrow M_1'$, 得 $M_1'/M_2 = M_2'$, 如此下去, 直到所得的商模不可约为止.

Definition 2.11 (合成列) 称上述序列构成的链为 M 的一个合成列.

2.7 模同态

Definition 2.12 (模同态) 设 R 为环, ${}_RM$, ${}_RN$ 为左 R-模. 称映射 $f\colon M \to N$ 为模同态, 若

(1) $f(m_1 + m_2) = f(m_1) + f(m_2)$;

(2) $f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$.

其中 $r \in R$, $m, m_1, m_2 \in M$.

Theorem 2.13 (同态基本定理) 设 $f\colon M \to N$ 为左 R-模同态, 则

(1) $\mathrm{Ker}(f) = \{m \in M \mid f(m) = 0\}$ 为 M 的子模;

(2) $\mathrm{Im}(f) = \{n \in N \mid \exists m \in M,\ f(m) = n\}$ 为 N 的子模;

(3) $M/\operatorname{Ker}(f) \cong \operatorname{Im}(f)$.

Remark 2.14 上述定理对右 R-模同样成立.

2.8 双模

Definition 2.15 (反环) 称 R^{op} 为 R 的反环, 若

(1) 作为加群 $R^{\mathrm{op}} = R$;

(2) 对任意 $r_1, r_2 \in R^{\mathrm{op}}$, $r_1 * r_2 = r_2 r_1$,

其中 $*$ 为 R^{op} 上的乘法.

Example 2.16 (1) 考虑多项式环 $R = K[x]$. 则

$$R^{\mathrm{op}} = \{f(x) * g(x) = g(x)f(x) = f(x)g(x)\},$$

因此 $R^{\mathrm{op}} = R$.

(2) 考虑 $R = M_n(K)$. 则 $R^{\mathrm{op}} = M_n^{\mathrm{op}}(K)$, 其乘法为 $M_1 * M_2 = M_2 M_1$, 其中 $M_{1,2} \in M_n(K)$.

Proposition 2.17 M 是一个左 R-模当且仅当 M 是一个右 R^{op}-模.

Definition 2.18 (双模) 设 M 为左 R-模, 同时为右 S-模. 称 M 为一个 R-S 双模, 记作 ${}_R M_S$, 若

$$(r \cdot m) \cdot s = r \cdot (m \cdot s),$$

其中 $m \in M$, $r \in R$, $s \in S$.

Example 2.19 显然 R 本身是一个 R-R 双模, 即 ${}_R R_R$.

2.9 代数上的模

Definition 2.20 (代数上的模) 设 A 是 K-代数, M 是一个 K-线性空间. 称 M 为 A-模, 若存在运算

$$A \times M \longrightarrow M, \qquad (a, m) \longmapsto a \cdot m,$$

使得

(1) $(a_1 + a_2) \cdot m = a_1 \cdot m + a_2 \cdot m$;

(2) $(a_1 a_2) \cdot m = a_1 \cdot (a_2 \cdot m)$;

(3) $(ka) \cdot m = k(a \cdot m)$;

(4) $1_A \cdot m = m$;

(5) $a \cdot (m_1 + m_2) = a \cdot m_1 + a \cdot m_2$;

(6) $a \cdot (km) = k(a \cdot m)$.

其中 $k \in K$, $a, a_1, a_2 \in A$, $m, m_1, m_2 \in M$.

Remark 2.21 可以类似地定义子模、交、直和、商模与同态, 此处不再赘述.

Definition 2.22 (忠实模) 设 M 为 K-代数 A 上的左模. 称 M 是忠实的 (faithful), 若

$$\forall m \in M, \quad a \cdot m = 0 \implies a = 0.$$

Remark 2.23 (零化子) 称 $\{a \in A \mid a \cdot m = 0,\ \forall m \in M\}$ 为 M 的零化子, 记为 $\mathrm{Ann}_A(M)$. 则 M 忠实当且仅当 $\mathrm{Ann}_A(M) = \{0\}$.

3 表示

3.1 表示

Definition 3.1 (表示) 设 A 是一个 K-代数. A 的一个表示是一个二元组 (V,ρ), 其中

(1) V 是 K-线性空间;

(2) $\rho\colon A\to \mathrm{End}(V)$, $a\mapsto \rho(a)$ 是代数同态.

有时简称 V 为 A 的一个表示, 或称 ρ 为 A 的一个表示.

Example 3.2 (1) 由 $K\mathbb{Z}_2\to M_2(K)\cong \mathrm{End}(K^2)$,

$$\rho\colon g\longmapsto \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},$$

得到 $K\mathbb{Z}_2$ 的一个表示 (K^2,ρ).

(2) 由 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n\to \mathrm{End}(\mathbb{C})=\mathbb{C}$,

$$\rho\colon g^j\longmapsto \xi^j,\qquad \xi=\exp\left(\frac{2\pi i}{n}\right),$$

得到 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n$ 的一个表示 $(\mathbb{C},\rho)$.

Theorem 3.3 V 是 A 的一个表示当且仅当 V 是一个 A-模.

Proof. (1) 设 V 是 A 的一个表示, 有同态 $\rho\colon A\to \mathrm{End}(V)$, $a\mapsto\rho(a)$. 定义运算

$$A\times V\longrightarrow V,\qquad (a,v)\longmapsto a\cdot v:=\rho(a)(v).$$

于是

$$\begin{aligned}
(a_1+a_2)\cdot v&=\rho(a_1+a_2)(v)=(\rho(a_1)+\rho(a_2))(v)\\
&=\rho(a_1)(v)+\rho(a_2)(v)=a_1\cdot v+a_2\cdot v,\\
(a_1a_2)\cdot v&=\rho(a_1a_2)(v)=(\rho(a_1)\rho(a_2))(v)\\
&=\rho(a_1)(\rho(a_2)(v))=a_1\cdot(a_2\cdot v),\\
(ka)\cdot v&=\rho(ka)(v)=k\rho(a)(v)=k(a\cdot v),\\
1_A\cdot v&=\rho(1_A)(v)=\mathrm{Id}(v)=v,\\
a\cdot(v_1+v_2)&=\rho(a)(v_1+v_2)=\rho(a)(v_1)+\rho(a)(v_2)\\
&=a\cdot v_1+a\cdot v_2,\\
a\cdot(kv)&=\rho(a)(kv)=k\rho(a)(v)=k(a\cdot v).
\end{aligned}$$

故 V 是一个 A-模.

(2) 设 V 是 A-模, 运算为 $A\times V\to V$, $(a,v)\mapsto a\cdot v$. 定义映射 $\rho\colon A\to \mathrm{End}(V)$, $a\mapsto \rho(a)$, 其中 $\rho(a)$ 由 $\rho(a)(v)=a\cdot v$ 规定. 只需证明 ρ 是代数同态.

(1) ρ 是线性映射: $\rho(a_1+a_2)(v)=(a_1+a_2)\cdot v=a_1\cdot v+a_2\cdot v=\rho(a_1)(v)+\rho(a_2)(v)$, 即 $\rho(a_1+a_2)=\rho(a_1)+\rho(a_2)$; $\rho(ka)(v)=(ka)\cdot v=k(a\cdot v)=k\rho(a)(v)$, 即 $\rho(ka)=k\rho(a)$.

(2) ρ 保持乘法: $\rho(ab)(v)=(ab)\cdot v=a\cdot(b\cdot v)=\rho(a)(\rho(b)(v))=(\rho(a)\rho(b))(v)$, 即 $\rho(ab)=\rho(a)\rho(b)$.

故 V 是 A 的表示. ■

Definition 3.4 (群的表示) 设 G 为群, V 为 K-线性空间. 称 V 为 G 的一个 (线性) 表示, 若存在代数同态

$$\rho\colon KG\longrightarrow \mathrm{End}(V).$$

Example 3.5 (1) 设 $\rho\colon K\mathbb{Z}_2\to \mathrm{End}(K^2)\cong M_2(K)$, 其中 $\mathbb{Z}_2=\langle g\mid g^2=1\rangle$, $K^2=\mathrm{span}_K\{\alpha_1,\alpha_2\}$, $\alpha_1=(1,0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(0,1)^{\mathrm{T}}$, 且

$$\rho(g)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

规定 $g\cdot v=\rho(g)(v)$, 则

$$g\cdot\alpha_1=\rho(g)(\alpha_1)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\alpha_2,$$

$$g\cdot\alpha_2=\rho(g)(\alpha_2)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\alpha_1.$$

(2) 正则模: $K\mathbb{Z}_2\curvearrowright K\mathbb{Z}_2=\mathrm{span}_K\{1,g\}$, 记 $K\mathbb{Z}_2=V$,

$$\rho\colon K\mathbb{Z}_2\longrightarrow \mathrm{End}(V),\qquad g\longmapsto\rho(g).$$

考察 $\rho(g)$ 对基 $\{1,g\}$ 的作用: $1\mapsto g$, $g\mapsto 1$, 对应的矩阵为 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$. 可见把 g 映为该矩阵是合理的.

Proposition 3.6 任何群代数都有正则模 (都对应唯一同态).

3.2 表示论的直观解释

以矩阵来说明. 设 $\rho\colon A\to\mathrm{End}(V)$ 为表示, 取子空间 $V_1\le V$. 设 V_1 的一组基为 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_m$, 那么可以扩充为 V 的一组基 $\alpha_1,\dots,\alpha_m,\alpha_{m+1},\dots,\alpha_n$.

Definition 3.7 (子表示) 称 $\rho|_{V_1}$ 为 ρ 的子表示, 若对任意 $a\in A$, $v_1\in V_1$, 都有 $\rho(a)(v_1)\in V_1$.

此时 V_1 是 ρ-不变子空间, 且

$$\rho(a)(\alpha_1,\dots,\alpha_m,\alpha_{m+1},\dots,\alpha_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_m,\alpha_{m+1},\dots,\alpha_n)\begin{pmatrix}M_1 & C\\ 0 & M_2\end{pmatrix},$$

其中 $M_1\in M_m(K)$, $M_2\in M_{n-m}(K)$. 由于 $\rho|_{V_1}$ 只对 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 有作用, 故 M_1 描述了子表示 (在嵌入意义下); 而在商空间 V/V_1 中, V_1 的元素 (由基 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 给出) 被映为 0, 故 V/V_1 可由 M_2 描述 (在嵌入意义下).

若出现零块 0, 则必出现子表示 M_1. 因此若没有零块 0, 就找不到非平凡的子表示, 即该表示不可约.

当左上角 $C=0$ 时, 矩阵变为准对角矩阵

$$\begin{pmatrix}* & 0\\ 0 & *\end{pmatrix},$$

记 M_1 对应子空间 V_1, M_2 对应子空间 V_2, 则可写 $V=V_1\oplus V_2$, 且 $V/V_1\cong V_2$, $V/V_2\cong V_1$. 此时称表示可分解; 否则称其不可分解, 此时不会出现准对角的情形.

Example 3.8 设 $K\mathbb{Z}_2\curvearrowright K\mathbb{Z}_2=\operatorname{span}_K\{1,g\}$. 先设 $\operatorname{char}K\neq 2$, 记

$$e_1=\frac{1}{2}(1+g),\qquad e_2=\frac{1}{2}(1-g).$$

则 $V_1=\operatorname{span}_K\{e_1\}$, $V_2=\operatorname{span}_K\{e_2\}$ 均为子表示, 并且

$$\begin{aligned}g\cdot e_1&=\frac{1}{2}g\cdot(1+g)=\frac{1}{2}(g+g^2)=\frac{1}{2}(1+g)=e_1,\\ g\cdot e_2&=\frac{1}{2}g\cdot(1-g)=\frac{1}{2}(g-1)=-e_2.\end{aligned}$$

于是 $K\mathbb{Z}_2$ 可以分解为 $K\mathbb{Z}_2=V_1\oplus V_2$. 既然 $K\mathbb{Z}_2$ 有真子模, 故 $K\mathbb{Z}_2$ 可约.

再考虑 $\operatorname{char}K=2$. 此时 K 中 $1=-1$, 取 $e_1=1+g$, 有 $g\cdot e_1=e_1$, 记 $V_1=\operatorname{span}_K\{e_1\}$, 这是 $K\mathbb{Z}_2$ 的子模, 因此 $K\mathbb{Z}_2$ 同样可约. 但此时 $K\mathbb{Z}_2$ 不可分解: 否则设 $K\mathbb{Z}_2=M_1\oplus M_2$, 其中 $\dim M_1=\dim M_2=1$. 设 $M_1=\operatorname{span}_K\{\alpha_1\}$, $M_2=\operatorname{span}_K\{\alpha_2\}$, 并设 $g\cdot\alpha_1=\lambda\alpha_1$, 则 $g^2\cdot\alpha_1=\alpha_1=\lambda^2\alpha_1$, 故 $\lambda^2=1$, 即 $\lambda=1$ (因为 $-1=1$). 同理 $g\cdot\alpha_2=\alpha_2$. 于是 g 在 $K\mathbb{Z}_2$ 上为恒同映射, 特别地 $g\cdot 1=1$, 但 $g\cdot 1=g$, 矛盾. 故 $\operatorname{char}K=2$ 时 $K\mathbb{Z}_2$ 不可分解.

3.3 表示同态

模与表示本质上是一样的, 这里仅给出描述同态的不同语言. 设表示 $\rho_i\colon A\to\operatorname{End}(V_i)$, 对应运算

$$A\times V_i\longrightarrow V_i,\qquad (a,v_i)\longmapsto a\cdot v_i:=\rho_i(a)(v_i),$$

其中 $a\in A$, $v_i\in V_i$. 回忆模同态 $f\colon V_1\to V_2$ 的要求: 涉及模运算的第 2 条, 即

$$f(a\cdot m)=a\cdot f(m),\qquad a\in A,\ m\in V_1.$$

在表示的语言下可写为

$$f(\rho_1(a)(m)) = \rho_2(a)(f(m)), \qquad a \in A,\ m \in V_1.$$

3.4 忠实表示

Definition 3.9 (忠实表示) 称表示 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$ 是忠实的, 若 ρ 是单射.

Proposition 3.10 V 是忠实 A-模当且仅当 V 是忠实 A-表示.

Proof. (1) 设 V 是忠实模, 只要证明 ρ 是单射, 即 $\mathrm{Ker}(\rho) = \{0\}$. 任取 $a \in \mathrm{Ker}(\rho)$, 则 $\rho(a) = 0$, 于是 $\rho(a)(v) = 0$, $\forall v \in V$, 即 $a \cdot v = 0$. 由忠实模的定义知 $a = 0$. 故 $\mathrm{Ker}(\rho) = \{0\}$, ρ 是单射, V 是忠实表示.

(2) 设 V 是忠实表示, 且 $a \cdot v = 0$, $\forall v \in V$. 由表示的定义, 这意味着 $\rho(a)(v) = 0$, $\forall v \in V$, 即 $\rho(a) = 0$. 而 ρ 是单射, 故 $a = 0$. 因此 V 是忠实模. ■

Remark 3.11 上述命题中特意强调了" 代数", 这是因为在其他结构中结论不一定成立. 例如在群表示中表示是 $\rho\colon G \to \mathrm{End}(V)$, 而对模而言仍定义在群代数 KG 上; 扩大 ρ 的作用范围, 可能不会保证 ρ 仍是单射.

Example 3.12 设 A 是有限维代数, 则总有正则模 ${}_AA$. 若 $a \cdot b = 0$ 对一切 $b \in A$ 成立, 取 $b = 1$ 即得 $a = 0$. 故正则模一定是忠实模.

Theorem 3.13 任何有限维代数一定是某个全矩阵代数的子代数.

Proof. 设 A 为有限维代数, 则 $V = {}_AA$ 一定是忠实模, 从而 V 是忠实表示. 于是存在单同态 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V) \cong M_n(K)$. 视 ρ 为嵌入即得证. ■