Link pt raspunsuri live => complexitati spatiu si timp pt problemele discutate https://forms.office.com/r/zGVaHSErpW

Probleme CC seminar 6:

Pb_8) (discutii)

— Se da X in baza 1 => calc 3X

1'1'1'1'1' 0 1111111111111111

 $C.T. = X * 2*3X => O(X^2)$

— Se da X in baza 1 => calc X/3 111111111111 0 1111 abcabcabcabc 0 1111

 $C.T. = X/3 * (2 X) => O(X^2)$

— Se dau X, Y in baza 1 => calc X* Y

111 0 11 2 1'11 0 1'1' 2 11 1'1'1 0 1'1' 2 11 11 11

$$CT => X *[X + Y*2*(X*Y) + Y + X] => O((XY)^2)$$

(pt fiecare 1 din X) * [parcurgem X + (pt fiecare 1 din Y) * (parcurgem dus-intors rezultatul pt a mai copia o unitate din Y la final) + demarcam Y + ne intoarcem la X]

— Se dau X si Y in baza => calc catul si restul pt X/Y

X=10, Y=3

111111111 0 111 1'1'1'1111111 0 111 2 1 1'1'1'1'1'1'1'111 0 111 2 1 1 1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1 0 111 2 1 1 1

1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1' 0 **1'**1'1 2 1 1 1 3 1

```
Pt cat:
```

Pt rest:

Obs: rest < Y

C.T. =>
$$2 * (Y + X/Y) + rest * 2 * (Y + X/Y) => O(Y * max{Y, X/Y})$$

(dus-intors parcurg Y + cat) + (pt fiecare 1' din Y cu exceptia unuia) * (dus-intors

parcurgem Y + cat)

Total (cat si rest) => $O(X^2 + Y * max{Y, X/Y})$ inclus in $O((X+Y)^2)$

— se da X in baza 1 => calc radical de ordin 7 din X

$$\sqrt[7]{X} = k <=> k^7 = X$$

(incercam pe rand valori pt k)

— se dau X, Y => calc log_X(Y)

 $log_x(y)=k <=> X^k = Y$

- cu inmultiri repetate X^1, X^2... si comparam X^k cu Y
- cu impartiri repetate a lui Y la X si contorizam nr impartiri

$$2 = \log 3(9) < \log 3(12) < \log 3(27) = 3$$

(tema de gandire)

— Transformare din baza 1 in baza 2

X= 11(10) adica 1111111111 => 1011 (2)

Idee 1: cu impartiri repetate la 2 1'11'11'11'11'11' => 11 / 2 = 5 rest 1 1'1'1'1'1'1'1'1'1' => 5 / 2 = 2 rest 1

1'1'1'1'1'1'1'1'1' => 2 / 2 = 1 rest 0

1'1'1'1'1'1'1'1'1'1' => 1 / 2 = 0 rest 1

=> 1011

(pe 2 benzi) C.T. = O(logX * X)

Idee 2: pt fiecare 1 din X, il adunam modulo 2 la rezultat (initial rez=0) 1111111111

```
B0X111111
```

rez = 0

rez = 1

rez = 10

rez = 11

rez = 100

pornim de la finalul lui rez (din dreapta spre stanga)

- cat timp citim 1, scriem 0 pas stanga
- citim 0 sau B scriem 1,

(2 benzi) C.T. = O(X * logX)

— Transformare din baza 2 in baza 1

1011 => 11111111111

(citim 1) nr= 1

=> (citim 0) 2x => nr=2

=> (citim 1) 2x+1 => nr=5

=> (citim 1) 2x+1 => nr=11

1'1'1111"1"