

8. Дифференциальные уравнения в частных производных. Параболические уравнения

Простейшее параболическое неоднородное уравнение с 2 переменными имеет вид: (1)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f, \quad x \in [0, X] \text{ и } t \in [0, T], \quad (u(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq X, t = 0), \quad \text{где } u(x, t) - \text{искомая}$$

функция — решение. С практической точки зрения уравнение позволяет изучать процессы распространения тепла, фильтрации жидкости и газа в пористой среде, некоторые вопросы теории вероятностей и т.д. Уравнение может быть дополнено различными начальными условиями. В зависимости от дополнительных условий, которые описывают границы, то общую задачу можно разграничить на несколько типов:

1. Если на границах $x=0$ и $x=X$ заданы значения искомой функции $u(x, t)$: $(u(0, t) = \varphi_0(t), x=0, t>0)$ и $(u(X, t) = \varphi_1(t), x=X, t>0)$ - граничные условия первого рода, то вся задача может трактоваться как первой начально-краевой задачей для уравнения теплопроводности. В терминах теории теплообмена $u(x, t)$ – распределение температуры в пространственно-временной области, описываемой параметрами x и t , k^2 – коэффициент температуропроводности, а начальные и граничные условия с помощью функций ψ и φ задают температуру на границах $x = 0$ и $x = X$.
2. Если на границах $x=0$ и $x=X$ заданы значения искомой функции $u(x, t)$: $\frac{\partial u(0, t)}{\partial t} = \varphi_0(x), x=0, t>0$ и $\frac{\partial u(X, t)}{\partial t}, x=X, t>0$ - граничные условия второго рода и общая задача характеризуется как вторая начально-краевая задача для уравнения теплопроводности.
3. Если на границах заданы линейные комбинации искомой функции и ее производной по пространственной переменной $\alpha \frac{\partial u(0, t)}{\partial t} + \beta (u(0, t) = \varphi_0(x), x=0, t>0)$ и $\gamma \frac{\partial u(X, t)}{\partial t} + \delta (u(X, t) = \varphi_0(x), x=X, t>0)$ - граничные условия 3 рода и задача называется третьей начально-краевой задачей.

Существует два вида методов решения подобного рода уравнений:

- 1) Аналитический, при котором результат выводится различными математическими преобразованиями (один из самых популярных методов - метод разделения переменных Фурье)
- 2) Численный, при котором полученный результат соответствует действительному с заданной точностью, но который требует много рутинных вычислений и поэтому выполним только при помощи вычислительной техники (ЭВМ) (метод конечных разностей или метод сеток).

Литература: 1) Н.С. Бахвалов. Численные методы. 2) Н.Н. Меркулова, М.Д. Михайлов Разностные схемы для дифференциальных уравнений.