

TP n° 07 – Corrélation, régression linéaire et méthode des moindres carré

I Introduction

On cherche à savoir si deux quantités physiques X et Y sont liées entre elles. Exemple : dans un circuit l'intensité I et la tension U .

On dit qu'il y a corrélation entre deux variables lorsqu'elles ont tendance à varier toujours dans le même sens (si X augmente, Y a tendance à augmenter) soit toujours dans le sens inverse (si X augmente, Y a tendance à diminuer).


Pour établir le lien possible entre X et Y , on effectue n mesures qui nous donnent n couples (x_i, y_i) .

Objectif :

1. à partir de cet échantillon, on va quantifier la corrélation entre X et Y .
2. si la liaison est linéaire, c'est-à-dire si $Y = aX + b$, on va estimer l'équation de la droite.

Exemple : on a tracé le nuage de points pour quatre échantillons différents.

Pour quels exemples y'a-t-il liaison entre X et Y ? Et dans ce cas, la liaison est-elle linéaire, non-linéaire ?



II Coefficient de corrélation linéaire

II.1 La théorie

Définition. Soit X et Y deux variables. Le coefficient de corrélation linéaire est :

$$\rho(X, Y) = \frac{\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} \quad 1$$

Propriété. 1. ρ est un nombre compris entre -1 et 1.

2. Il sert à quantifier la corrélation linéaire entre X et Y :

- (a) si $\rho > 0$, les variables ont tendance à varier dans le même sens
- (b) si $\rho < 0$, les variables ont tendance à varier dans le sens inverse
- (c) si $\rho = 0$, les variables ne sont pas corrélées
- (d) $\rho = \pm 1$ si et seulement si $Y = aX + b$ (si $\rho = 1, a \geq 0$, si $\rho = -1, a \leq 0$)

1. Pas d'inquiétude, nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'est $\mathbb{E}(X)$ et $\sigma(X)$ pour faire la suite

Un estimateur de ρ est :

$$r = \frac{n \sum_{i=0}^{n-1} x_i y_i - \left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i \right) \left(\sum_{i=0}^{n-1} y_i \right)}{\sqrt{n \sum_{i=0}^{n-1} x_i^2 - \left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i \right)^2} \sqrt{n \sum_{i=0}^{n-1} y_i^2 - \left(\sum_{i=0}^{n-1} y_i \right)^2}}$$

II.2 La pratique

Exercice 1. Soit X une liste de nombres. Écrire une fonction `som` qui renvoie la somme des éléments de X :


```
>>>X=[1,2.1,7]
>>>som(X)
10.1
```

- Exercice 2.**
1. Écrire une fonction `som_carre` qui renvoie la somme des carrés des éléments d'une liste.
 2. Écrire une fonction `som_prod` qui a comme entrée deux listes de même longueur $[x_0, \dots, x_{n-1}]$ et $[y_0, \dots, y_{n-1}]$ et renvoie $\sum_{i=0}^{n-1} x_i y_i$.
 3. Enfin écrire une fonction `coeff_corr` qui a comme entrée deux listes de même longueur $[x_0, \dots, x_{n-1}]$ et $[y_0, \dots, y_{n-1}]$ et renvoie l'estimation du coefficient de corrélation linéaire r . On utilisera les fonctions des questions précédentes.
 4. Que renvoie `coeff_corr(X,X)` ? Pourquoi ?

III Méthode des moindres carrés

Si le coefficient de corrélation linéaire est "assez proche" de 1 ou -1, on cherche la droite qui passe "au plus près" du nuage de points. Pour ça, il faut se fixer un critère d'ajustement.

On projète chaque point (x_i, y_i) sur la droite parallèlement à (Oy) et on note ϵ_i l'écart obtenu.



Dans la méthode des moindres carrés, on choisit la droite qui minimise la somme des carrés des écarts :

$$\sum_{i=0}^{n-1} \epsilon_i^2.$$

La droite obtenue est appelée "droite de régression de Y sur X ".

Si la droite de régression s'écrit $y = ax + b$, de "bons" estimateurs de a et b sont :

$$\hat{a} = \frac{n \sum_{i=0}^{n-1} x_i y_i - \left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i \right) \left(\sum_{i=0}^{n-1} y_i \right)}{n \sum_{i=0}^{n-1} x_i^2 - \left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i \right)^2} \quad \hat{b} = \frac{\left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i^2 \right) \left(\sum_{i=0}^{n-1} y_i \right) - \left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i \right) \left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i y_i \right)}{n \sum_{i=0}^{n-1} x_i^2 - \left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i \right)^2}$$

Exercice 3. Écrire une fonction `dte_reg` qui a comme entrée deux listes de même longueur $[x_0, \dots, x_{n-1}]$ et $[y_0, \dots, y_{n-1}]$ et renvoie l'estimation de \hat{a} et \hat{b} .

On utilisera les fonctions précédentes.

Testez la sur (X, X) .

Exercice 4. Application :

On a les relevés suivants :

| | | | | |
|--------|------|------|------|------|
| U (V) | 1 | 2.1 | 2.9 | 4 |
| I (mA) | 0.99 | 2.06 | 3.05 | 3.98 |

Les quantités I et U sont-elles corrélées ? Si oui, quelle est l'équation de la droite de régression linéaire de U sur I ?

Que se passe-t-il si on échange I et U ? A votre avis, pourquoi ?