

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Йодомарин® 200, таблетки

Калия йодид

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочтите весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.

Данный препарат следует принимать строго в соответствии с указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии с назначениями лечащего врача или же работника аптеки.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если Вам нужна дополнительная информация или совет, проконсультируйтесь у работника аптеки.
- При появлении каких-либо побочных действий обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных действий - в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
- Если улучшение не наступило или же симптомы заболевания усугубились, обратитесь к врачу.

Содержание данного листка-вкладыша:

1. Что такое препарат Йодомарин® 200 и для чего он используется
2. Что следует знать перед приемом препарата Йодомарин® 200
3. Как принимать препарат Йодомарин® 200
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить препарат Йодомарин® 200
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое препарат Йодомарин® 200 и для чего он используется

Препарат Йодомарин® 200 применяется для:

- профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода (например, профилактика зоба в регионах с недостаточным содержанием йода в почве и воде, а также после резекции зоба, обусловленного дефицитом йода);
- лечения при зобе у новорожденных, детей, подростков, а также у взрослых в молодом возрасте.

2. Что следует знать перед приемом препарата Йодомарин® 200

Не принимайте препарат Йодомарин® 200

- Если у Вас наблюдается аллергия на калия йодид или на любой другой компонент данного препарата (перечислены в разделе 6)
- При явном повышении функции щитовидной железы (имеются жалобы)
- При скрытом повышении функции щитовидной железы (жалобы отсутствуют) в дозах, превышающих 150 мкг йода в сутки
- При наличии доброкачественной гормонообразующей опухоли, а также неконтролируемых гормонообразующих участков щитовидной железы в дозе от 300 до 1000 мкг йода в сутки (за исключением лечения в предоперационный период)

Предупреждения и меры предосторожности

Перед приемом препарата Йодомарин® 200 обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

Прием других лекарственных препаратов совместно с препаратом Йодомарин® 200

Если Вы в настоящее время принимаете, принимали в недавнем прошлом или могли принять любые другие лекарственные средства, сообщите об этом врачу или работнику аптеки.

Дефицит йода усиливает реакцию организма на медикаментозное лечение при гипертиреозе (повышенная функция щитовидной железы), в то время как избыток йода ее понижает. Поэтому перед началом лечения при гипертиреозе или во время лечения следует, по возможности, воздержаться от любого приема йода.

Вещества, поглощаемые щитовидной железой по тому же механизму, что и йодид (например, перхлорат), а также лекарственные вещества, которые сами не поглощаются, как, например, тиоцианат в концентрациях, превышающих 5 мг/дл, препятствуют поглощению йода щитовидной железой.

Поглощение йода щитовидной железой и метаболизм йода в железе стимулируется эндогенным и экзогенным тиреотропным гормоном (ТТГ).

Одновременное лечение йодом в высоких дозах, подавляющим секрецию гормонов щитовидной железы, и солями лития, применяемыми, как правило, для лечения при психических расстройствах, может способствовать развитию зоба и гипотиреоза.

Калия йодид в высоких дозах в сочетании с калийсберегающими диуретиками способен вызывать гиперкалиемию.

Беременность, период кормления грудью и детородная функция

В случае беременности или кормления грудью, а также при наличии возможной или планируемой беременности, перед приемом данного препарата обращайтесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

В период беременности и кормления грудью потребность в йоде повышается - поэтому в данный период особенно важно обеспечить достаточное поступление йода в организм. Однако йод и йодсодержащие препараты следует принимать лишь после оценки соотношения «польза/риск» и только по прямому назначению врача.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов

Соблюдения особых мер предосторожности не требуется.

В препарате Йодомарин® 200 содержится лактоза

В случае если у Вас была установлена непереносимость каких-либо видов сахара, перед применением данного лекарственного препарата проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

3. Как принимать препарат Йодомарин® 200

Данное лекарственное средство всегда следует принимать строго в соответствии с указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии с указаниями лечащего врача или работника аптеки. Если у Вас имеются сомнения, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Профилактика зоба при дефиците йода

Младенцы и дети:

По ½ таблетки препарата Йодомарин® 200 (соответствует 100 мкг йода) один раз в сутки.

Подростки и взрослые:

От ½ до 1 таблетки препарата Йодомарин® 200 (соответствует 100 – 200 мкг йода) один раз в сутки.

Беременность и период кормления грудью:

1 таблетка препарата Йодомарин® 200 в сутки (соответствует 200 мкг йода) один раз в сутки.

Профилактика повторного роста зоба по завершении медикаментозного лечения или после операции по поводу зоба, обусловленного дефицитом йода

От ½ до 1 таблетки препарата Йодомарин® 200 (соответствует 100 – 200 мкг йода) один раз в сутки.

Лечение при зобе, вызванном дефицитом йода

Новорожденные, дети и подростки:

От ½ до 1 таблетки препарата Йодомарин® 200 (соответствует 100 – 200 мкг йода) один раз в сутки.

Взрослые молодого возраста:

Рекомендовано от 1½ до 2½ таблеток препарата Йодомарин® 200 (соответствует 300 – 500 мкг йода) один раз в сутки.

Способ применения

Принимать после еды, запивая жидкостью в достаточном объеме (например, стаканом воды).

Длительность применения

- В профилактических целях препарат Йодомарин® 200 принимают, обычно, в течение нескольких лет, а нередко и в течение всей жизни.
- Для лечения при зобе у новорожденных, как правило, достаточно 2 - 4 недель. Для лечения же при зобе у детей, подростков и взрослых требуется от 6 до 12 месяцев.

Таблетку можно разделить на две части с равной дозировкой.

Если Вы приняли препарат Йодомарин® 200 в большем количестве, чем следовало

Сразу же обратитесь к врачу. Он решит вопрос о необходимости принятия соответствующих мер.

Если Вы забыли принять препарат Йодомарин® 200

Не принимайте препарат в двойной дозе для компенсации пропущенного приема.

Если Вы прервали прием препарата Йодомарин® 200

Если Вы прервали прием препарата Йодомарин® 200, например, по причине возникновения побочных эффектов, сообщите об этом своему врачу.

При возникновении дальнейших вопросов по поводу приема данного лекарственного препарата обратитесь к врачу или работнику аптеки.

4. Возможные побочные действия

Как и все лекарственные средства, данный препарат может оказывать побочные действия, которые, однако, наблюдаются не у всех пациентов.

При профилактическом применении йодида в любом возрасте, а также при терапевтическом применении у новорожденных, детей и подростков, нежелательных эффектов, как правило, не наблюдается. Однако, при наличии обширных неконтролируемых гормонообразующих участков автономии щитовидной железы и назначении йода в суточных дозах, превышающих 150 мкг, полностью исключить клинические проявления повышения функции щитовидной железы невозможно.

Очень редко (отмечаются менее чем у 1 из 10.000 пациентов)

Нарушения со стороны иммунной системы

Реакции повышенной чувствительности - такие, например, как насморк, вызванный йодом, кожные реакции (буллезная или туберозная йододерма, эксфолиативный дерматит), отек кожи или слизистых оболочек (ангионевротический отек), лихорадка, угри и припухлость слюнных желез.

Нарушения со стороны гормональной системы

При использовании для лечения при зобе у взрослых (суточная доза от 300 до 1000 мкг йода) в отдельных случаях возможно повышение функции щитовидной железы, вызванное йодом. В подавляющем большинстве случаев предпосылкой для этого является наличие гормонообразующих очагов в щитовидной железе. Обычно риску подвержены пациенты пожилого возраста, страдающие зобом в течение длительного времени.

Сообщения о побочных действиях

При появлении каких-либо побочных действий обратитесь к своему врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных действий – в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных действиях непосредственно в представительство Компании «Берлин-Хеми АГ» в Узбекистане, по адресу г. Ташкент, 100031, ул. Афросиаб, 12-а (бизнес-центр). Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь собрать больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

5. Как хранить препарат Йодомарин® 200

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

36 месяцев

Не используйте данное лекарственное средство по истечении срока его годности, указанного на наружной картонной упаковке и блистере после слов «годен до». Датой истечения срока годности считается последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не выбрасывайте никакие лекарственные препараты в канализацию или с бытовым мусором. Проконсультируйтесь с работником аптеки в отношении того, как

утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Вещества, содержащиеся в препарате Йодомарин® 200

Действующим веществом препарата является калия йодид.

В одной таблетке содержится 262 мкг калия йодида (соответствует 200 мкг йодида).

Прочие компоненты:

Лактозы моногидрат, магния карбонат основной легкий, желатин, карбоксиметилкрахмала натриевая соль (тип А), кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Внешний вид препарата Йодомарин® 200 и содержимое упаковки

Таблетки с плоскопараллельными поверхностями, белого или почти белого цвета, со скошенными кромками и насечкой для деления на одной стороне.

Блистер из ПВХ-алюминия. Первичная упаковка изготавливается из ПВХ-пленки (250 мкм, белая, жесткая) и алюминиевой фольги (20 мкм, твердая).

Препарат Йодомарин® 200 выпускается в упаковках по 100 таблеток (блистер).

Условия отпуска

Данное лекарственное средство отпускается без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и производители

Владелец регистрационного удостоверения:

Берлин-Хеми АГ (Менарини Групп)
Глиникер Вег 125
12489 Берлин
Германия

Производители:

Берлин-Хеми АГ (Менарини Групп)
Глиникер Вег 125
12489 Берлин
Германия

или

Менарини – Фон Хейден ГмбХ
Лейпцигер Штрассе 7-13
01097 Дрезден
Германия

Название и адрес организации, принимающей претензии (предложения) в отношении качества данного лекарственного средства:

Представительство Компании «Берлин-Хеми АГ» в Узбекистане
ул. Афросиаб, 12а (бизнес-центр)
Ташкент, 100031
Узбекистан