

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К АЗОВО-СИВАШСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

В.П. Коломийчук¹, В.Н. Жуков²

¹Мелитопольский государственный педагогический университет, г. Мелитополь,
Запорожская обл., ²Азово-Сивашский НПП, г. Геническ, Херсонская обл., Украина

Интереснейший Присивашский регион находится на крайнем юге материковой части Украины. Опустыненные сообщества Присивашья, в первую очередь полынно-злаковые степи (с доминированием *Artemisia taurica* Willd. и дерновинных злаков), сформировались в условиях критического дефицита влаги. Они приурочены к темно-каштановым остаточно-солонцеватым почвам. В полосе литорали они, как правило, формируются на столбчатых и призматических солонцах и создают переходные к солончаковой растительности сообщества. Считают, что данный регион является относительно молодым и сравнительно недавно (с середины плиоцена) освобожден от вод моря [2]. Растительность Присивашья на протяжении четвертичного периода переживала разнообразные этапы развития, что возможно проследить и в наше время, в первую очередь, обратив внимание на комплексность растительных группировок.

Мы придерживаемся, точки зрения Н.П. Лоскот и Г.И. Билыка [3,7], о том, что полынно-злаковые и полынные полупустынные группировки являются первичными только в экстразональном залегании – на солонцах, которые нередки на побережье полуоткрытого залива Азовского моря – Сиваша. На плакорных участках, как и в прошлом, так и кое-где в наше время, распространены бедноразнотравные дерновинно-злаковые сообщества (с доминированием в первую очередь *Agropyron pectinatum* (M.Bieb.) P. Beauv., *Festuca valesiaca* Gaudin, видов рода *Stipa* L.). Эти сообщества характерны для территории Азово-Сивашского заповедника (созданного в 1937 г.), который в 1957 году был переименован в заповедно-охотничье хозяйство, а в 1993 г. – в национальный природный парк (НПП). Детальная характеристика растительности парка, а именно островов Чурюк и Куюк-Тук, своеобразной “ботанической Мекки” в Присивашье, освещена в нескольких работах [3-6].

В результате 6 летних (1998-2003 гг.) исследований флоры и растительности Присивашского региона, а также анализа литературных источников нам удалось

провести детальную картографическую съемку Северного Присивашья в административных границах Херсонской обл. (масштаб 1:50000). Кроме того, прослежены основные пути трансформации растительности, выделены территории для дальнейшего включения в Азово-Сивашский НПП и всеукраинскую экологическую сеть, как часть Южноукраинского (Азово-Черноморского) приморско-степного экологического коридора. Также нами была составлена компьютерная база данных по флоре Северного Присивашья (насчитывает 845 видов сосудистых растений из 82 семейств), собран обширный гербарный материал (насчитывает около 2500 гербарных образцов и хранится в фондах научного гербария МГПУ (*Mel*)) и разработан стратегический план менеджмента водно-болотных угодий Сиваша [1]. Ниже подаем краткую характеристику территорий предложенных нами и В.В. Павловым [8,9] для включения в Азово-Сивашский НПП.

Острова Чурюк и Чурюк-Туб. Архипелаг, расположенный в Центральном Сиваше, площадью около 4480 га. На площади 935 га с 1927 года введен абсолютно заповедный режим охраны степных и солончаковых сообществ. На территории архипелага встречаются разной степени трансформации степные, засоленные луговые и солончаковые фитоценозы площадью около 1000 га. Ранее эти территории использовали под посев с/х культур, а также как пастбища и сенокосы, поэтому большая часть территории находится в состоянии 15-20 летней полынно-злаково-разнотравной залежи, реже встречаются молодые (3-5 летние) залежи. На неизмененных степных и солончаковых участках сохранились редкие степные (*Stipeta capillatae*, *St. lessingiana*, *St. ucrainicae*) и галофитные (*Limonietta suffruticosa*, *Ofaistoneta monandri*, *Lepidietta syvaschicae*) сообщества.

Остров Папанин. Материковый (лессовый) останец в Восточном Сиваше площадью около 1400 га. В растительном покрове острова преобладают крымскополынные и пырейно-крымскополынно-разнотравные группировки, которые сформировались в центральной части острова и занимают около 50-60% территории. Около 20% территории занимают солонцеватые сантонинскополынно-басиевые сообщества, тяготеющие к подам. На пологих склонах к Сивашу сохранились редкие степные сообщества формаций *Stipeta capillatae* и *St. lessingiana*, занимающие до 5%. Гало-псамофитная растительность сконцентрирована на аккумулятивных косах, вокруг внутренних водоемов — тростниково-рогозовые ценозы. Редкие водные сообщества формирует *Batrachium rionii* Lagger.

Остров Зеленовский. Островок в заливе Центрального Сиваша площадью 170 га вытянутый в меридиональном направлении. В растительном покрове преобладают

степные фитоценозы - житняково-типчаковые, реже встречаются редкие (*Stipeta capillatae*, *St. ucrainicae*). Основным фактором деградации степной растительности острова является нерегламентированный выпас. Западный, пониженный берег острова занимают солончаковые сообщества (*Halocnemeta strobilaceae*, *Limonieta suffruticosae*).

Урочище “Мыс Кутара”. Мыс, отделяющий Центральный от Западного Сиваша с преобладанием степных сообществ (типчаково-житняковых, реже типчаково-житняково-тырсовых), занимающими около 80 га. Данная территория характеризуется малоизмененным растительным покровом, подвергающимся стихийным пирогенным, фенисекциальным сукцессиям.

Урочище “Чонгарский под”. Пониженная центральная часть полуострова Чонгар площадью около 900 га занятая солончаковыми (солеросово-сарсазаново-петросимониевыми, сантонинскополынно-фоминовобескильницевыми) и засоленолуговыми (удлиненнопырейно-прибрежницевыми) сообществами. Вокруг артезианских скважин формируются тростниковые, тростниково-рогозовые фитоценозы.

Урочище “Сивашовский под”. Пониженный солончаковый участок площадью около 2400 га между сс. Сивашовка и Новодмитровка Новотроицкого района Херсонской области. В растительном покрове преобладают солеросово-петросимониевые, сарсазановые, реже сантонинскополынно-фоминовобескильницевые, жераросытникковые фитоценозы. Редкие фрагменты сообществ формирует эндемик Присивашья – *Puccinellia syvaschica* Bilyk. Ведущим фактором деградации растительности двух последних территорий выступает нерегламентированный выпас, который на наш взгляд следует ограничить.

Дальнейшая эффективность природоохранной деятельности в приморской полосе Азово-Черноморского региона возможна при наличии восстановления существующих ландшафтных структур с относительно сохраненным естественным комплексом, какими, например, являются фрагментированные геосистемы – острова, полуострова и косы. Эти территории являются очагами сохранения биоразнообразия степных, песчаных, солончаковых и прибрежно-водных сообществ, в границах существующих (Азово-Сивашский НПП, заказники, памятники природы) и проектируемых объектов Природно-заповедного фонда юга Украины (Приазовский и Сивашский НПП), которые в будущем войдут в Южноукраинский приморско-степной экологический коридор Панъевропейской экологической сети.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрієнко Т.Л., Коломійчук В.П. Флористичні та фітоценотичні дослідження Сивашу та ботанічні питання його менеджмент-плану // Современное состояние Сиваша. – Киев: Wetlands International–АЕМЕ, 2000. – С. 18-26.
2. Артюшенко А.Т. Растительность лесостепи и степи Украины в четвертичном периоде (по данным споропыльцевого анализа). – К.: Наукова думка, 1970. – 174с.
3. Білик Г.І. Пустельні степи // Рослинність УРСР. Степи, кам'янисті відслонення, піски. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 229-240.
4. Коломійчук В.П. Сучасний стан рослинного покриву сиваських островів Чюрюк, Куяк-Тук і Верблюдка // Заповідна справа в Україні. – 1999. – 5, вип. 2. – С. 6-8.
5. Коломійчук В.П. Рідкісні рослинні угруповання островів Сиваша // Укр.ботан.журн. – 2003. – 60, №5. – С. 540-545.
6. Коломійчук В.П. Азово-Сиваський національний природний парк / Фіторізноманіття національних природних парків України / Т.Л. Андрієнко, Р.Я. Арап, Д.П. Воронцов та ін.; під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенка. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 19-28.
7. Лоскот Н.П. К вопросу о генезисе Присивашских степей // Актуальные вопросы современной ботаники. – К.: Наукова думка. – 1976. – С. 92-100.
8. Павлов В.В. Північне Присивашся як елемент Азово-Чорноморського екокоридору // Укр.ботан.журн. – 2002. – 59, №1. – С. 89-93.
9. Павлов В.В. Флора раритетних територій Північного Присивашся // Укр.ботан.журн. – 2003. – 60, №2. – С. 203-209.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА

участника международной конференции

“Заповедное дело России: проблемы охраны и экологической реставрации степных экосистем”

Коломийчук Виталий Петрович

Кандидат биологических наук, доцент

Кафедра ботаники Мелитопольского государственного педагогического университета

72312, Украина, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Ленина, 20

Телефон – 8 (06192) 6-90-91

Электронная почта – kolomiy@mpu.melitopol.net

Название доклада – Перспективы расширения территории Азово-Сивашского НПП

Соавторы – Жуков Валерий Николаевич (директор Азово-Сивашского НПП)

Доклад на секционном заседании.

Подпись

2.03.2004 г.