

В.А.Онищенко

Ботанічна характеристика ур. Сестринівська дача (Козятинський район Вінницької області)

V.A.Onyshchenko

Botanical and zoological characteristic of the Sestrynivska dacha forest
(Koziatynsky rayon, Vinnytska oblast)

Лісовий масив, який має назву „Сестринівська дача”, знаходиться в північній частині Вінницької області, на схід від м.Козятин. Його загальна площа близько 2000 га. З північного боку ліс обмежує р.Гуйва. За геоботанічним районуванням України [1] територія **належить до**.

В північно-західній частині лісового масиву (кв. 8 Сестринівського лісництва), біля р.Гуйви знаходиться ботанічний заказник загальнодержавного значення „Сестринівська дача”.

По рослинності ... геоботанічного округу в науковій літературі є небагато даних.

Рослинність ур. Сестринівська дача в основному являє собою широколистяний ліс. В деревостані, який має невисоку зімкнутість, майже скрізь домінує *Quercus robur* (табл 1, описи 1-5), як правило значною є участь *Carpinus betulus*, інколи – *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *Fraxinus excelsior*, *Ulmus glabra*. Добре розвинутий підлісок, в якому переважає *Padus avium*, багато також іматурних екземплярів *Acer campestre* та *Ulmus glabra*. Найпоширенішими домінантами трав'яного ярусу є *Aegopodium podagraria* та *Urtica dioica*. Рослинність в наш час не зазнає значного антропогенного впливу - рекреаційне навантаження тут незначне, інтенсивність лісогосподарських заходів невисока. Однак в трав'яному ярусі є значна кількість напіврудеральних видів. Крім *Urtica dioica*, тут константно трапляються *Galium aparine*, *Chaerophyllum temulum*, *Dipsacus pilosus*. Участь весняних ефемероїдів у травостої є незначною, їх загальне проективне покриття здебільшого не досягає і 1%.

Мезофільні листяні ліси мають риси лісів лісостепової зони – тут константно наявний *Acer campestre*, і немає багатьох звичайних для лісової зони видів. Ліси мають перехідні риси між придніпровськими та подільськими – з невеликою частотою трапляються *Acer pseudoplatanus*, *Isopyrum thalictroides*, *Polygonatum latifolium*, які є диференційними видами подільських лісів по відношенню до придніпровських. Більша частина описів може бути віднесена до придніпровської асоціації *Galeobdolon-Carpinetum* Shevchik, Bakalya et V.Sl. 1996 emend., один із наявних описів (табл. 1, опис 6) – до подільської асоціації *Isopyro thalictroidis-Carpinetum* Onyshchenko 1997.

В північній частині лісу є кілька неглибоких балок з більш гігрофільною рослинністю. Тут трапляються ліси з домінуванням в деревному ярусі *Fraxinus excelsior*, а в трав'яному – *Aegopodium podagraria*. Ці ценози цікаві

наявністю тут досить рідкісних видів - *Aconitum odontandrum* і *Cimicifuga europaea*.

Вздовж північного краю лісу в периферійній частині заплави Гуйви знаходиться ліс з домінуванням *Alnus glutinosa* (опис 7). В його травостой домінує *Urtica dioica*. Ближче до русла поширені трав'яні ценози з домінуванням *Phragmites australis*.

Видовий склад описаних ясеневих та вільхових лісів відповідає союзу *Alnion incanae* Pawl. in Pawl. et Wallisch 1928 (*Alno-Ulmion* Br.-Bl. et R. Tx. ex Tekon 1948).

Із видів, занесених до Червоної книги України, в Сестринівській дачі нерідко трапляється *Lilium martagon*. Більш соцологічно цікавими є вже згадані *Aconitum odontandrum* і *Cimicifuga europaea*. Всі ці види відомі з території ботанічного заказника „Сестринівська дача”, а *Lilium martagon* відмічено і за його межами. Крім того, є вказівки про наявність у заказнику *Cypripedium calceolus* і *Platanthera bifolia* [2].

Література

1. Геоботанічне районування Української РСР (1977). Київ: Наук. думка, 1-304.
2. Географічна енциклопедія України. Т.3, К.: Українська енциклопедія, 1993. – 480 с.

Таблиця 1. Описи лісової рослинності ур. Сестринівська дача

Номер ділянки	1	2	3	4	5	6	7
Номер ділянки	31	32	33	36	37	34	35
Експозиція	-	-	-	-	-	N	-
Кругість	0	0	0	0	0	2	0
Ярус дерев	50	60	70	65	80	45	72
Ярус чагарників	10	15	15	25	15	5	2
Ярус трав	35	50	25	10	15	50	80
Кількість видів	43	31	24	27	36	35	31

D Isopyro-Carpinetum

<i>Isopyrum thalictroides</i>	.	.	.	.	+	.	.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	1	.	.	.	+	.	+

Ch, D *Alnion incanae* & *Alnion glutinosae*

<i>Alnus glutinosa</i>	.	.	.	.	.	.	5
<i>Eupatorium cannabinum</i>	.	.	.	.	.	+	.
<i>Festuca gigantea</i>	.	.	.	.	.	.	+
<i>Cirsium oleraceum</i>	.	.	.	.	.	+	.
<i>Filipendula denudata</i>	.	.	.	.	.	+	.
<i>Stellaria nemorum</i>	.	.	.	.	.	.	+

Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	+	+	.
Solanum dulcamara	.	.	.	.	.	+	+

Ch Carpinion

Carpinus betulus	3	1	+	2	2	+	.
Cerasus avium	+	1	.	1	.	1	.
Tilia cordata	+	2	.	1	4	.	1
Ranunculus cassubicus	.	.	.	.	+	.	.
Stellaria holostea	2	.	.	.	.	.	.

Ch Fagetalia sylvaticae

Galeobdolon luteum	.	.	.	.	1	.	.
Asarum europaeum	.	.	.	.	+	.	.
Ficaria verna	+	.	+	+	+	.	.
Paris quadrifolia	+	.	.	+	+	+	.
Polygonatum multiflorum	.	+	+	+	+	+	.
Anemone ranunculoides	.	.	+	.	+	.	+
Actaea spicata	.	+	.	+	.	+	.
Asarum europaeum	.	.	.	.	+	.	.
Sanicula europaea	+	.	.	.	.	.	.
Pulmonaria obscura	.	1	.	.	+	.	.
Lathyrus vernus	.	.	+	.	.	.	.
Lilium martagon	.	.	.	.	.	+	.
Stachys sylvatica	.	.	.	.	.	.	+
Ulmus glabra	3	2	1	2	2	.	+
Dryopteris filix-mas	+	+	+	.	.	.	.

Інші види

Aconitum odontandrum	.	.	.	.	.	+	.
Cimicifuga europaea	.	.	.	.	.	+	.
Acer campestre	1	2	+	+	1	2	+
Acer negundo	+	.	.	+	.	.	+
Acer platanoides	+	+	3	.	+	+	+
Aegopodium podagraria	1	2	3	1	2	4	+
Anthriscus sylvestris	.	.	.	+	.	.	.
Betula pendula	.	.	.	.	1	.	.
Brachypodium sylvatica	+	.	.	.	.	+	.
Caragana arborescens	+	.	.	.	.	.	.
Chaerophyllum aromaticum	.	+	.	.	.	.	.
Chaerophyllum temulum	.	+	+	+	1	.	2
Circaea lutetiana	+	.	.	.	.	.	.
Conium maculatum	.	.	.	.	.	.	+
Convallaria majalis	.	.	.	.	.	+	.
Corylus avellana	.	.	.	.	+	.	.
Crataegus sp.	+	+	.	.	.	+	.
Deschampsia caespitosa	.	.	.	.	.	+	.
Dipsacus pilosus	+	+	+	+	+	.	+
Dryopteris carthusiana	+	+	+	.	.	.	+
Equisetum arvense	+	.	.	.	.	.	.
Euonymus europaea	+	+	+	+	+	.	+
Euonymus verrucosa	+	.	.	+	.	.	.
Fragaria vesca	+	.	.	.	.	.	.
Fraxinus excelsior	2	1	2	.	1	4	+

Galeopsis pubescens	+	+	.	.	.	.	.
Galium aparine	1	2	+	+	2	+	2
Galium palustre	.	.	.	.	.	.	+
Geranium robertianum	+	+	.	+	+	+	.
Geum urbanum	1	+	+	+	+	.	+
Glechoma hirsuta	.	1	.	+	+	+	2
Grossularia reclinata	.	.	.	.	1	.	.
Lapsana communis	+	+	.	.	+	+	+
Lysimachia nummularia	+	+	.	.	.	+	+
Majanthemum bifolium	.	.	.	+	.	+	.
Malus sylvestris	+	.	.	.	.	.	.
Melandrium album	.	.	.	.	+	.	.
Moehringia trinervia	+	.	+	.	.	+	+
Mycelis muralis	.	.	.	.	.	+	.
Padus avium	+	1	2	3	2	1	1
Populus tremula	.	.	.	.	.	1	.
Primula veris	+	.	.	.	+	.	.
Quercus robur	4	4	4	5	4	.	.
Ribes spicatum	+	.	+	+	.	.	.
Rubus caesius	+	.	.	.	.	+	.
Sambucus nigra	1	1	+	+	1	1	1
Swida sanguinea	+	.	.	.	.	.	.
Ulmus carpinifolia	2	+	.	.	.	.	+
Urtica dioica	1	4	1	1	+	1	5
Viburnum opulus	+	+	+	+	.	+	+
Viola hirta	.	.	.	.	+	.	.

Розподіл дерев та чагарників за ярусами

Ярус дерев (>5,0 м)

Acer campestre	.	1	.	.	1	2	.
Acer platanoides	.	.	3	.	.	.	.
Acer pseudoplatanus	1	.	.	.	.	.	.
Alnus glutinosa	.	.	.	.	.	.	5
Betula pendula	.	.	.	.	1	.	.
Carpinus betulus	3	1	.	2	2	.	.
Cerasus avium	.	1	.	1	.	1	.
Fraxinus excelsior	1	.	2	.	1	4	.
Padus avium	.	.	.	.	.	1	.
Populus tremula	.	.	.	.	.	1	.
Quercus robur	4	4	4	5	4	.	.
Tilia cordata	.	2	.	1	4	.	1
Ulmus carpinifolia	2	.	.	.	.	.	.
Ulmus glabra	3	2	1	1	2	.	.

Ярус чагарників (0,5-5,0 м)

Acer campestre	1	1	+	+	1	1	+
Acer negundo	.	.	.	+	.	.	+
Acer platanoides	+	+	.	.	.	+	.
Acer pseudoplatanus	+	.	.	.	+	.	+
Caragana arborescens	+	.	.	.	.	.	.
Carpinus betulus	1	.	+	+	+	+	.
Cerasus avium	+	.	.	.	.	+	.

<i>Corylus avellana</i>	.	.	.	.	+	.	.
<i>Crataegus</i> sp.	+	+	.	.	.	.	.
<i>Euonymus europaea</i>	+	.	.	.	.	.	.
<i>Euonymus verrucosa</i>	.	.	.	+	.	.	.
<i>Fraxinus excelsior</i>	1	1	1	.	.	1	.
<i>Malus sylvestris</i>	+	.	.	.	.	.	.
<i>Padus avium</i>	+	1	2	3	2	+	1
<i>Sambucus nigra</i>	1	1	+	+	1	1	1
<i>Swida sanguinea</i>	+	.	.	.	.	.	.
<i>Tilia cordata</i>	+	1	.	.	+	.	.
<i>Ulmus carpiniifolia</i>	1	+	.	.	.	.	+
<i>Ulmus glabra</i>	1	1	1	1	+	.	+
<i>Viburnum opulus</i>	.	.	.	.	.	+	+
Ярус трав (<0,5)							
<i>Acer campestre</i>	+	+	+	+	+	+	+
<i>Acer negundo</i>	+	.	.	.	.	.	+
<i>Acer platanoides</i>	.	.	+	.	+	+	+
<i>Carpinus betulus</i>	+	+	+	.	+	.	.
<i>Cerasus avium</i>	.	.	.	+	.	.	.
<i>Crataegus</i> sp.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Euonymus europaea</i>	+	+	+	+	+	.	+
<i>Euonymus verrucosa</i>	+	.	.	.	.	.	.
<i>Fraxinus excelsior</i>	1	+	+	.	.	+	+
<i>Grossularia reclinata</i>	.	.	.	.	1	.	.
<i>Malus sylvestris</i>	+	.	.	.	.	.	.
<i>Padus avium</i>	.	+	+	1	+	.	+
<i>Populus tremula</i>	.	.	.	.	.	+	.
<i>Quercus robur</i>	.	.	+	+	.	.	.
<i>Ribes spicatum</i>	.	.	+	+	.	.	.
<i>Rubus caesius</i>	+	.	.	.	.	+	.
<i>Sambucus nigra</i>	.	+	.	+	+	.	.
<i>Solanum dulcamara</i>	.	.	.	.	.	+	+
<i>Swida sanguinea</i>	+	.	.	.	.	.	.
<i>Tilia cordata</i>	.	+	.	+	.	.	.
<i>Ulmus glabra</i>	+	+	+	+	+	.	+
<i>Viburnum opulus</i>	+	+	+	+	.	+	+

Шкала проективного покриття: + - 0%, 1 – 1-4%, 2 – 5-12%, 3 – 13-24%, 4 – 25-50%, 5 - >51%.

Автор описів – В.А.Онищенко.

1 – кв. 16, 05.09.2003+02.05.2004; 2 – кв. 12, 05.09.2003+02.05.2004; 3 – кв.8 (заказник), 05.09.2003+02.05.2004; 4 – кв. 8 (заказник), 05.09.2003+02.05.2004; 5 – 02.05.2004; 6 – кв. 8 (заказник), 05.09.2003+02.05.2004; 7 – кв. 8 (заказник), 05.09.2003+02.05.2004.