

Зміст

Слово до читача

+++Хмельниччина, незвичайний край

Дослідники природи Хмельниччини

+Рослинний світ нашого краю

+Рідкісне - бережи!

Тваринний світ нашого краю

Рідкісні види фауни

+Природно-заповідна мережа Хмельниччини

+Майбутнє заповідної мережі Хмельниччини

Додатки

Список рідкісних видів судинних рослин Хмельниччини

Список рідкісних видів тварин Хмельниччини

+Реєстр існуючих природно-заповідних територій та об'єктів області

Книга буде ілюстрована фотографіями, картосхемою природно-заповідної мережі Хмельниччини, графічними картами і рисунками.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА, НЕЗВИЧАЙНИЙ КРАЙ

*Переді мною килими чудові
Натура стеле – темнії луги,
Славути красної бори соснові
І Случі рідної веселі береги.
(Леся Українка)*

Серед областей України є різні за своєю природою – розташовані на рівнині, в горах і передгір'ях, на лісових просторах, в степовій смузі, де нині переважають агроценози. Наша Хмельниччина є незвичайним краєм. Вона увібрала в себе, здається, все, крім гір та морів. Тут є рівнинні лісові ділянки з болотами, типові подільські ділянки з розсіченим рельєфом та багатими ґрунтами, давно освоєні людиною, товтрове пасмо – прадавній утвір, диво природи, глибокі каньйоноподібні долини річок на півдні області.

Область простягається з півночі на південь на 225 км – від Полісся до долини Дністра і знаходиться у різних природних регіонах.

Більша частина території області належить до лісостепової зони і лише північний її край – до лісової – зони мішаних лісів. Це південь Поліської низовини. Ця лісова північна частина області зобов'язана своїм походженням дії льодовика. Колись льодовикові води, розливаючись на рівнині, яку пізніше назвуть Поліссям, і лишаючи на ній потужний шар відкладів, огинали підвищену територію Волинського лесового плато, утворивши на південь від нього ще одне зниження – так зване Мале Полісся. "Велике" Полісся, а саме його частина, яка називається Житомирське Полісся, з'єднується з Малим Поліссям якраз на півночі Хмельниччини. Вони – Житомирське Полісся із сходу, а Мале – із заходу утворюють досить широку заліснену і колись заболочену смугу з переважанням соснових і дубово-соснових лісів. В межах області це невелика територія – 7-8% її площі, проте дуже важлива в екологічному аспекті. Тут згладжений, суто поліський рельєф із плавними обрисами плескатих підвищень, мало врізаними річковими долинами із спокійним плином річок. Ґрунти тут переважно дерново-підзолисті, сформовані на алювіальних та водно-льодовикових відкладах, здебільшого піщані та супіщані. В межах Житомирського Полісся близько до поверхні залягають граніти Українського кристалічного щита, але на поверхню вони виходять лише в окремих місцях. Далі на захід кристалічний фундамент заглиблюється, він покритий відкладами різного віку – палеозойського, крейдового, неогенового.

Більша частина області знаходиться в межах Подільської височини. Підвищена територія на північ від Південного Бугу, але на південь від Житомирського Полісся, належить до Придніпровської височини – це її крайня західна частина. Крайня північно-західна частина області, яка

знаходиться на північ від Малого Полісся і на захід від Житомирського Полісся, належить до Волинської височини. Отже, в межах області сходяться три височини – Подільська, Придніпровська і Волинська.

Найбільші висоти в області пов'язані з товтрами. Це – скеляста гряда Західного Поділля, яка тягнеться з північного заходу на південний схід більш, ніж на 200 км (80 км знаходиться в межах Хмельницької області на території національного природного парку "Подільські Товтри"). Ширина гряди 5-6 км. Над оточуючою рівниною вона піднімається на 50-60 м. Товтри є унікальною пам'яткою геологічного минулого Землі. Вздовж зовнішнього (північно-східного) краю Карпат 15-20 млн років тому існувало тепле Галіційське (Сарматське) море. Вздовж східного його краю тягнувся бар'єрний риф, складений з решток організмів з вапняковим скелетом – літотамнієвих водоростей, моховаток, молюсків, серпул. Цей риф був перекритий молодшими породами, а пізніше ерозійні процеси прибрали з нього ці відклади, а твердіші рифові вапняки утворили систему пагорбів, які називаються товтрами. Південно-західний схил товтрового кряжу стрімкий, скелястий, а північно-східний – пологий. На Товтровій гряді наявне головне пасмо – це ланцюг масивних горбів із найбільшими абсолютними висотами і здебільшого плоскими вершинами, та невеликі бічні товтри, які мають висоту до 20-25 м. В Товтрах є карстові печери та лійки, мальовничі скелі, кам'яні поля, складені багатьма різновидами вапняків.

За межами Товтрової гряди найбільш піднятою і слабо почленованою долинами є західна частина області. Висоти вододілів на північ і південь від цієї місцевості зменшуються. В південному напрямку вони зменшуються повільно, але швидко глибшають долини. По притоках Дністра перепади висот між рівнем річки та вододілом біля неї на півдні області становлять 150-200 м. Межиріччя на півдні вузькі, річкова мережа густа, річки мають глибокі каньйоноподібні долини.

В центральній частині області більші висоти межиріч знаходяться на сході, в межах Українського кристалічного щита, хоча річки тут течуть переважно на схід. Це пов'язано з висхідними тектонічними рухами щита, які викликають поглиблення долин на сході.

По долинах в східній та північно-східній частинах області відслонюються докембрійські кристалічні породи, а по Дністру та його притоках – нижньопалеозойські породи. Вище них відслонюються породи крейдового періоду та неогену.

На Хмельниччині зареєстровано 165 річок довжиною понад 10 км. Всі річки області несуть свої води до Чорного моря. Вони належать до басейнів Дніпра, Південного Бугу, Дністра. Найбільшими річками басейну Дніпра в межах області є Горинь, Случ (яка лише на короткому відрізку протікає по краю області), притоки Случі Хомора і Корчик. Горинь – одна з найбільших приток Прип'яті. Вона бере початок біля с.Волиця у сусідній Тернопільській області. Найбільшими притоками Південного Бугу є Бужок,

Вовк, Згар, Рів, Іква. До басейну Дністра належить південна частина області. Найбільші притоки Дністра – Збруч, Жванчик, Смотрич, Студениця, Ущиця, Калюс. Вода в річках Хмельниччини з невеликою мінералізацією, гідрокарбонатно-кальцієва. Озер в області мало, більшість із них розташовані в басейні Горині. Подекуди, наприклад, на території регіонального ландшафтного парку "Мальованка", озерця, порослі мохами і болотними травами, утворилися на місці кар'єрів. Чимало на території області, особливо в її лісостеповій частині, ставків, створених при загатненні річок, та інших штучних водойм.

За своїми кліматичними умовами Хмельниччина займає проміжне положення між територіями Центральної та Східної Європи, між лісовою та лісостеповою зонами. Середня температура липня на півночі області становить 18,5°C, на півдні 19-19,5°C. Середня температура січня складає на заході -5°C, в центрі та на сході -5-6°C. Річна кількість опадів в середньому 550-600 мм – на північному заході 600-640 мм, на півдні 500-530 мм.

Досить різноманітним є ґрунтовий покрив області. На півночі на алювіальних та водно-льодовикових відкладах сформувались дерново-підзолисті ґрунти, переважно піщані та супіщані. В середній широтній смузі переважають сформовані на лесових відкладах чорноземи типові та чорноземи опідзолені. Вони займають більше половини (55%) території області. Сірі лісові ґрунти, а також світло-сірі та темно-сірі, також сформовані на лесах, займають значні площі на півночі та на півдні. Вони утворились під широколистяними лісами і займають більше третини (близько 35%) території області. На товтрах поширені дерново-карбонатні ґрунти, вони ж характерні для схилів долин річок у південній частині області. В заплавах річок переважають лучні та лучно-болотні ґрунти. Трапляються, особливо на півночі, торфово-болотні ґрунти і торфовища, переважно низинні.

Особливості клімату, рельєфу, геології, гідрографії, ґрунтового покриву обумовлюють рослинний покрив. На Хмельниччині він різноманітний і своєрідний. На жаль, більша частина природної рослинності втрачена – 62% області займають орні землі. 14% території займають ліси – цей показник близький до середнього по Україні. 6% займають луки і степи, 1% – торфовища. Більш детально про рослинний світ області, про його тваринне населення ми розповімо в цій книзі.

РОСЛИННИЙ СВІТ НАШОГО КРАЮ

Рослинність Хмельницької області досить різноманітна. Це пов'язано із високим геологічним різноманіттям цієї території та із значною протяжністю області з півночі на південь, чим обумовлюються істотні кліматичні відмінності різних її частин.

Як і на більшій частині рівнинної України, за площею в наш час на Хмельниччині переважають атропогенно значно порушені території. Так, орні землі займають в області 12 тис. кв. км. Це становить 58% загальної площі області. Серед природної і напівприродної рослинності переважають ліси - 13,8% території, луки разом із степами займають біля 13,3%, болота - 1%.

Найпоширенішими лісами є відносно темні широколистяні ліси. В їх деревостані переважають граб, ясен, дуб звичайний, рідше - липа серцелиста, клен гостролистий, явір, на порушених ділянках - осика та береза повисла. В географічному відношенні більшість видів цих лісів є європейськими видами з досить широким ареалом, ендеміків серед них немає. Види, характерні для європейських широколистяних лісів, часто називають неморальними. Серед регіонів України флористично найбагатші широколистяні ліси поширені на Поділлі, зокрема у Хмельницькій області.

Характерною особливістю темних листяних лісів є те, що у них здебільшого значного розвитку набуває група видів, яку називають весняними ефемероїдами. Це рослини, які вегетують і цвітуть недовго, навесні. Вони "поспішають" використати сонячне світло, поки не розпустилося листя на деревах. До наступної весни ці рослини існують у вигляді бульб, цибулин або кореневищ. Цвітуть вони навесні, більшість із них має досить великі і гарні квіти. За своєю продуктивністю, запасом біомаси і проективним покриттям весняні ефемероїди часто перевищують види, які вегетують влітку.

Серед темних широколистяних лісів Хмельницької області можна виділити чотири основні групи - грабово-дубові, кленово-ясенові, букові та вологі ліси з переважанням вільхи, ясена і дуба.

Найпоширенішими є ліси, які можна умовно назвати грабово-дубовими. До них можна віднести і чисті грабові ліси (вони здебільшого є наслідком рубок у грабово-дубових і грабово-ясенових лісах), а також значну частину грабово-ясенових та осикових лісів. Інколи в їх деревостані висока участь липи серцелистої або берези. Такі рослинні угруповання розвиваються на відносно багатих, переважно свіжих або вологих ґрунтах. У височинній частині області - це ґрунти із групи сірих лісових та чорноземи опідзолені, а в поліській частині області - багаті відміни дерново-підзолистих ґрунтів. Найхарактернішими видами лісів цього типу є граб, черешня, липа серцелиста, осика волосиста, зірочник ланцетолистий, рівноплідник рутвицелистий.

Грабово-дубові ліси північної частини Хмельницької області відрізняються від аналогічних лісів південної та середньої частин області. На півночі Хмельниччини ґрунти значно кисліші, тому там в широколистяних лісах часто трапляються такі відносно "кислолюбні" види, як ожика волосиста, горобина, квасениця, характерні для лісів Полісся. В більш південних регіонах ці види в лісах зникають, але з'являються деякі інші. Дуже характерним видом подільських лісів є купина широколиста. Ареал цього виду переважно балканський, зростає він і в Гірському Криму. Але, можливо, найчастіше він трапляється саме на Поділлі, в північній частині свого ареалу. Інший характерний для подільських лісів вид - арум Бессера. Навесні ця рослина привертає увагу своєрідним суцвіттям - дрібні квіти зібрані в суцвіття-початок, біля якого знаходиться великий покривний листок зеленуватого або брудно-фіолетового кольору довжиною до 10 см. Влітку листя всихає, залишається "початок" червоних плодів на безлистому стеблі. На півдні області в листяних лісах з'являються дерен (кизил), осока парвська, перлівка ряба, гордовина.

В деревостані поліських лісів, крім дуба і граба, нерідко є домішка осики, сосни. Для власне подільських лісів дуже характерні ясен, який тут часто домінує, та клен польовий. Серед весняних ефемероїдів, у поліських лісах майже завжди домінує анемона дібровна (відносно велика біла, здебільшого, шестипелюсткова квітка). Інші види ефемероїдів на Поліссі значно значно менш чисельні. Анемона дібровна є звичайним видом і в деяких лісових масивах височинної частини області, але тут дуже поширені й інші ефемероїди - анемона жовтецева (подібна до анемони дібрової, але з жовтими квітами), рівноплідник рутвицелистий (з декількома невеликими білими квітами), рясти ущільнений і порожнистий, зубниці залозиста і бульбиста, зірочки жовті та малі (вузьколисті рослини з невеликими жовтими шестипелюстковими квітами). Всі ці види трапляються і у поліській частині області, але рідше. В деяких лісових масивах середньої і південної частини області поширена цибуля ведмежа - рослина з широкими листками, подібними на листки конвалії.

Грабово-дубові ліси дещо варіюють навіть в межах одного відносно невеликого лісового масиву - на видовий склад і доміанти рослинного угруповання впливають локальна вологість ґрунту, експозиція схилу (південні схили прогріваються сильніше, ніж північні) та деякі інші фактори. На схилах, особливо тих, які мають "теплу" експозицію, в травостої часто домінує осока волосиста, яка отримала свою назву через наявність волосків, які добре помітні на краях листків. В таких лісах мало ефемероїдів. На вирівняних ділянках, де ґрунти багатші і вологіші, осока волосиста як правило не домінує і, взагалі, часто відсутня. Найтиповішими доміантами в таких місцях є яглиця і зеленчук жовтий.

В поліських грабово-дубових лісах також можна виділити кілька відмін, але, оскільки рельєф тут більш вирівняний, вони обумовлені в більшій мірі характером ґрунтотвірних порід і глибиною залягання ґрунтових вод, а не експозицією схилів. Найбільш кислі серед грабово-дубових лісів ґрунти займають угруповання, які близькі за видовим складом до дубово-соснових лісів. Вони відрізняються в інших грабово-дубових лісів наявністю таких видів, як орляк, куничник тростиновий, одинарник європейський, чорниця. Дуже часто в таких лісах трапляється сосна. В трохи багатших ґрунтових умовах ці види зникають. Як вже згадувалося, як правило, в поліських лісах, є один вид ефемероїдів - анемона дібровна. Найбагатші і відносно вологі місця вкриті лісами, які мають у своєму складі багатий набір ефемероїдів, але такі ліси в поліській частині Хмельницької області займають незначну площу.

Грабово-дубові ліси є найпоширенішими в області природними рослинними угрупованнями, тому вони добре представлені на багатьох природно-заповідних територіях. Найбільші площі грабово-дубових лісів охороняються в РЛП "Мальованка", зокрема в його заповідній зоні, в заказниках загальнодержавного значення "Іванковецький", "Циківський", "Кармалюкова гора", "Совий яр", "Княжпільський", "Панівецька дача", "Довжоцький".

Крім, грабово-дубових лісів, своєрідну групу широколистяних лісів Хмельниччини складають ліси, які можна назвати кленово-ясеновими. Вони розвиваються на багатих ґрунтах, які формуються на вапняках поблизу вершин товтр і в каньйонах деяких річок. Деревостан таких лісів чітко двоярусний. Перший завжди складений ясенем, другий - найчастіше кленом гостролистим. Інколи трапляються яворово-ясенові та грабово-ясенові деревостани. Видовий склад цих лісів добре відображає багатство ґрунтів під ними, в тому числі високий вміст у них нітратів - тут ростуть чистотіл великий, куколиця дводомна, інколи домінує кропива дводомна. З іншого боку, вапнякова основа ґрунту сприяє зростанню тут плюща. В цих лісах трапляються ділянки з домінуванням червонокнижних видів скополії карніолійської та лунарії оживаючої.

Букові ліси в Хмельницькій області знаходяться на північно-східній межі ареалу. Найбільший їх масив знаходиться на крайньому заході області в ур. Сатанівська дача на південь від Сатанова. За видовим складом вони близькі до дубово-грабових, але флористично дещо бідніші через більше затемнення. Сатанівський масив букового лісу охороняється в лісовому заказнику загальнодержавного значення "Сатанівський".

По днищах балок, в заплавах річок, зрідка - на схилах поширені широколистяні ліси з наявністю вологолюбних видів. За переважаючими в деревостані породами це переважно ліси вільхові і ясенові, інколи - дубові. Характерним видом дерев є в'яз граболистий (берест). Тут звичайними є рослини, типові й для інших широколистяних лісів - яглиця,

рясти, анемони тощо. Характерними видами цих лісів є жовтяниця черговолиста, пшінка весняна, черемха. Інколи можна зустріти й більш вололюбні види, наприклад, калюжницю болотну, вербозілля звичайне. Такі ліси поширені у всіх частинах області. Вони наявні на багатьох природно-заповідних територіях, але займають невелику площу.

При ще більшому зволоженні розвиваються заболочені вільхові ліси. В них вже практично немає видів, поширених в грабово-дубових лісах. В деревному ярусі як правило безроздільно панує вільха чорна. В трав'яному ярусі переважають осоки (найчастіше - осока гостровидна), півники болотні, очерет. Іншими характерними видами є смородина чорна, паслін солодко-гіркий, теліптерис болотний (болотна папороть), вербозілля звичайне, вовконіг європейський, калюжниця болотна. Заболочені вільшняки трапляються частіше в північній частині області, але є вони і на півдні.

Флористично дуже цінними є ліси, які можна назвати "світлими дібровами". Їх деревостан чисто дубовий, інші види дерев, якщо і є, то в незначній кількості. Слабе затінення дозволяє розвиватися багатьом світлолюбним рослинам, які не знаходять собі умов у більш темних лісах. "Світлі діброви" помітно перевищують інші ліси за видовою насиченістю. Так на 1000 кв. м такого рослинного угруповання нерідко є 50-60 видів судинних рослин, тоді як на такій же площі подільських дубово-грабових лісів - біля 45, а поліських грабово-дубових лісів - 25-30 видів. Характерні для світлих лісів види рослин трапляються також на узліссях, луках, деякі - серед степової рослинності. Дуже характерними є такі види, як дзвоники персиколисті, осока гірська, кадило сарматське, ластовень лікарський, ломиніс прямий, пахучка звичайна, анемона лісова, піретрум щитковий. В наш час так ліси трапляються відносно рідко і займають невелику площу, тому заслуговують на особливу охорону.

"Світлі діброви" поліської частини області розвиваються на відносно кислих ґрунтах, тому у їх складі трапляються чорниця, одинарник європейський, орляк. Дуже характерною рослиною цих лісів є перстач білий, або п'ятипал (ця рослина має пальчастоп'ятироздільні листки і білі квіти). "Світлі діброви" південної частини Хмельниччини формуються переважно на нейтральних і навіть на основних (карбонатних) ґрунтах і в умовах теплішого клімату. Тут характерними дібровними видами є півники угорські і злаколисті, егоніхон (горобейник) пурпурово-голубий, дерен (кизил), шоломниця висока. Ці види в області знаходяться на північній межі ареалу.

З широколистяними лісами пов'язано багато видів з Червоної книги України. Більшість із них належать до родини зозулинцевих. Це коручки чемерникова (морозниковидна), пурпурова, темночервона, булатки червона, довголиста і великоквіткова, зозулині черевички справжні, гніздівка звичайна, зозулині сльози яйцелисті, любки зеленоквіткова і дволиста, коральковець тричінадрізаний. З інших червонокнижних видів в

лісах в листяних лісах ростуть аконіт Бессера, клокичка пірчаста, лілія лісова, лунарія оживаюча, осока затінкова, скополія карніолійська, цибуля ведмежа, шафран Гейфеля.

В поліській частині Хмельниччини значні площі вкриті сосновими лісами. Сосна надає перевагу піскам. Вона добре росте і на багатших суглинкових ґрунтах, але в цих умовах не може відновлюватись внаслідок сильного затінення підросту листяними деревами. В умовах досить вологого клімату на пісках формуються кислі ґрунти, сприятливі для північних видів, таких як чорниця, брусниця, різні види грушанок, плауни. Як правило, в цих лісах добре розвинений ярус зелених мохів. Домінуючим видом мохів є найчастіше плевроцій Шребера, звичайними є види роду дикран.

При помірному зволоженні, у так званих "свіжих" умовах, розвиваються зеленомохові соснові ліси. Домінують в трав'яно-чагарничковому ярусі найчастіше чорниця або конвалія. Характерними видами цих лісів є смовдь гірська, купина пахуча, зіновать руська, дрік фарбувальний. На більш вологих ділянках ці види зникають, замість них з'являється досить високий злак - молінія голуба, яка, разом із чорницею часто домінує. При подальшому зростанні вологості ґрунту у лісах з'являються види оліготрофних боліт - пухівка піхвова, журавлина болотна, лохина, багно болотне, андромеда багатолиста. Серед мохів для таких лісів характерні не зелені, а сфагнові мохи, які ще називають "білим мохом". В найбільш сухих місцях - на верхівках піщаних пагорбів трапляються невеликі ділянки розріджених соснових лісів лишайникових. Їм властивий значний розвиток лишайникового покриву, здебільшого це види роду кладонія. Розвиток лишайників в цих умовах пояснюється тим, що їм не потрібна ґрунтова волога, якої тут дуже мало. Вони засвоюють воду з атмосферних опадів.

На дещо багатших ґрунтах формуються дубово-соснові ліси. Вони у Хмельницькій області, як і чисті соснові ліси, поширені в основному в північній її частині. Моховий покрив у цих лісах, на відміну від чистих соснових лісів, розвинений слабо. Для видового складу характерне поєднання видів соснових та широколистяних лісів. Із видів листяних лісів тут найчастіше трапляються ліщина, перлівка поникла, зірочник ланцетовидний, а із хвойнолісових - чорниця, брусниця, перестріч лучний. У вологих дубово-соснових лісах часто трапляється молінія голуба. Звичайними видами дубово-соснових лісів є орляк і конвалія. Ці два види, а також чорниця, є найбільш поширеними домінантами трав'яно-чагарничкового ярусу. Від чистих соснових лісів дубово-соснові відрізняються також добре розвинутим підліском (ярусом чагарників), у якому переважають ліщина або крушина.

Соснові та дубово-соснові ліси добре представлені на природно-заповідних територіях Славутського, Ізяславського, Шепетівського та

Полонського районів. Зокрема, велику площу вони займають в РЛП "Мальованка".

Із видів Червоної книги України з сосновими та дубово-сосновими лісами пов'язані плауни - плаун річний (плаун колючий) та діфазіаструм сплюснутий.

Степова рослинність займає в області невелику площу - кілька тисяч гектарів. Навіть до інтенсивного освоєння земель степова рослинність тут була не дуже поширеною, оскільки клімат Хмельниччини занадто вологий для цього типу рослинності. В умовах області степова рослинність тяжіє до ґрунтів, сформованих на вапняках, і до схилів південної експозиції і є не дуже стійкою - ряд ділянок при відсутності випасання і викошування мають тенденцію до заростання чагарниками і деревами. Типовими домінантами степових рослинних угруповань є вузьколисті дерновинні злаки - види родів ковила, костриця, а також осока низька.

Одними з найпоширеніших є степи з домінуванням осоки низької та типчака (типчак - збірна назва кількох дуже близьких дерновинних вузьколистих видів костриці - костриць валіської, несправжньо-далматської, несправжньоовечої, борознистої). Звичайними видами таких угруповань є маренка рожева, самосил гайовий, дзвоники сибірські, перстач пісковий. На деяких ділянках в травостої переважають ковили волосиста, пірчаста, найкрасивіша, вузьколиста. Всі види ковили занесені до Червоної книги України.

Дуже поширеними є степи з домінуванням тонконога вузьколистого. Вони є переходом до лучної рослинності і займають вологіші ділянки. Від більшості типчакових і низькоосокових степів ці угруповання відрізняються наявністю лучно-степових видів - жовтеця багатоквіткового, гадючника звичайного, конюшини гірської, суниць зелених, шолудивника Кауфмана та деяких інших. В лучних степах можна зустріти такі гарноквітучі види, як анемона лісова, суховершки великоквіткові, півники угорські. До лучних степів належать також ценози з переважанням куцоніжки пірчастої.

На кам'янистих ділянках трапляються степові ценози з домінуванням сеслерії Гейфлера та тонконога різноколірного, занесеного до Червоної книги України. Їх видовий склад відрізняється наявністю ряду петрофільних та узлісних видів - підмаренника дзвоникovidного, самосила гайового, ломиносу прямого тощо.

Трапляються на Хмельниччині і чагарникові степи. Видовий склад їх типовий для степів, але домінують не трави, а невисокі чагарники - види роду зіновать (зіноваті руська, австрійська, біла, Блоцького), рідше - види шипшини.

Ряд степових ценозів, наявних в області, занесено до Зеленої книги України - це формації ковили волосистої, ковили пірчастої, ковили найкрасивішої, мигдалю степового, осоки низької, тонконогу

різноколірного, сеслерії Гейфлера. Степи багаті на субендемичні види. Степова рослинність в Україні найбільше серед всіх типів рослинності постраждала від людської діяльності. Все це обумовило велику кількість степових видів у Червоній книзі України. На території Хмельниччини у степових ценозах, крім вже згаданих видів ковили, трапляються такі червонокнижні види, як астрагал монпельський, зіноваті біла, Блоцького і Пачоського, змієголовник австрійський, сон чорніючий, шавлія кременецька, ясенець білий та деякі інші.

Значні площі займають в області луки. Ці трав'яні ценози займають привняно із степами більш зволожені ґрунти. Більша частина лук знаходиться в заплавах річок, є суходільні луки. Колись площі, зайняті в наш час луками, були переважно вкриті лісами. З ростом чисельності населення і розвитком тваринництва ці ліси були вирубані, а землі залучені до сільськогосподарського виробництва як пасовища та сіножаті. Луки на рівнині України є нестійкими ценозами. При відсутності випасання або викошування лучні ділянки як правило швидко заростають деревами і чагарниками.

В насухіших серед лук умовах розвиваються так звані остепнені луки. У них поряд із власне лучними видами (такими як костриця лучна, тонконіг лучний, райграс високий) трапляються види, властиві і деяким степовим ценозам - гадючник звичайний, конюшина гірська, жовтець багатоквітковий, тонконіг вузьколистий. Такі рослинні угруповання трапляються по всій території Хмельницької області - у балках і на схилах долин, на підвищених ділянках заплав, займають нижні частини схилів товтр.

На ділянках з більшим зволоженням формуються так звані справжні луки з домінуванням тонконогу лучного, райграсу високого, трищетинника жовтуватого, грястиці збірної, костриці лучної. Звичайними видами цих лук є трясучка середня, конюшини лучна та повзуча, горошок плотовий, деревій звичайний, жовтець їдкий, підмаренник м'який. За межами заплав, на лесових сірих лісових ґрунтах формуються луки, видовий склад яких відображає менше багатство ґрунтів і менше зволоження. Домунують тут найчастіше куничник наземний та мітлиця тонка. Іншими характерними видами є відкаслик Біберштейна, ожика рівнинна, пахуча трава звичайна, перстач неблискухий. В північній частині області найпоширенішими домінантами справжніх лук є костриця лучна, мітлиці тонка та велетенська.

Більш вологими, ніж справжні луки, є торф'яністі луки. Найхарактернішим домінантом таких лук є щучник дернистий, з яким співдомінують (а інколи є і основними домінантами) тонконіг лучний, мітлиці собача і повзуча, осока чорна, ситник скупчений. Такі луки значні площі займають на півночі Хмельниччини, але трапляються і на решті території. Торф'яністі луки утворилися переважно на місці боліт при їх осушенні. На ще вологіших ділянках формуються рослинні угруповання з

переважанням лепешняку великого, осоки гострої, очеретянки звичайної, мітлиці повзучої, які часто називають болотистими луками.

Своєрідні луки формуються на пісках, переважно у північній частині області. Їх основними домінантами є біловус келерія сиза і булавоносець сіруватий. Із специфічних видів найчастіше трапляються тут нечуй-вітер волохатенький, верес, цмин піщаний, костриця овеча.

На луках Хмельницької області трапляються такі види з Червоної книги України: молочай волинський, астранція велика, рябчик гірський, види родів зозулинець і пальчатокорінник.

Болота поширені по всій Хмельниччині, хоча займають більшу площу і є різноманітнішими на півночі області. Ці ценози формуються в умовах надмірного зволоження, яке погіршує аерацію ґрунту, що в свою чергу приводить до гальмування розкладу органічних решток. Внаслідок цього на болотах накопичується торф.

Більшість боліт на території Хмельницької області належить до евтрофних (низинних). Це болота високого мінерального живлення. Вони формуються у зниженнях (улоговинах, заплавах, днищах балок) серед відносно багатих ґрунтів, з яких через підземні і наземні води до боліт поступає багато мінеральних речовин. На трав'яних евтрофних болотах найчастіше домінують очерет та різні види осок (гостровидна, зближена, омська, пухирчаста). Найбільш звичайними, крім домінантів, їх видами є плакун верболистий, підмаренник болотний, незабудка болотна, калюжниця болотна, хвощ річковий, жовтець повзучий. На більш обводнених ділянках ростуть теліптерис болотний, плавушник болотний, пухирник звичайний, півники болотні. Серед евтрофних боліт особливо слід відмітити ценози з домінуванням червонокнижного виду - осоки Девелла. Такі болота в області трапляються дуже рідко. Вони пов'язані з водами, багатими на кальцій і карбонати. Із інших червонокнижних видів на евтрофних болотах Хмельниччини відмічені шолудивник королівський, види роду пальчатокорінник, коручка болотна, верба чорнична. Евтрофні болота представлені на багатьох природно-заповідних територіях області. Найбільші їх площі охороняються в РЛП "Мальованка", гідрологічних заказниках загальнодержавного значення Башта, Моначинський, Моломолинецький, гідрологічному заказнику місцевого значення "Вовчанський".

Інша група боліт - оліготрофні (верхові) болота. Ці болота формуються там, де мінеральне живлення є бідним, що як правило зумовлено переважним живленням бідними (дистильованими природним шляхом) атмосферними, а не ґрунтовими, водами. В умовах такого бідного мінерального живлення може розвиватись невелика кількість видів рослин. Серед них - сфагнові мохи, що виділяють в навколишнє середовище кислоти. Це ще більше погіршує умови для рослин. Як правило, на ділянці оліготрофного болота площею 100 кв. м. зростає лише 5-9 видів судинних рослин і кілька видів мохів. Серед судинних

рослин дуже характерними є види двох близьких родин - брусницевих і вересових. Це лохина, андромеда багатоліста, журавлина болотна, багно болотне. Переважаючим видом є пухівка піхвова. Часто на оліготрофних болотах росте сосна звичайна, яка в цих умовах росте дуже повільно, і висота її рідко перевищує 4 м. Оліготрофні болота охороняються в гідрологічному заказнику загальнодержавного значення "Михельський", гідрологічних заказниках місцевого значення "Купинський", "Теребіжі", ботанічному заказнику місцевого значення "Хутірський", РЛП "Мальованка" та на деяких інших природно-заповідних територіях.

Проміжне положення між евтрофними і оліготрофними болотами займають мезотрофні болота. Вони формуються в умовах дещо багатшого живлення, ніж оліготрофні болота, але біднішого, ніж евтрофні. Для видового складу характерне поєднання видів евтрофних і оліготрофних боліт. Характерними домінантами мезотрофних боліт є осоки пухнатоплода, здута, багнова. Із дерев на таких болотах часто трапляються берези пухнаста та повисла. Характерними для мезотрофних боліт є вид з Червоної книги України шейхцерія болотна та комахоїдні рослини роду росичка. Мезотрофні болота охороняються в гідрологічному заказнику загальнодержавного значення "Михельський", гідрологічній пам'ятці природи загальнодержавного значення "Озеро Святе", заказниках "Купинський", "Теребіжі", "Хутірський", РЛП "Мальованка" та на ряді інших природно-заповідних територій північної частини області.

Прибережно-водна рослинність у Хмельницькій області представлена в основному ценозами очерету, рогозів широколистого та вузьколистого. Найбільші площі таких угруповань в наш час пов'язані з водоймами штучного походження - ставками. Справжня водна рослинність дуже різноманітна. Вона включає угруповання плаваючих рослин та угруповання прикріплених рослин - з плаваючим листям і повністю занурені. До вільноплаваючих належать угруповання рослин з родини ряскових. Найпоширенішими і часто домінуючими видами ряскових у водоймах Хмельниччини є спіродела багатокоренева і ряска мала. Із менш поширених плаваючих видів особливо слід відмітити сальвінію плаваючу. Це водна папороть, занесена до Червоної книги України. Вона також трапляється як домінант, і її угруповання занесені до Зеленої книги України. Серед ценозів прикріплених до дна рослин в Хмельницькій області поширені угруповання з домінуванням різних видів рдесників та водяних жовтеців, глечиків жовтих, латаття сніжно-білого та латаття білого, **плавушника болотного**, елодеї канадської, водяного різак алоеvidного, жабурника звичайного, куширу темно-зеленого, водопериці кільчастої. Із рідкісних водних вкорінених видів рослин утворює ценози червонокнижний **плавун щитолистий**. Водні ценози наявні на багатьох

природно-заповідних територіях області. Значні площі вони займають у гідрологічному заказнику місцевого значення "Вовчанський".

Незначною за площею, але своєрідною за видовим складом є скельна рослинність. Такі угруповання поширені переважно в південній і західній частині області. Їх видовий склад дуже залежить від освітленості скель. Так, на затінених лісових скелях, які не прогріваються на сонці і майже завжди мають достатню кількість вологи, формуються рослинні угруповання із високою участю папоротей та мохів. Специфічними, поширеними в основному на затінених вологих на скелях, видами папоротей є аспленій волосовидний, багатоніжка звичайна, пухирник ламкий, дуже рідко - листовик сколопендровий - папороть з цілісним листком. Із квіткових рослин на таких скелях найчастіше трапляються дзвоники ріповидні, герань Роберта, міцеліс муровий. Мохи найчастіше представлені такими видами, як гомалотецій Філіппе, камптотецій жовтуватий, порелла плосколиста, аномодон вусатий, плагіохіла порелловидна.

На більш освітлених місцях поширені ценози з участю іншого виду папоротей - аспленія мурового. Цей вид частіше за інші папороті можна зустріти на "скелях" штучного походження - старих кам'яних огорожах, стінах замків тощо, за що він і отримав свою назву.

Інший характер має рослинність добре освітлених скель, які розташовані як правило серед степової рослинності. Для них характерні цибулі гірська та подільська, очитки їдкий та Рупрехта, молодило руське, кардамінопсис пісковий, ауринія скельна, перлівка трансільванська, перстач пісковий, підмаренник дзвоникovidний, щибрушка польова, види роду чебрець. Нерідко тут ростуть степові види - костриця валіська (типчак), келерія гребінчаста, осока низька та ін. Серед папоротей часто у таких угрупованнях трапляється тільки аспленій муровий. Мохи для відкритих скель менш характерні, ніж для затінених. Серед них найчастіше трапляються тортула сільська, тортела скручена, псевдолескея ланцюжкова. Як правило на незатінених скелях великого розвитку набувають лишайники. Із видів рослин, занесених до Червоної книги України, зі скельною рослинністю пов'язані такі дуже рідкісні види, як аспленій чорний, цибуля пряма, шивереція подільська. Більшість наявних в області скель і відповідно скельних рослинних угруповань зосереджені на території НПП "Подільські Товтри", зокрема в ландшафтних заказниках загальнодержавного значення "Іванковецький", "Івахновецький", "Сатанівський", "Велика і Мала Бугаїха", геологічний пам'ятці природи "Смотрицький каньйон" та ін.

ЗЕЛЕНІ ЦІЛИТЕЛІ

В наш вік полімерів, генної інженерії та комп'ютерних технологій людина все більше уваги звертає на лікарські рослини, все сильніше вірить в їх цілющу силу. Природа сотні і тисячі років постачає людям надійні ліки, які не викликають, на відміну від синтетичних, побічних дій. Зелені цілителі допомагають позбутися важких недуг тисячам хворих. Віковий народний досвід траволікування визнаний як в Україні, так і в цілому світі. І яких би чудес ми не чекали від лабораторій та заводів, скромні рослини лісів, лук, боліт ще довго служитимуть людству.

Спонтанна флора судинних рослин України налічує понад 5310 видів, значна частина їх має лікувальні властивості. Багато цілющих трав має рослинний світ Хмельниччини.

Наводимо список рослин, які заготовляються у Хмельницькій області:

- Береза (бруньки);
- Бузина чорна (квіти);
- Глечики жовті;
- Глід, плоди;
- Горобина звичайна, плоди;
- Деревій звичайний, трава;
- Дуб звичайний, кора;
- Звіробій звичайний, трава;
- Кропива дводомна, трава;
- Крушина ламка, кора;
- Лепеха звичайна, кореневище;
- Липа серцелиста, квіти;
- Материнка звичайна, трава;
- Підбіл звичайний, трава;
- Пижмо звичайне, трава;
- Подорожник великий, трава;
- Полин гіркий, трава;
- Спориш звичайний, трава;
- Сосна звичайна, бруньки;
- Сухоцвіт звичайний, трава;
- Суниці лісові, плоди;
- Хвощ польовий, трава;
- Чорниця лісова, плоди;
- Цмин пісковий, трава;
- Череди трироздільна, трава;
- Чистотіл великий, трава;
- Фіалка триколірна, трава;
- Шипшина собача, плоди.

Проте останнім часом популяції лікарських рослин зменшуються. В області різко скорочуються запаси аїру болотного, цмину піщового. Майже вичерпані запаси синюхи голубої, золототисячнику малого, кадила сарматського, валеріани лікарської, латаття сніжно-білого, вахти трилистої. Ряд видів лікарських рослин занесені до Червоної книги України - це арніка гірська, беладонна звичайна, плаун-баранець, цибуля ведмежа, лілія лісова, скополія карніолійська, орхідні.

Зелені цілителі лісів

Конвалія травнева. Зростає в широколистяних, хвойних та мішаних лісах. Часто утворює суцільні зелені килими. Вона багаторічна, має повзуче галузисте кореневище, від якого виходять 2-3 продовгуваті-еліптичні листки. Зацвітає на 2-3 році життя. Після цього знову настає перерва в цвітінні на 2-3 роки. Ось чому на місцях, де конвалія утворює суцільні килими, завжди багато пагонів і мало квітів. Квіткова стрілка пряма, по мірі зацвітання дугоподібно схиляється донизу. Квіти - сніжно-білі дзвоники з трохи відігнутими зубчиками, зібрані в китицю. Листки ніби охороняють тендітні суцвіття. Це - найбільш вишукані та духмяні квіти весни. Містять багато ефірних масел, які використовують для виготовлення есенцій та парфумів. Плід - червона ягода.

Людина здавна знала про цілющі властивості конвалії. В минулому цю рослину вважали символом медицини. Як лікарську сировину використовують квіти та листя. В офіційній медицині конвалію травневу застосовують для лікування захворювань серця. Вона містить до 20 серцевих глікозидів, головний з них - конваллатоксин. В народній медицині квіти рослини вживають значно ширше - для лікування водянки, епілепсії, базедової хвороби, захворювань очей. Вся рослина, особливо ягоди, отруйна. Не вживайте її для самолікування.

Купина пахуча, соломонава печать. Ця гарна багаторічна рослина зростає в соснових, мішаних лісах, серед чагарників.

Купена має досить товсте, вузлувате кореневище. На поперечному його зрізі є чіткий округлий слід - "печать Соломона". Це місце, від яких раніше відходили пагони. З кореневища щороку розвиваються квітконосні пагони, які залишають на ньому своєрідні сліди. Стебло заввишки 13-45 см. Листки досить широкі, продовгуваті-овальні, стеблообіймаючі, повернені в один бік. Цвіте в травні-червні. Квіти білі, на повислих квітоніжках. Плоди - синюваті-чорні ягоди.

Всі частини рослини і особливо плоди містять серцеві глікозиди, характерні і для конвалії травневої. - конвалларин, конваллатоксин, конвалламарин. В листках міститься багато вітаміну С, флавоноїди, в кореневищах - слизу, крохмалю, алкалоїдів, моносахаридів.

Купена має відхаркуючу, протизапальну, кровоспинну, кровоочисну, рвотну, обволікаючу дію. Рослина отруйна! Її не слід вживати для самолікування.

Тибетська медицина застосовує купену для лікування гінекологічних захворювань та як засіб, що продовжує життя.

Барвінок малий. Народні назви: барвінзілля, зеленка, хрещатий барвінок. Назва "барвінок" походить від латинського слова "вінцере", що означає "зв'язувати". Його пагони швидко вкорінюються і утворюють мальовничий суцільний килим. На півночі області в дубово-соснових лісах такі килими займають цілі квартали. Рослина також зростає в дубово-грабових лісах, галявинах, серед чагарників.

Це багаторічний вічнозелений чагарничок з супротивними блискучими темно-зеленими продовгуватими листками, в пазухах яких розвиваються квіти. Вони сині з п'ятироздільною чашечкою та лійковидним віночком. Тичинок п'ять. Стебло лежаче, галузисте, до 60 сантиметрів завдовжки. Пагони, що квітують, прямостоячі, заввишки до 15 сантиметрів. Цвіте в травні - червні. Плодоносні особини трапляються рідко.

Барвінок малий здавна використовувався в медицині. Про його цілющі властивості писали ще античні мудреці Пліній Старший та Діоскорид. Вічнозелені пагони барвінку та здатність їх легко вкорінюватись привернули до себе увагу людей в середні віки. Рослину вважали символом вічності та постійності. Велику популярність набув барвінок в кінці 18 століття, після того, як про нього написав Жан Жак Руссо в автобіографічній праці "Сповідь". Це улюблена рослина письменника-філософа.

До цього часу барвінок зберігся в українських народних піснях, весільних обрядах. Його листя та синьоокі квіти здавна слугують окрасою на весіллях. Його вінки одягають на голови наречених, ним оздоблюють гільце та коровай. Барвінок кладуть біля новонародженого.

В офіційній медицині рослину використовують як в'язучий, кровоспинний, ранозагоюючий та кровоочисний засіб. Алкалоїд вінкамін, виділений із листків барвінку, входить до препаратів "Девінкан", "Вінкапан", "Вікатон", якими лікують деякі форми гіпертонії та невrogenну тахікардію. Напаром квіток жінки вмивають обличчя, щоб шкіра була м'якою та оксамитово-ніжною. Рослина отруйна, самолікування небезпечне.

Брусниця звичайна. Народні назви: брусничник, бруслина, борівка. Назву цієї рослини В.І. Даль в своєму "Толковом словаре великорусского языка" пов'язує зі словом "брусьяный", що означає "червоний, багряний". Саме такі багряні китиці ягідок дає брусниця.

В соснових зеленомохових, соснових чорницево-зеленомохових лісах, на торфових болотах зростає цей невеличкий чагарничок, заввишки до 25 см. Він має вічнозелені, шкірясті, голі, листочки. Зверху вони темно-зелені, знизу - бліді з бурими залозками. Краї листків злегка загорнуті вниз. Квіти білі, блідо-рожеві, келихоподібні, зібрані в суцвіття кисть. Довге, до 18 м, шнуровидне кореневище тягнеться від кущика до

кущика брусниці. В умовах Хмельниччини рослина плодоносить слабо, насінням розмножується рідко. Цвіте в травні-червні.

Як лікарську сировину використовують листки та плоди рослини. Листки діють антисептично, сечогінно, протизапально, що зумовлено наявністю в них фенольного глікозиду арбутину, урсолової кислоти та фітонцидів. Арбутин, розпадаючись в організмі, здійснює дезинфікуючу дію. Фітонциди пригнічують ріст золотистого стафілококу. Препарати листків брусниці діють солерозчинно, в'язуче. Їх застосовують при лікуванні пієлонефриту, циститу, нирково-кам'яної хвороби, подагри, хвороб печінки, поліартриту, ревматизму, нічного нетримання сечі. Плоди ефективні як протицинготний, вітамінний та загальнозміцнюючий засіб. Їх використовують для лікування туберкульозу, опіків. З листків брусниці готують запашний вітамінний чай.

Буквиця лікарська. Латинська назва роду "бетоніка" походить від кельтських слів, що в перекладі означають "гарна голова" і вказують на великі яскраві суцвіття рослини.

Буквицю можна зустріти на галявинах, узліссях широколистяних та мішаних лісів. Це багаторічна тра'яниста рослина, заввишки 30-100см, з прямим чотиригранним стеблом, черешковими продовгуватояйцевидними пилчастими листками, вкритими волосками. Здалека видніються її великі пурпурно-червоні суцвіття. Квіти сидять в пазухах верхніх листків кільцями, зібраними в колосовидне суцвіття. Плід - горішок. Рослина має сильний своєрідний запах, солонувато-гіркий терпкий смак. Цвіте в червні-липні.

Як лікарську сировину використовують пагони, листки, кореневища та корені. Вони містять гіркі та дубильні речовини (стахідрин, холін, бетоніцин), алкалоїди, слиз.

Про цілющі властивості цієї рослини знали ще древні римські лікарі. Один з них - Антоній Муза - вилікував буквицею імператора Августа, за що отримав велику нагороду, і ще при житті йому був поставлений мармуровий пам'ятник. Діоскорид та Гален вважали рослину могутнім лікарським засобом від усіх хвороб. Італійське прислів'я говорить: "Продай шубу, купи буквицю", вказуючи на лікарську цінність цієї рослини. Про неї, як засіб лікування шлункових хвороб, писав відомий російський полководець О.В.Суворов у книзі "Науки побеждать".

В наш час буквицю використовують у вигляді настоїв та відварів при бронхітах, бронхіальній астмі, коклюші, гіпертонії, кардіосклерозі, мігрені, захворюваннях печінки, жовтусі, захворюваннях нирок, водянці, подагрі, ревматизмі, кишковій коліці, гастриті з підвищеною кислотністю, метеоризмі. Настій трави з медом застосовують як ранозагоюючий засіб. Відвар коренів п'ють при нервових хворобах. Кореневища використовують як послаблюючий та рвотний засіб. Буквиця виводить з організму радіонукліди.

Перстач прямостоячий. З давніх часів відома ця рослина в західній Європі, про її лікувальну силу згадується в німецьких середньовічних травниках. У нас на Україні перстач називають "калган", "куряче зілля", "кровляник", "дубравка", "підойма", "шептуха". Латинська назва - *potentilla* - зменшуване від *potentia* - "сила" та українська назва "підойма" - пов'язані з тим, що перстач має загальний тонізуючий вплив на виснажений організм. Люди здавна збирали кореневища і тримали їх на випадок хвороби або в сухому вигляді, або настояними на горілці.

Про цілющу силу рослини складено чимало легенд. Одна з них пов'язана з ім'ям Іллі Муромця. Перед вирішальною битвою з Солов'єм-розбійником Ілля вийшов на берег великого озера, де росло багато трави-шептухи, припав до землі, вдихнув запах її коріння і відчув в собі силу безмірну.

Ця невелика трав'яна рослина зростає на вологих галявинах та узліссях розріджених хвойних та мішаних лісів, вологих луках, схилах. Стебла прямостоячі і тонкі, до верху галузисті. Стеблові листки сидячі, трійчасті з двома прилистками, тому здаються п'ятипальчастими. В період цвітіння прикореневі листки відсутні. Квіти жовті. Віночок має чотири пелюстки, чим відрізняється від інших видів перстачу.

Кореневище бульбоподібне багатоголове або коротко циліндричне, темно-буре, на зламі - червоно-буре. За його химерну форму та цілющу силу перстач прямостоячий називають "козацьким женьшенем", "поліським женьшенем". Дуже шанували його у Запорізькій Січі.

Виглядає "наш женьшень" дуже скромно. З цього приводу також є легенда. Одного разу скромна трава перстач звернулась до доброї феї зі словами: "Сміються з мене мої сестри за те, що не маю ні сріблястого вбрання, ні великих гарних квітів, і взагалі ледь підіймаюсь над землею. Та й пелюсток у мене чотири, а у сестер п'ять." На це фея відповіла: "Не хвилюйся, хоча зовні ти і непримітна, проте будуть тебе шукати люди за велику користь, яку ти будеш їм приносити."

Кореневища калгану містять до 15-30% дубильних речовин, флавоноїди, глікозид торметилін. Використовується як в'яжучий, кровоспинний, бактерицидний, відхаркувальний, болетамувальний і заспокійливий засіб. Добрий ефект дає його застосування при виразках шлунку, некрозів, ангінах. Мазь із калгану загоює опіки шкіри, порошок із кореневищ - чистить і лікує зуби.

Багно звичайне. Народні назви: багульник, багун, багон.

Як п'яно пахнуть малополіські заболочені хвойні ліси та сфагнові болота, в яких зростає цей невеликий кущик! Багно трапляється серед моху, який постійно наростає на деяку висоту, тому змушене розвивати на пагонах, що занурилися в моховий покрив, додаткові корені. Вони замінюють ті, що сховалися в моховій подушці, і поступово відмирають.

Рослина має темно-зелене, шкірясте листя. Знизу воно буруваторуде повстисте з жовтими цятками залоз, які виділяють ефірне масло.

Коли багно цвіте (в травні-червні), здалеку чути його спочатку приємний, а потім одурманюючий запах. Рослина містить до 2% ефірного масла, головна складова якого - сесквітерпенові спирти азуленового ряду - ледол, палюстрол. Квіти білі, досить великі, зібрані в суцвіття щиток. Вони виділяють значну кількість нектару і їх залюбки відвідують бджоли. Проте багновий мед має наркотичні властивості. Плід - коробочка.

Рослина здавна застосовувалась на Україні. Люди знали, що рослина отруйна, тому використовували її в невеликих дозах. Восени чи взимку пучечок багна, дбайливо схований десь на горищі, залишався таким же пахучим. Його застосовували при простудах, кашлі, золотусі, захворюваннях шкіри. Мазь із сухих листочків прикладали при ревматизмі. Помітили люди і те, що рослина очищає повітря і дезинфікує його. Господині застосовували багно як засіб від молі, ним виганяли надокучливих мух.

Препарати багна звичайного використовують для зниження артеріального тиску, лікування бронхіту, туберкульозу, ентероколіту, подагри, мокрої екземи, як потогінний засіб.

Петрів хрест. Цю рослину можна побачити рано навесні. Тільки-но зійде сніг, у широколистяних лісах з-під землі вилазять її рожево-фіолетові пагони. Ця невисока (до 30см заввишки) багаторічна рослина паразитує на коренях ліщини, граба та деяких інших листяних дерев. Перші 10-15 років петрів хрест ховається під землею. Поступово його кореневище сильно розростається, галузиться, набуває хрестоподібної форми. Саме через нього рослина отримала свою назву. Вона нагадувала людям про апостола Петра, якого розп'яли на хресті вниз головою за християнську віру. Коли сформується кореневище рослини, на поверхні ґрунту з'являються листки, які мають форму м'ясистих лусок, і рожеве суцвіття.

Соковиті стебла петрового хреста досить смачні. Їх можна їсти свіжими, подавати в салати. Рослина містить багато органічних кислот, мікроелементів, має лікувальну силу. У народній медицині Полісся вважають, що петрів хрест поліпшує процеси кровотворення. Корисно споживати його свіжим при кашлі, порушенні функцій печінки та нирок.

Очиток звичайний. Народні назви: заяча капуста, заяча розсада, молодило.

Це багаторічна трав'яна рослина з потовщеним веретеноподібним коренем, має пряме, соковите стебло, заввишки 40-80см. На ньому містяться м'ясисті листки. Вони товсті, продовгуваті, зубчасті, кислуваті на смак. Стебло і листки мають сизуватий наліт і дещо нагадують молодую капусту. Саме тому рослину називають заячою капустою. Цвіте в червні-серпні. Квіти біло-рожеві, дрібні, зібрані в щитовидну волоть.

Зростає на сухих піщаних місцях в широколистяних та мішаних лісах. Молоді соковиті пагони рослини містять багато аскорбінової кислоти. Їх використовують як вітамінний, ранозагоюючий та зміцнюючий

засіб, застосовують для зниження тиску, покращання зору, лікування ревматизму, виведення бородавок, мозолів.

Дуже цінується сік листків, витриманих в темряві. Рослина, поставлена в несприятливі умови (темряву, холод), в боротьбі за життя виробляє особливі речовини - біостимулятори, які її збуджують і не дають загинути. Такі біогенні стимулятори використовує людина для зміцнення та підвищення тону організму.

Глід. Народні назви: гльод, глот, глідина, гложина, костоглод, глошня, бориня. Наукова назва роду походить від грецького слова *cratas* - "сильний, міцний", що пов'язано з властивостями його деревини (вона дуже щільна, міцна, тяжка) та зі здатністю захищатись за допомогою колючок.

На Хмельниччині зустрічається кілька видів глоду. Всі вони мають подібні цілющі властивості. Глід зростає в мішаних та листяних лісах, на галявинах, схилах балок. Це - високий кущ або невисоке деревця з пазушними колючками. Молоді гілки блискучі, пурпурно-коричневі. Листки опушені, чергові з прилистками, оберненояйцевидні з клинозубчастим краєм. Квіти білі з пурпурними пиляками, зібрані в щиток. Плід - горішок, оточений солодкою мучистою м'якоттю.

Згадку про глоди, як цілющі рослини, знаходимо в книзі "Materia medica" грецького лікаря Діоскорида, що жив в 1 столітті нашої ери. Лікарські властивості цих рослин описані в багатьох старовинних травниках.

Як лікарську сировину використовують квіти та плоди. В них містяться флавонові глікозиди, виннокам'яна та лимонна кислоти, холіноподібні речовини. Преперати глоду знижують збудливість центральної нервової системи та серцевого м'яза, сприяють скоротливості останнього, покращують коронарний та мозковий кровообіг, знімають тахікардію, аритмію, тяжкість в області серця, головокружіння. Урсолова та олеанова кислоти, що містяться в гліді, знижують артеріальний тиск. Комплексний препарат "Кардіовален" містить екстракт глоду.

Плоди глоду використовують в їжу. Їх вживають свіжими, сушеними, консервованими. З них готують киселі, джеми, повидло, пастилу, різні безалкогольні напої. Проте слід пам'ятати, що в великих кількостях плоди викликають легке отруєння.

Крушина ламка. Народні назви: круха, вовчі ягоди, собачі ягоди, вовче дерево.

Зростає в підліску вільшняків, соснових та дубово-соснових лісів, на лісових галявинах.

Це кущ заввишки 1-3 метри. Деревина його легко ламається, звідси походить назва рослини. Стовбур і гілки гладенькі, вкриті білими плямками - сочевичками. На молодих пагонах кора блискуча, буро-червона, на старих - матово-сіра, буровато-сіра. Листки черешкові,

овальні або оберненояйцевидні, загострені, блискучі. В пазухах листків сидять дрібні зеленуваті п'ятичленні квітки. Плоди - м'ясисті круглі кістянки. Недозрілі плоди червоні, а стиглі - чорні.

З лікувальною метою використовують кору та плоди крушини. В офіційній медицині кору застосовують як послаблюючий засіб, в народній - при захворюваннях печінки, геморої, лихоманці, свербіжу, проносах, недокрив'ї, водянці, надмірних місячних.

Рослина отруйна. Свіжозібрані кора та плоди спричиняють отруєння, тому використовують кору через рік після її збору. За цей час отруйні речовини руйнуються.

Лікарські рослини боліт

Аллея лікарська. Народні назви: рожа лікарська, дика рожа, калачики аптечні, маковійник.

Рослина відома як лікарська з глибокої давнини. Про її цілющі властивості згадували Теофраст та Діоскорид. Римляни також вживали аллею, про що писав Пліній. Цінувалась рослина і в середні віки. Про це є згадки римського лікаря Траліануса. Аллею вирощували в монастирських садах. Карл Великий (кінець VIII-початок IX ст.) видав наказ, в якому рекомендував серед інших лікарських рослин вирощувати і аллею.

Зростає на берегах річок, озер і водоймищ, на заболочених низинах, в чагарниках, на солонцюватих ділянках.

Це багаторічна висока (1-1,5 м) трав'яна рослина з коротким товстим багатоголовим кореневищем і галузистим коренем. Має кілька опушених прямостоячих стебел. Листки почергові, черешкові. Верхні листки цільні, яйцевидні, а нижні - три-, п'ятилопатеві серцевидні, густоопушені. Квітки блідо-рожеві з фіолетовими тичинками, зібрані в колосоподібне суцвіття. Плід збірний, розпадається на окремі сім'янки. Всі органи рослини мають густе опушення та слизисті клітини, які утримують вологу.

Як лікарську сировину використовують корені аллеї. Вони містять до 35% слизу, 37% крохмалю, цукор та пектинові речовини. Застосовують як пом'якшуючий та обволікаючий засіб при кашлі та запаленні дихальних органів. Трава аллеї є сировиною для виготовлення препарату "Мукалтин". Широко застосовують при гастритах, ентероколітах, виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки.

Бобівник трилистий. Народні назви: трифоль, жабівник, вахта трилиста. Латинську назву рослині дав Теофраст.

Зростає на окраїнах боліт, по заболочених берегах ставків та озер. В кінці травня-червні цвіте гарними блідо-рожевими дзвоникоподібними квітами, що розміщені в прямостоячих китицях. Вони добре помітні навіть вночі - ніби попереджують про те, що попереду водойма - стоять на вахті. Можливо, звідси походить російська назва рослини "вахта трилистная". Зплітаючись своїм кореневищем з кореневищами

інших рослин, вона утворює своєрідну сітку, яка лежить на воді. На цьому плаваючому килимі в подальшому поселяються осоки, мохи тощо.

Це багаторічна рослина з довгим товстим кореневищем, що вкорінюється в мулистому дні. Від верхівки кореневища відходять кілька трійчастих листків на довгих черешках. Плід - кругла коробочка.

Як лікарську сировину використовують листки. Їх збирають перед цвітінням. Застосовують при захворюваннях травного тракту. Оскільки гіркі речовини, що містяться в бобівнику, збуджують апетит, покращують травлення, то загальний стан хворого поліпшується. В народній медицині використовують для лікування малярії, туберкульозу.

Лепеха звичайна. Багато назв має ця цілюща рослина: аїр, явр, татарське зілля, татарський шабельник. Зростає на заболочених луках, болотах, по замулених берегах річок та ставів.

Походить ця рослина з Гімалаїв. Була відома ще давньоіндійським цілителям. Під час походів в Індію лепеху виявили воїни Олександра Македонського. На Україну рослину завезли татари, звідси походить назва "татарське зілля". Одна з легенд свідчить, що кореневище лепехи занесли татарські коні між пальцями копит. Інша оповідає, що татари використовували кореневища рослини для освячування води. Вони вважали, що лепеха очищає воду, робить її придатною для пиття. Тому татари кидали шматочки кореневища у ріки та озера, мимо яких проїжджали, а також клали в бурдюки з питною водою (щоб вона залишалась надовго свіжою завдяки дії фітонцидів).

Лепеха - трав'яна рослина з товстим губчастим кореневищем. На його верхівці розвиваються списоподібні листки завдовжки до 1 м. Квіти зеленувато-жовті з простою шестичленною оцвітиною, зібрані в суцвіття початок. Плодів не утворює вірогідно через відсутність комах-опилювачів. В умовах України розмножується лише кореневищем.

"Скільки паху, стільки і помочі", - так образно говорять про цілющі властивості лепехи на Поліссі. Як лікувальна сировина використовуються кореневища. Вони містять багато лікарських речовин. Триметиламін заспокійливо діє на нервову систему, секвітерпени позитивно впливають на роботу серця, шлунково-кишкового тракту та нирок, акоретин регулює тонус судин. Надзвичайно цінні дубильні та в'язкі (танін) речовини. Кореневища використовують як фітонцидний, протизапальний, сечогінний засіб, як ліки для поліпшення зору, пам'яті. Ним лікують головний біль різної етіології та зубний біль.

Лепеха - добрий дезінфікуючий засіб. Корінь її рекомендували жувати під час епідемій тифу та холери, порошком з нього присипали гнійні рани та виразки. Запахом свіжого листа відганяли бліх, комах. Звичай на Трійцю розтрушувати лепеху на підлозі у вигляді сонця не лише красивий, але і корисний.

Цілющі рослини лук

Деревій звичайний. Народні назви: кривавник, ранник, серпоріз, порізник, білоголовник, деревник білий.

Як цінна лікарська рослина відомий з глибокої давнини. Античний мудрець Пліній писав, що латинську назву *Achillea* рід отримав на честь Ахіллеса, який вперше довів цілющу силу деревію і вилікував ним рани Телефуса. Назва деревій вказує на прямостояче, як у дерева, стебло, а російська назва "тысячелистник" - на багаторазово розсічені листки.

Ця рослина поширена по всій області. Її невибагливість, життєздатність, плодючість (одна рослина дає 25 тисяч насінин) вражають. Деревій можна знайти практично скрізь: на сухих луках, лісових галявинах, в низинах і байраках, вздовж доріг.

Рослина трав'яна, заввишки 20-50 см, а за дуже сприятливих умов - до 1 м. Має гіркувато-приємний запах. Стебла прямі, поодинокі, малогалузисті, як і листки, негустоопушені. Квіти білі, рожево-білі або червонуваті, зібрані в кошики. Очевидно звідси походить одна з назв рослини - білоголовник. Плід - сім'янка.

Лікарською сировиною є суцвіття та пагони з листям. До їх складу входять ефірні олії, в'язучі, дубильні речовини, смоли, органічні кислоти, вітаміни А, С, К, фітонциди.

Історія використання деревію починається з часів Діоскорида, який вважав його добрим ранозагоюючим та кровоспинним засобом. Саме тому греки називали рослину "ранником". З цієї ж причини наш народ дав їй назви "серпоріз", "порізник", "кривавник". Препарати деревію мають протизапальну, жовчогінну дію. Застосовують для поліпшення апетиту, лікування хвороб печінки, шлунка, сечокам'яної хвороби, при спазмах гладенької мускулатури, зубному болю.

Материнка звичайна. Народні назви: душинка, духовий цвіт, блошниця. Це - надзвичайно пахуча рослина, звідси і походить її назва "душиця".

Зростає вона по лісових галявинах, узліссях, на горбах, серед чагарників, на сухих відкритих місцях. Це трав'яна багаторічна рослина з галузистим кореневищем, яке щороку випускає по кілька пагонів з галузистими циліндричними червонуватими стеблами. Листки супротивні, черешчасті, продовгувато-яйцевидні, цілокраї з жовтуватими цяточками. При розгляді під лупою видно, що це залози. Саме вони виділяють пахучі ефірні масла, які містять антисептичну речовину - тимол. Квітки пурпурові з двогубим віночком. Вони сидять напівмуготками в пазухах прилистників і зібрані на верхівці гілок в щитковидні волоті. Цвітуть в червні - серпні.

Як лікарську сировину використовують пагони з листками та квітами. Широко застосовують при порушенні функції шлунково-кишкового тракту. Її радять і як відкашлюючий, потогінний, седативний, вітрогінний засіб. Але найбільшої слави рослині принесла здатність лікувати жіночі хвороби, пов'язані з материнством, звідси і така лагідна назва -

"материнка". Здавна в Україні хворим на гінекологічні недуги, а також при загальному виснаженні організму та ревматизмі рекомендували купелі з материнки. Настій і відвар застосовували для компресів на нариви, чиряки, для ванн при рахіті і золотусі у дітей.

Ефірне мало материнки використовують в парфумерії та кулінарії (як приправу).

Чебрець. Народні назви: богородська трава, перчик боровий, чабер. Родова назва рослини походить від грецького слова *thymos* - "сила, "дух" і вказує на збуджуючу дію чебрецю, видова - від латинського *serpere* - "повзати групами, зчеплено" - підкреслює характер росту. Стебло стелиться по землі і місцями вкорінюється.

Древні греки вважали чебрець символом працелюбства, оскільки він ріс на горі Хіметос, яка славилась мармуром та чебрецевим медом. В середні віки зображення пагонів чебрецю, оточеного бджолами, носили рицарі на своїх шарфах.

Цінували цю рослину і слов'яни. Ще в язичькі часи наші предки кидали її пучки в багаття при жертвопринесенні. Духмяний дим свідчив про те, що жертва прийнята богами. Здавна на Русі рослину вважали добрим ліком від кашлю: "А прийдеться тобі від кашлевиці лікувати отроків чи малюків - шукай тим'ян повзучий біля пенька, на якому змія дихало гріє під сонечком полуденним", - вчать давні травники.

На сонячних місцях у соснових борах, на піщаних пагорбах, сухих схилах і суходільних луках трапляється ця рослина.

Це багаторічний напівкущик, утворює дрібні дерновини. Листки супротивні, дрібні, овальні, яйцевидні. Вони містять багато залоз, які виділяють пахучі ефірні масла, тому рослина надзвичайно ароматна. Квіти дрібні світло-фіолетово-рожеві, зібрані в головку. Цвіте майже все літо.

Як лікарську сировину збирають пагони під час цвітіння. Проте слід пам'ятати, що рослину потрібно зрізати, а не рвати, оскільки вона легко витягується з коренем. Чебрець слабо відновлюється, росте повільно і виривання його з коренем шкодить популяції.

В траві рослини міститься 1-1,5% ефірного масла, яке в основному складається з тимолу, фенолів, карвакролу. В офіційній медицині застосовують як відхаркуючий, болезаспокійливий засіб. Входить до складу "Пертусину" - відомого ліку від кашлю. В народній медицині використовується для поліпшення травлення, при здутті кишечника, як сечогінний, ранозагоюючий, заспокійливий засіб. Зовні використовують для ароматичних ванн при лікуванні хвороб, пов'язаних з порушенням обміну речовин. Особливу роль відводить чебрецю народна медицина в боротьбі з алкоголізмом. Недаремно цю рослину народ назвав "богодицина трава". Є дані про те, що надмірне вживання чебрецю може привести до гіпофункції щитовидної залози.

Синюха голуба. Народні назви: синюха лазурева, брань-трава.

Це багаторічна трав'яна рослина. Вона зрідка трапляється на вологих лісових галявинах та узліссях, по берегах річок, серед чагарників. Хто один раз її побачить, назавжди запам'ятає цю надзвичайно гарну рослину.

Синюха має товсте коротке кореневище. Стебло прямостояче, заввишки 35-120см, порожнисте, зверху розгалужене. Особливо прекрасні її непарноперисті листки: прикореневі - зібрані в розетку, стеблові - розміщені почергово. В червні-липні рослина дуже гарно цвіте. Квіти сині, синьо-фіолетові, блакитні (звідси і назва виду), зібрані в суцвіття волоть. Плоди - яйцевидні коробочки.

З лікувальною метою використовуються корені та пагони. В корені рослини містяться сапоніни, що зумовлюють сильну відхаркуючу, ранозагоюючу, седативну дію. Витяжки із коренів синюхи у 8-10 разів активніші, ніж витяжки валеріани. Їх призначають як заспокійливий засіб у випадку різних психічних та нервових захворювань. Використовують рослину для лікування виразкової хвороби шлунку з підвищеною секреторною активністю шлункового соку, при епілепсії, укусах отруйних змій.

Сировинна база синюхи голубої в області відсутня. Промислові заготівлі не проводяться, проте рослина легко вирощується в культурі.

Гірчак зміїний. Народні назви рослини - змієвик, ракові шийки - пов'язані з товстим змієподібним кореневищем. Воно має багато листових рубців і зовні нагадує ракові шийки.

Зростає в заплавах річок на сирих торф'янистих луках, вологих узліссях, евтрофних болотах після часткового осушення. Місця, на яких цвітуть ракові шийки, вражають своєю красою. Вони завітчані ніжно-рожевими пухнастими свічками - циліндричними колосками, в які зібрані дрібні, рожеві квіти.

Це багаторічна трав'яна рослина. Стебло негалузисте, несе кілька великих прикореневих листків і 1-4 дрібних стеблових. Листки продовгуваті, широкі з притупленою верхівкою, переходять в довгий крилатий черешок. Плід - тригранний темно-коричневий горішок.

Як лікарська сировина використовуються кореневища гірчака. Вони містять до 15-25% дубильних речовин. Застосовують як протипухлинний, тонізуючий, в'яжучий, кровоспинний, ранозагоюючий, протиотрутний засіб. Вживають при запаленнях слизових оболонок травного тракту, циститах, холециститах, жовчнокам'яній та сечокам'яній хворобах.

Гірчак зміїний вимагає особливо бережливого використання: сировинна маса кореневищ ценопопуляції після заготівель відновлюється дуже повільно -протягом 20 років.

Полин гіркий. Народні назви: чорнобильник, нехворощ, полин білий, вдовина трава. Древні греки називали цю рослину "артемізією" на честь богині мисливства Артеміди і вважали її травою здоров'я. Звідси походить латинська родова назва рослини. Полин містить речовини

абсентин і анабсентин, які надають йому гіркового смаку. "Гіркий, як полин", - говорять на Україні. А ще рослину називають вдовиною травою - вона гірка, як життя вдови.

Це багаторічна сріблясто-повстиста трав'яниста рослина (50-150см заввишки) з вкороченим, потовщеним кореневищем. Стебла галузисті. Листки чергові, двічі-, тричіперисторозсічені. Квіти трубчасті, жовтуваті. Суцвіття - кошики, зібрані в загальну волоть. Плід - сім'янка. Цвіте в липні-вересні.

Зростає по всій області на порушених ділянках - біля житла, на узбіччі доріг, пустирях, у лісосмугах, на пасовищах, схилах кар'єрів, занедбаних полях.

Про лікарські властивості полину писав Авіцена в "Каноні лікарської науки" - книзі, що узагальнювала досвід древніх грецьких, римських, індійських та середньо-азіатських лікарів. Відомий лікар Пліній Старший вважав, що маючи при собі листки цієї рослини, можна відправлятися в будь-який похід - не захворієш. В давніх травниках та лікарських порадах слов'ян знаходимо згадки про те, що рослиною лікували пропасницю.

В лікувальних цілях використовують верхівки пагонів, листя. Полін гіркий посилює апетит, поліпшує травлення. Застосовується, як протизапальний, гіпоглікемічний, жовчо- та глистогінний засіб. Настій і відвар використовують при раку шлунку. Свіжим соком із трави зупиняють кровотечі, при цьому рана знезаражується і швидко загоюється. В Прикарпатті та на Рівненщині вважають, що полин покращує пам'ять. Зовнішньо настій трави використовують при фурункулах, ранах, синцях. Свіже потовчене листя -болетамуючий засіб при ударах, вивихах, розтягу сухожилля.

Здавна наші предки вважали полин засобом, що охороняє від нещастя, злих духів. Ним завітчали на Івана Купала житла і господарські приміщення, вірили, що рослина відганяє нечисту силу, її носили при собі як оберег від русалок.

Золототисячник звичайний. Народні назви: ясенець, золотуха, семисильник, сердушник.

Латинська назва рослини Centarium зустрічається ще в праці Діоскорида. Є кілька легенд про її походження. Згідно з однією легендою, назва дана на честь кентавра лікаря Хірона, який жив на горі Пеліон і вчив героїв та синів богів мистецтву траволікування. Соком цієї рослини він лікував рани, тому її назвали "трава кентавра". Згідно з іншою легендою один безнадійно хворий чоловік дав клятву у випадку одужання пожертвувати сто золотих на користь бідних. У сні до нього з'явився ангел і сказав: "Ти одужаєш, якщо будеш використовувати траву, що я приніс, але не забудь про свою клятву". Хворийвилікувався травою, яку залишив йому ангел, а рослину стали називати centaarium, що означає "сто золотих" (centrum - "сто", aurum- "золото"). Монахи звичайно писали в

рецептах "100 золотих", засекречуючи назву цілющої рослини, але учень помилково дописав зайвий нуль, і рослина стала називатись "золототисячником".

Це надзвичайно гарна невеличка трав'яниста рослина, заввишки 15-35 см, зростає на вологих та свіжих луках. Листки зібрані в прикореневу розетку та розміщені на тонкому стеблі. Квіти рожеві, зібрані в щиток. Росте на луках, лісових галявинах.

Використовується при підвищеній кислотності шлункового соку, печії, хворобах печінки, діабеті, недовкрів'ї, застуді, як глистогінний, ранозагоюючий засіб. Застосовують золототисячник і в гінекології - для лікування ендометриту та аднексіту. Він входить до складу протиалкольних зборів.

Золототисячник звичайний під впливом антропогенних факторів різко скорочує свою чисельність. На Україні запаси цієї рослини за останні десятиріччя зменшилися більше, ніж у 10 разів. В Хмельницькій області його заготівля суворо лімітована.

Дягель лікарський. Народні назви: дягільник, коровник, вонючка, ангеліка, бурулька. Ще давні елліни склали хвалу цій рослині і назвали її травою архангела - Archangelica, звідси походить латинська родова назва.

Зростає дягель лікарський на галявинах, луках. Це висока (120-200см) трав'яна рослина з товстим порожнистим округлим стеблом, часто червонуватим, особливо у верхній частині. Має порожнисте кореневище. Листки дуже великі (до 80см завдовжки). Суцвіття - кулясті зонтики, віночки квіток світло-жовті, білі. Потрібно розрізняти дягель лікарський та дягель лісовий (дудник). У останнього суцвіття плескаті, у вигляді щитка, віночки квіток мають рожевий відтінок, корені дерев'яністі.

Дягель лікарський приємно пахне, оскільки всі його частини містять ефірні масла. Особливо приємний запах сім'янок - тонкий, ніжний і досить стійкий.

У фармакологічному відношенні дягель лікарський - цінна рослина. Його кореневище використовується як шлунковий засіб, що покращує травлення, посилює моторику і секреторну функцію кишечника. Має сечогінну, відхаркуючу, протиглисну дію, допомагає при нервовому виснаженні, епілепсії, істерії, безсонні. Дягель містить комплекс протирадіаційних речовин.

Це харчова і прянно-ароматична рослина. Його зелені пагони і черешки листків використовують в кулінарній та кондитерській промисловості, а кореневища - в рибоконсервній. У Франції із стебел виготовляють духмяні цукати, лікери. Подрібнені висушені корені рослини додають до тіста, сосусів, ним посипають м'ясо при запіканні.

Звіробій звичайний. Народні назви: іванок, божя кривця, прозірник, бождеревок, діробій, здоровник. Існують різні трактування походження родової назви рослини. Одні слово "звіробій" пов'язують зі здатністю

рослини, як звір, боротися з хворобами. Інші вважають, що назва походить від казахського "джерабой", що означає "зцілитель ран".

Звіробій - це багаторічна трав'яна рослина, 30-100см заввишки. Має прямостояче, двогранне, голе, зверху галузисте стебло. Листки супротивні, сидячі, овальні, еліптичні або продовгувато-яйцевидні, цілокраї з великою кількістю залоз. Квіти правильні, яскраво-жовті з 5-членною оцвітиною, зібрані в щитковидні або широковологотисті суцвіття. Плід коробочка. Цвіте в червні-серпні.

Ця гарна сонячна рослина зростає по сухих місцях, на пагорбах, узліссях, галявинах, відкритих ділянках з частково трансформованою природною рослинністю. На одному місці довго не затримується. Забере у земельки потрібні речовини і "втече" далі.

Звіробій - надзвичайно цілюща рослина. В народі кажуть, що це ліки від 99 хвороб. Застосовується як засіб, що збуджує апетит, виявляє в'язучу, ранозагоюючу, протизапальну, антивірусну, сечогінну, відхаркуючу дію. Його вживають при хворобах печінки, нирок, шлунку, розладі нервової системи, безсонні, нічному нетриманні сечі, проносах, ревматизмі, ангіні. Рослина стимулює роботу серця, підвищує кров'яний тиск, звужує кровоносні судини, тамує болі.

"Як без борошна хліба не спечеш, так без звіробою зільов не звариш", "Всяке зілля без звіробою, як страва без солі" - говорять на Поліссі. Якщо з лікувальною метою рекомендують суміш кількох трав, звіробій є обов'язковим їх компонентом. - вважають на Волині.

Гадючник звичайний. Народні назви: смужник, починочки, балабан, болотка, кашка біла, медівниця. Російська назва - лабазник.

Зростає на сухих схилах, луках, лісових галявинах і узліссях, біля польових доріг. Його підземна частина складається з невеликого косоного кореневища, від якого відходять тонкі корені з кулястими або веретеноподібними бульбочками, вкритими темно-коричневою шкірочкою. Ці бульбочки в народі називаються земляними горішками. Прикореневі листки крупні, продовгуваті двічіперисторозсічені. Стеблові листки дрібні. Багаточисельні дрібні білі квіточки мають сильний медовий запах. Вони зібрані в компактну волоть.

Як лікарська сировина використовуються корені з бульбочками та надземна частина рослини. В кореневищах міститься багато крохмалю. В надземній частині, особливо в листі, містяться каротин, танніди та аскорбінова кислота.

Кореневища і бульбочки гадючника використовують як кровоспинний засіб і при болях в шлунку, листки - при лейкозах, жіночих захворюваннях, геморої, ревматизмі. Відвар квіток та листя п'ють при істеричних припадках, болю у шлунку і кишечнику. Концентрованим відваром промивають рани, які погано загоюються.

Кореневища приємні на смак. Їх споживають вареними, з висушених роблять борошно. В тяжкі роки з них випікали хліб (у суміші з борошном із

кореневищ пирію повзучого). Кореневища і молоді пагони гадючника вживають для приготування салатів, заправки супів, борщів. Квіти використовують як чай, для ароматизації напоїв.

Дикорослі лікарські рослини Хмельниччини - всенародне багатство, яке треба цінувати і берегти. При зборі лікарської сировини завжди слід пам'ятати, що природні запаси не безмежні. Для підтримання постійного відтворення чисельності популяцій лікарських рослин потрібно правильно їх експлуатувати. Неприпустимо зрізати або викопувати всі рослини на вибраній ділянці, завжди слід залишити кілька особин для відновлення популяції. Повторні збори підземних частин рослини на одному і тому ж місці можна проводити через 5 років, пагонів - через 2, плодів та насіння - через 1 рік. Пагони слід зрізати без товстих приземних частин, але не зривати їх з корінням, кореневищем, цибулинами тощо. Особливо обережно треба заготовляти кору - тільки із зрізаних гілок і зрубаних дерев під час санітарного проріджування (до розпускання листя). Кращі екземпляри квіток та суцвіть залишати для розмноження.

Щоб використати цінні якості рослин якнайповніше, треба вміти їх сушити та зберігати. Л.О.Павленко, представниця роду відомих травників, вчить: "Квіти, якими людей лікують, люблять, щоб їх добра рука вчасно зірвала, висушила і поклала в належне місце".

Найкращий спосіб збереження лікарських рослин - культивування, адже більшість з них добре приживається на присадибних ділянках, в садах. В Хмельницькій області є ряд господарств, що займаються вирощуванням лікарських рослин. Найвідоміші з них - Староушицьке, Лісогринівецьке, Понінківське. Винятково добру справу робитиме той, хто розсіватиме або висаджуватиме цілющі рослини в місцях їх природних зростань.

РІДКІСНЕ - БЕРЕЖИ!

Ті, що зростають на півночі Хмельниччини У царстві плаунових

Плаунові - своєрідна стародавня група рослин, які поширені по всій земній кулі. Це багаторічні спорові рослини, які ростуть переважно у вологих місцях і завдяки своїм біологічним властивостям ростуть, поширюючись у всі боки. Наукова назва плаунів "лікоподіум" означає "вовча лапа" і походить від грецького "люкос" - лапа і "падіон" - нога, лапа. Гілочки плаунових дійсно схожі на лапу звіра. Серед плаунових немало рідкісних. На Хмельниччині зростає п'ять видів плаунових - плаун булавовидний, плаун річний (п.колючий), баранець звичайний, діфазіаструм сплюснутий, лікоподієлла заплавна. Із них всі, крім плауна булавовидного, занесені до Червоної книги України. Pozнайомимось з цими рідкісними видами.

Баранець звичайний (*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.). Вічнозелена спорова рослина. Це єдиний вид роду в Україні. Цей вид плауна характеризується прямим, або частіше висхідним, розгалуженим стеблом висотою до 20 см, росте невеликими групами або окремими рослинами. Хто бував в Карпатах, можливо зустрів баранець, оскільки там він не є таким рідкісним, як на рівнині. Стебло баранця щорічно нахиляється до землі і укорінюється додатковими коренями, до того ж стебло щорічно роздвоюється і окремі гілочки з частом переходять на самостійне життя. Це так зване вегетативне розмноження. Розмножується баранець і спорами. На відміну від інших видів плаунів цей вид не утворює колосків, а спорангії ховаються у піхвах листочків у середній та верхній частині стебла. Слід відмітити, що спори у баранця проростають лише через 3-8 років, а повний цикл розвитку від спори до спори відбувається в межах 10-15 років. Баранець звичайний має великий, переважно голарктичний ареал, але має диз'юнкції і в південній півкулі. В Україні поширений в лісовій зоні, відомі поодинокі знаходження в лісостеповій зоні. На Хмельниччині рослина є дуже рідкісною. Поодинокі трапляються в соснових лісах зеленомохових і чорницево-зеленомохових в Шепетівському районі в околицях с.Мальованка (заказна зона РЛП "Мальованка"), в гідрологічному заказнику "Теребіжі" та в лісовому заказнику "Дорогоща".

Діфазіаструм сплюснутий (*Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub). Своєрідний, не схожий на інші роди плаунових, діфазіаструм нагадує розгалужене "віяло", яке піднімається над землею на 10-20 см. Рослина має довге повзуче кореневище, гілки її сплюснені, вилчаторозгалужені. В Україні зустрічається рідко у соснових і дубово-соснових лісах Українського Полісся та Малого Полісся на піщаних ґрунтах. Є вказівки про зростання цього виду в Карпатах. Цей голарктичний вид знаходиться в Україні на південній межі поширення. Для Хмельниччини і Малого

Полісся вид раніше не наводився. Знайти його вдалось в гідрологічному заказнику Теребіжі в Ізяславському районі в сосновому лісі чорницево-зеленомоховому. Необхідно продовжувати пошуки нових місцезростань.

Плаун колючий (*Lycopodium annotinum* L.). Порівняно з попередніми видами плаун колючий значно частіше трапляється як в Україні в цілому, так і на Хмельниччині. Це палеарктичний вид, в Україні знаходиться на південній межі свого ареалу. В Україні він найчастіше трапляється в ялинових лісах Українських Карпат, де місцями утворює суцільний покрив. Дещо рідше зустрічається в лісовій зоні на рівнині України і рідко в Лісостепу. На Хмельниччині відомі місцезростання пов'язані з вологими сосновими лісами північної частини області. Він виявлений в Ізяславському районі в Плужнянському та Лютарському лісництвах, в Славутському районі в Голицькому і Хутірському лісництвах, в Шепетівському районі у Мальованському лісництві. Цей вид плауна називається колючим тому, що його численні листочки мають колючу верхівку. Листочки розташовані перпендикулярно до стебла або відігнуті вниз. Видова назва "річний" обумовлена тим, що у цього виду кожен рік формується кільце з не відстовбурчених, а притиснутих до стебла листочків. Як і всі плаунові, плаун колючий є чутливим до зміни середовища і швидко скорочує своє поширення, а з часом і зникає внаслідок вирубування лісів, значного рекреаційного навантаження, а також збирання як декоративної та лікарської рослини.

Лікоподієлла заплавна (*Lycopodiella inundata* (L.) Holub. Цей вид слід шукати не в лісі, а на ділянках обводнених торфових боліт та на вологих пісках по терасах річок. Це голарктичний вид. В Україні рідко трапляється на більшій частині території. Стебло лікоподієлли 10-15 см, густо вкрите лінійно-шиловидними листочками. Все рідше трапляється ця рослина, оскільки страждає від осушення боліт та освоєння річкових долин. На Хмельниччині пощастило знайти її в урочищі Сільце, що у Славутському районі. Воно знаходиться неподалік від м.Нетішин у Кривинському лісництві у заболоченій улоговині, що на терачі р.Горині. Тут на вологих ділянках з піщаними ґрунтами лікоподієлла заплавна утворює значну популяцію. Необхідним є пошук нових місцезнаходжень виду.

Вовчі ягоди пахучі (*Daphne genkwa* L.). Цю рослину можна побачити в північній частині Хмельниччини в лісах східної частини Малого Полісся. Ця вид відомий з третинного віку. Навпрочуд гарна, невеличка (10-30 см) рослина з прямостоячими стеблами та шкірястими видовженими листочками, особливо помітна під час квітування. Цвіте у травні. Темно-рожеві квіти зібрані на кінцях стебла. Ростуть вовчі ягоди пахучі переважно у світлих соснових та дубово-соснових лісах і мають народну назву "боровий бузок". В Україні цей вид має два центри поширення. Один - на північному заході (Західне Полісся, Волинська

височина, Мале Полісся, Розточчя), другий - у лісостеповій частині Придніпров'я. Перші згадки про зростання вовчих ягід пахучих на Хмельниччині біля Славути знаходимо в літературі, що датується кінцем XVIII сторіччя, але останнім часом ці дані не підтверджувались. Останні знахідки нами зроблені в Плужнянському лісництві (Ізяславський район). Тут вовчі ягоди пахучі ростуть невеликими групами на ділянках соснового лісу чорницево-зеленомохового.

Мешканка сфагнових боліт

Шейхцерія болотна (*Scheuchzeria palustris* L.) - третинний релікт, який росте на обводнених болотах, переважно сфагнових із бідними та кислими торфами. Шейхцерія росте, насамперед, в мочажинах, - обводнених зниженнях на болотах з покривом із сфагнових мохів. Це невисока рослина із сплющеним стеблом, вузькими листками та оригінальними здутими плодиками. Рослина має довге кореневище і утворює великі куртини. Основні місцезростання цього виду в Україні пов'язані із сфагновими болотами Західного Полісся. Шейхцерія знаходиться в Україні на південній межі поширення. Багато відомих раніше місцезростань цього рідкісного виду в Україні вже зникли. Рослина страждає від осушення боліт. На території Хмельниччини шейхцерія болотна знаходиться в ізольованих місцезростаннях на південь від межі суцільного поширення. Єдиний нині локалітет цього виду на Хмельниччині виявлений на сфагновому плаві озера Святого, що в Ізяславському районі. Це територія гідрологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Озеро Святе".

Рідкісні осоки області

Осоки - багаторічні трави з переважно тригранними стеблами та лінійними листками. Це велика група рослин, поширена переважно в помірному кліматичному поясі. Численними є осоки і в Україні, в її флорі понад 100 видів цього роду. Найбільше осок на болотах і луках, є вони в лісах та степах. З рідкісних видів осок, які потрапили на сторінки Червоної книги України, із шести видів на Хмельниччині зростає чотири. Це осоки вологих місцезростань - богемська, Девелла, Буксбаума та лісова осока - затінкова.

Осока богемська (*Carex bohemica* Schreb.) - один з найрідкісніших видів осок України. Декілька відомих раніше місцезростань на території України тривалий час не підтверджуються. Рослина трапляється переважно в смугах заростання проточних або непроточних водойм з мулистими або піщаними ґрунтами. У сусідніх країнах - Польщі і Білорусі ця осока також є дуже рідкісною. Її поодинокі місцезростання вказуються в подібних умовах. Так, в Польщі вона відома з берегів пересихаючих ставків та каналів. Осока богемська - це вид з диз'юнктивним євразійським ареалом. Основна частина ареалу знаходиться у Центральній та

Атлантичній Європі, а ізольовані локалітети трапляються до Далекого Сходу. Від інших видів осок цей відрізняється головчастим суцвіттям, оточеним довгими покривними листочками, які в кілька разів довші, ніж суцвіття. Велику популяцію осоки богемської виявлено в урочищі Терембіжі у Славутському районі, де створено гідрологічний заказник місцевого значення "Терембіжі".

Осока Девелла (*Carex davalliana* Smith) поширена переважно в Центральній Європі. У нас ця реліктова рослина знаходиться на східній межі поширення. Осока Девелла зростає переважно на карбонатних болотах. Ця багатрічна трав'яна рослина заввишки 10-60 см росте щільними дернинками. На кінці кожного стебельця один колосок. На Хмельниччині окремі ділянки з карбонатними ґрунтами зустрічаються на низинних осоково-мохових болотах Ізяславського району у Плужнянському лісництві біля с.Комин. Це найсхідніший локалітет виду в Україні. Охорона осоки Девелла в Україні забезпечена слабо. Єдине на Хмельниччині її місцезростання має значну наукову цінність. Нині воно не охоплене охороною.

Осока Буксбаума (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) є не менш рідкісною як на Хмельниччині, так і в Україні в цілому, ніж попередній вид. Це голарктичний вид, який наявний тут у локалітетах на південь від основного ареалу. В Україні зустрічається зрідка в Карпатах, на Поліссі та у Лісостепу. Росте осока Буксбаума на низинних осокових та осоково-гіпнових болотах. Це досить висока (до 70 см) рослина, має характерні темно-іржаві луски маточкових колосків. Для Хмельниччини цей вид раніше не наводився. Її місцезростання виявлені в ур. **Лізне** у Полонському районі. Слід продовжувати пошуки цієї рідкісної осоки.

Осока затінкова (*Carex umbrosa* Host). Ця осока, як і осока Девелла, є центральноєвропейським видом на східній межі поширення. Але це лісовий вид і росте в світлих листяних і мішаних лісах. В Україні цей вид відомий на Поліссі, в Правобережному Лісостепу і в Карпатах. Осока затінкова трапляється здебільшого невеликими групами куртин. Утворює щільні дернини, добре помітні серед лісових трав. На Хмельниччині її поодинокі місцезростання виявлені на території РЛП "Мальованка" у Мальованському та Полонському лісництвах у дубових лісах ліщиново-конвалієвих та крушиново-конвалієвих. Тут осока утворює щільні купиноподібні дернини в кількості від 10 до 12, має добру життєвість.

Орхідні Хмельниччини

Орхідні - незвичайна, своєрідна група рослин, які привертають до себе увагу вишуканістю квітів. Ці рослини виявились дуже чутливими до зміни навколишнього середовища, вони одними з перших знають з порушених місцезростань. В багатьох країнах, в т.ч. і в Україні всі представники цієї чисельної родини взяті під охорону. В Україні зростає

66 видів орхідних. Всі вони занесені до Червоної книги України. Чисельною ця група є і на Хмельниччині - 29 видів.

До лісових видів родини, що трапляються на Хмельниччині, належать такі види, як зозулині черевички справжні, любка дволиста, любка зеленоквітка, гніздівка звичайна, зозулині сльози яйцевидні.

Зозулині черевички справжні (*Cypripedium calceolus* L.) - одна з найрасивіших рослин природної флори України, виділяється оригінальною великою квіткою, яка нагадує вишуканий черевичок старовинної форми. Квітки поодинокі або по 2-3 розміщуються у верхній частині високого стебла. Це третинний релікт. Латинська назва означає черевичок Кіприди (Венери). Ареал цієї орхідеї охоплює північну частину Євразії від Великобританії до о.Сахалін. Дещо відмінна форма виду поширена в Північній Америці. В Україні зозулині черевички справжні трапляються зрідка на рівнинній частині України, відомі місцезнаходження в Карпатах та в Гірському Криму. Росте у світлих листяних та мішаних лісах, на узліссях. Ця орхідея характеризується досить складною біологією розвитку. Зацвітають зозулині черевички, коли розвиваються з насіння, лише на 16-17-ий рік. При вегетативному розмноженні вегетативні пагони розвиваються на 2-3-ий рік. На території Хмельниччини відомі місцезростання у грабових та дубово-грабових лісах Городницького та Кам'янець-Подільського районів. Охороняється у ландшафтних заказниках загальнодержавного значення "Совий яр" та "Кошаринський". Вид занесено до Додатку I Бернської конвенції.

Любка дволиста (*Platanthera bifolia* L.) - палеарктичний вид, який трапляється від Західної Європи до Східного Сибіру, від тайги на півночі до Середземномор'я на півдні. В Україні цей вид спорадично трапляється в лісовій і лісостеповій зонах, є окремі знахідки на півночі степової зони. Вирізняє цю рослину наявність двох широких довгастих прикоренивих листків. Квіти зібрані у видовжене суцвіття - китицю. Квіти досить великі, білі, з довгою губою (спрямованою вниз пелюсткою). Квіти цієї рослини особливо духм'яні вночі, за що рослина отримала народну назву "нічна фіалка". Своім незвичайним запахом любка приваблює нічних метеликів, які є її запилювачами. Квітує любка дволиста з середини червня до середини липня, а через півтора-два місяці у неї дозріває насіння. Живе любка до 27 років, а зацвітає лише на 10-11-ий рік. На Хмельниччині цей вид спорадично трапляється в лісах, на узліссях, інколи - на луках по всій області. Охороняється в НПП "Подільські Товтри", РЛП "Мальованка", ряді заказників - "Городоцький", "Панівецька дача", "Совий яр", "Зарудка зелена", "Нижні Патринці", "Червоноцвітський", "Чоботарня" та ін.

Любка зеленоквітка (*Platanthera* (Cust.) Reichenb.). Ареал виду охоплює Європу, Малу Азію та Кавказ. В Україні трапляється на більшій частині території, але в степовій зоні дуже рідко і тільки в північній її частині. В Карпатах високо в гори не піднімається. Найчисельніша в Гірському Криму. Любка зеленоквітка подібна на любку дволисту, але

при уважному розгляді неважко помітити відмінності між цими видами. У любки зеленоквіткової квітки зеленуваті, з товщим шпорцем. Пиляки в квітці не паралельні, як у любки дволистої. До того ж квіти любки зеленоквіткової не мають запаху. Росте ця рослина у широколистяних лісах. Охороняється в РЛП "Мальованка", заказниках "Панівецька дача", "Совий яр", "Іванковецький", "Нижні Патринці" та на деяких інших природно-заповідних територіях.

Гніздівка звичайна (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich.). Ареал цього виду охоплює Європу, Кавказ та Західний Сибір. В Україні поширена в лісовій і лісостеповій зонах та в Гірському Криму. Дуже рідко трапляється на півночі степової зони. Гніздівка звичайна - сапрофітна орхідея. Вона живиться відмерлими рештками рослин і має не зелене, а жовтувате або бурувате забарвлення. Такого ж кольору її запашні квіти. Численні корені, сплітаючись, нагадують пташине гніздо, що обумовило її назву. На Хмельниччині гніздівка спорадично трапляється в лісах різних частин області. Росте невеликими групами або поодинокі. Охороняється в багатьох природно-заповідних територіях, в т.ч. в РЛП "Мальованка" заказниках "Совий яр", "Панівецька дача", "Чоботарня", "Кошаринський", "Городоцький", "Давидковецький", заповідному урочищі "Липняк".

Зозулині сльози яйцевидні (*Listera ovata* (L.) R.Br.). Ареал цієї орхідеї досить широкий. Він охоплює Європу, Кавказ, Малу і Середню Азію, Західний Сибір. Цей вид зростає і на більшій частині України. Рослину легко впізнати по двох супротивних майже круглих листках, розташованих горизонтально на значній відстані від землі. Квіти невеликі, зеленуваті у довгому багатоквітковому суцвітті. Видовжені частини квітки наче "стікають" по стеблу, що і обумовило назву рослини. Ростуть зозулині в листяних лісах по всій території області. Охороняються в заказниках "Городоцький", "Іванковецький", "Кошаринський", "Панівецька дача", "Совий яр", РЛП "Мальованка" та деяких інших природно-заповідних територіях.

Види роду Пальчатокорінник

Добре представлений на Хмельниччині рід Пальчатокорінник. Тут зростає 6 його видів. Об'єднує їх пальчаста форма бульб, звідси і походить назва рослини.

Пальчатокорінник м'ясочервоний (*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soo) - один із найпоширеніших видів. Це поліморфний євразійський вид. На території України він поширений на більшій частині території, але в степовій зоні трапляється рідко. Серед інших видів пальчатокорінників цей вид виділяється міцним стеблом та світло-рожевими квітами, зібраними у дещо витягнуте суцвіття. Місцезростання цього виду пов'язані переважно з торф'янистими луками, але зустріти його можна і у вологих лісах, по берегах річок тощо. Під час квітування пальчатокорінник виділяється яскравими плямами серед трав. В Хмельницькій області вид

частіше трапляється в північній частині області, але є він і на її півдні. Охороняється вид в РЛП "Мальованка", геологічній пам'ятці природи загальнодержавного значення "Смотрицький каньйон", гідрологічних заказниках загальнодержавного значення "Башта" та "Михельський", гідрологічних заказниках місцевого значення "Безодня" та "Вовчанський".

Пальчатокорінник травневий (*Dactylorhiza majalis* (Reichenb.) R.F.Hunt et Summerhayes). Європейський вид. В Україні трапляється в лісовій зоні, рідше - в лісостеповій. Є в Гірському Криму. Зростає на сирих і заболочених луках. Стебло, як і в попереднього виду, товсте, пряме. Листя має криваво-червоні плями. Квіти фолетово-пурпурові, зібрані в густе компактне суцвіття. Цвіте раніше, ніж більшість інших видів роду - у травні і на початку червня. На Хмельниччині пальчатокорінник травневий трапляється рідко. Він знайдений в РЛП "Мальованка" в ур. Лізне, біля хутора Півнева Гора в околицях Нетішина, в околицях с. Суржинці Кам'янець-Подільського району.

Пальчатокорінник плямистий (*Dactylorhiza maculata* (L.) Soo) - європейський лучно-болотний вид, який в Україні трапляється майже виключно в лісовій зоні, найбільш чисельним є на луках Карпат. Листки з поперечними червонувато-бурими плямами, стебло тонке. Квіти блідо-рожеві, іноді білі, зібрані у густий колос. На Хмельниччині вид знайдено в ур.Лізне Полонського району (входить до РЛП "Мальованка") та в околицях м.Нетішина.

Пальчатокорінник Фукса (*Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soo) - лучно-болотний вид з Євразійським ареалом. В Україні трапляється в лісовій зоні, на півночі та сході Лісостепу, є кілька локалітетів в степовій зоні в басейні Сіверського Донця. Подібний на пальчатокорінник плямистий, відрізняється від нього виразно трьохлопатевою губою. Єдиний відомий сучасний локалітет виду у Хмельницькій області знаходиться в урочищі Лізне на території РЛП "Мальованка", де вид поодиноким зростає на торф'янистій луці.

Коручка болотна (*Epipactis palustris* (L.) Crantz). Вид поширений в Європі, Західному Сибіру, Середній Азії, на Кавказі. В Україні цей вид зрідка зустрічається майже по всій її території. Зустріти рослину можна на торфових болотах та заболочених луках, де місцями вона утворює великі популяції. Рожево-білі квіти цього виду добре помітні серед болотного різнотрав'я. Коручка болотна скорочує своє поширення внаслідок осушення боліт. Вже на перших стадіях осушення вона випадає із травостою. На Хмельниччині коручка болотна є дуже рідкісною. Поодинокі місцезнаходження раніше наводились як для південної, так і для північної частин області. Але останнім часом ці місцезростання не підтверджуються. Єдине відоме сучасне місцезростання виду на території Хмельниччини знаходиться у північній частині області в Славутському районі неподалік м.Нетішин. Тут в заболоченому зниженні

на терасі р.Горинь в урочищі Сільце знайдено кілька десятків екземплярів цього виду. Рослини мають добру життєвість, квітують і плодоносять. Проте, це лише одне місцезнаходження. Слід шукати і брати під охорону інші.

Плавун щитolistий (*Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze) - рідкісна водна рослина, яка дожила з третинного періоду до наших часів. Ареал плавуну щитolistого є досить широким, він охоплює Європу, Кавказ, Середню Азію та Далекий Схід. В Україні плавун щитolistий поширений в долинах великих річок - Дніпра, Десни, Дунаю, Південного Бугу. Рослина є теплолюбною і тому більш поширена на півдні України. На Хмельниччині плавун щитolistий є окрасою водойм річок басейну Південного Бугу у Летичівському та Деражнянському районах. Поодинокі ця рідкісна рослина зростає на ставах Чемеровецького району. Овальноїцеvidні листки плавуну на довгих гнучких черешках плавають на поверхні води, утворюючи місцями зелений килим, на тлі якого яскравими жовтими вогниками виблискують на сонці його квіти, які піднімаються над листям на 5-6 см. Квіти досить великі і під час квітання цю рослину легко помітити здалеку. Плавун щитolistий є досить чутливим до зміни умов у водоймах. При забрудненні вод він швидко скорочує своє поширення, а згодом і випадає із водних ценозів. Охорона цього рідкісного виду забезпечена на Хмельниччині недостатньо. В існуючій системі природно-заповідних територій цей вид є у гідрологічному заказнику загальнодержавного значення "Башта" та в НПП "Подільські Товтри".

Підсніжник білосніжний (*Galanthus nivalis* L.). Латинська назва підсніжника походить від грецьких слів "гала" - молока і "антос" - квітка. Рано навесні з'являються згорнуті листочки підсніжника. Дещо пізніше над нами піднімається поникла біла квітка. Квітує рослина у березні-квітні. Росте в листяних лісах. Це європейський вид, в Україні поширений в лісовій і лісостеповій зоні, на лівобережжі Дніпра проходить східна межа поширення виду. На Хмельниччині трапляється нерідко. Охороняється на багатьох природно-заповідних територіях.

Сон чорніючий (*Pulsatilla nigricans* Störck). Це невелика трав'яна рослина, опушена м'якими довгими волосками. Квіти темно-фіолетові, пвернуті донизу. Квітує у травні. Після квітіння утворюється оригінальний опушений плід. В Україні зустрічається на Поліссі (крім Західного), в Лісостепу та Степу. Росте в соснових лісах та в степах. На Хмельниччині трапляється у лучно-степових ценозах південної частини області. Рослина страждає від знищення степових ділянок, зривання на букети, пожеж. Охороняється у заказниках загальнодержавного значення "Нижні Патринці", "Івахновецький", "Товтра Вербецька".

Цибуля ведмежа (*Allium ursinum* L.). В народі цей вид називають левурдою або черемшою. Рано навесні піднімається над землею два широкі листки цибулі ведмежої. Квітує вона у травні. Білі квіти зібрані у суцвіття-зонтик. Росте ведмежа цибуля в листяних лісах на багатих ґрунтах. Нерідко вид утворює суцільні зарості. Це Європейсько-кавказький вид. В Україні поширений в лісовій, більше - в лісостеповій зонах. Як цінна харчова рослина ведмежа цибуля інтенсивно знищується при збиранні населенням. Охороняється на багатьох природно-заповідних територіях Хмельниччини, зокрема в заказниках загальнодержавного значення "Велика і Мала Бугаїха", "Городоцький", "Іванковецький", "Сатанівський", заказниках місцевого значення "Лизнявський", "Івахновецький ліс".

Лілія лісова (*Lilium martagon* L.) - висока трав'яна рослина з кільцями довгастих листочків. Квіти рожеві з темно-фіолетовими плямками. Пелюстки загарнуті назад, форма квітки нагадує турецький тюрбан. Квітує протягом червня-липня. Росте в листяних і мішаних лісах, серед чагарників. Ареал євросибірський, в Україні вид поширений в лісовій зоні та в Лісостепу. Трапляється в лісах по всій Хмельницькій області. Рослина знищується людиною як декоративна, а також випасанням худоби на лісових ділянках. Охороняється на багатьох природно-заповідних територіях, зокрема в заказниках "Городоцький", "Довжоцький", "Дорогоща", "Кошаринський", РЛП "Мальованка".

Астранція велика (*Astrantia major* L.) - рослина з родини зонтичних. Зонтички у неї своєрідні - невеликі, компактні, з великими рожевими обгортками. Поширена астранція в Центральній Європі, переважно в горах. На території України нерідко трапляється в Карпатах, на рівнині, поступово рідшаючи, доходить до Житомира. Росте на луках, узліссях, в лісах. На Хмельниччині трапляється рідко. Відоме давнє місцезнаходження цього виду біля Полонного, яке відмічав ще І.Ф.Шмальгаузен. Три локалітети виявлено в Шепетівському та Ізяславському держлісгоспах. Вказується ця рослина і для НПП "Подільські Товтри".

Шолудивник королівський (*Pedicularis sceptrum-carolinum* L.) - багаторічна трав'яна рослина. При основі має розетку видовжених з виїмками листків. Гранчасте стебло виносить в гору колосовидне суцвіття з оригінальними великими квітами, в забарвленні яких поєднуються жовтий і червоний кольори. Рослина веде напівпаразитний спосіб життя. Росте на низинних болотах та торф'янистих луках. Є льодовиковим реліктом. У післяльодовиковий час шолудивник королівський зберігся в окремих локалітетах. В Україні трапляється на Поліссі, Розточчі та в Лісостепу. Рослина зникає після осушення боліт. На Хмельниччині вид є дуже рідкісним. Необхідно виявляти та брати місцезнаходження цього виду.

Товстянка звичайна (*Pinguicula vulgaris* L.) - комахоїдна рослина з довгастоеліптичними листками, зібраними у прикореневу розетку. Зверху листки вкриті клейкими залозками. У червні-серпні на квітконосному стеблі з'являється одна синювато-фіолетова квітка. Комахи прилипають до залозок із клейкою рідиною, що паралізує комах. Зростає на евтрофних, переважно осоково-гіпнових болотах, заболочених луках. В Україні вид знаходиться на південно-східній межі ареалу, трапляється на Західному і Малому Поліссі, Волинській височині, на Поділлі і в Карпатах. На Хмельниччині зустрічається дуже рідко. Внаслідок осушення боліт кількість місцезростань цього виду скорочується, сучасні дані про наявність в області цього виду відсутні.

Верба чорнична (*Salix myrtilloides* L.) - невеличкий чагарник до 1,5 м заввишки. Листки дрібні, еліптичної форми, подібні на листки чорниці. Росте переважно на торфових болотах. Трапляється невеликими куртинами. Вербу чорничну вважають льодовиковим реліктом. На території України цей вид поширений на Полісі та Розточчі, рідко він трапляється на півночі Лісостепу. На Хмельниччині це рідкісний вид. Відомо 4 місцезнаходження в північній частині області. Одне з них - давнє місцезнаходження, відмічене І.Ф.Шмальгаузенем біля Полонного. Нині відомі і охороняються локалітети виду в РЛП "Мальованка", ботанічному заказнику місцевого значення "Хутірський", гідрологічній пам'ятці природи загальнодержавного значення "Озеро Святе".

Рослина чутлива до осушення боліт і зникає при меліорації.

Тофільдія чашечкова (*Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb.). Це - рідкісний представник лілійних, що знаходиться під загрозою зникнення. Вид знаходиться на північно-східній межі ареалу. Зростає на заболочених луках, евтрофних та мезотрофних болотах. Тофільдія чашечкова - багаторічна рослина з мечовидними листками. Дрібні жовтувато-білі квіти зібрані в досить густий колос. Цвіте у червні-липні. Плід - яйцевидна загострена коробочка. Рослина розмножується насінням і кореневищем. На Хмельниччині ця рослина трапляється рідко. Необхідно виявляти місцезнаходження виду, контролювати стан популяцій.

Гронянка півмісяцева, ключ-трава (*Botrychium lunaria* (L.) Sw.). Це невелика оригінальної форми папороть. Вона належить до малочисельної родини вужачкових. Наукова назва гронянки походить від грецького слова "ботріхіон", що означає китиця. Серед багатьох народних назв найбільш відома - ключ-трава. Ця назва походить від того, що розсічений спороносний колосок нагадує нижню частину старого ключа. Саме тому цій рослині приписували магічну силу у відшукуванні скарбів,

схованих в землі, у знаходженні питної води, лікувальних джерел. Листки (вайї) цієї папороті голі та м'ясисті, вони складаються із спороносною та стерильною (безплідною) частини. Гронянка півмісяцева зростає у світлих соснових та мішаних лісах, в чагарникових заростях, на сухих луках. В Україні зрідка трапляється в Поліссі, Лісостепу і Гірському Криму, трохи частіше - в Карпатах. На Хмельниччині гронянка півмісяцева є дуже рідкісним видом. Внаслідок вирубування та витоптування лісів цей вид трапляється все рідше.

Ситник бульбистий (*Juncus bulbosus* L.). Малопоширена гідрофільна рослина. Це - центральноевропейський вид, який в Україні знаходиться на східній межі ареалу. Основні відомі в Україні місцезнаходження знаходяться в Закарпатті та на Правобережному Поліссі. Рoste ситник бульбистий в обводнених зниженнях на сфагнових болотах, на обводнених ділянках заболочених лісів, у меліоративних каналах. Є відомості про зростання виду на Закарпатті на обводнених ділянках заплави. Рослина стає помітною, коли вода спадає. Стебельця її мають бульбоподібні потовщення біля основи, що й обумовило видову назву цієї рослини. Ситник бульбистий дуже чутливий до антропогенного впливу і стає все більш рідкісним внаслідок осушення боліт та забруднення водойм. На Хмельниччині відомо два його місцезростання. Одне з них - на березі озера Святого, що в Ізяславському районі (гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення). Друге місце знаходиться в гідрологічному заказнику місцевого значення "Теребіжі" в Славутському районі. Тут вид зростає також на березі заростаючого озера. Сподіваємось, що при подальших дослідженнях на Хмельниччині будуть виявлені нові місцезростання цього виду.

Сальвінія плаваюча (*Salvinia natans* L.). Це реліктова водна папороть, невеличка за розміром - до 15 см завдовжки. Зростає в стоячих водоймах та в річках з повільною течією. На поверхні води рослину утримують два ряди яйцевидних листків із спеціальними повітряними мішечками. Листки вкриті восковою плівочкою, тому з них стікає вода. Сальвінія ще має третій ряд листків, які нагадують корені і забезпечують рослині мінеральне живлення. На занурених у воду листках утворюються спорангії. В Україні сальвінія плаваюча зустрічається майже на всій території, переважно в заплавах великих річок - Дніпра, Дунаю, Десни, Сіверського Донця та інш. На Хмельниччині трапляється рідко. Вид занесено до Додатку I Бернської конвенції.

Скополія карніолійська (*Scopolia carniolica* Jacq.). Багаторічна трав'яна рослина з родини пасльонових 20-50 см заввишки. Має еліптичні звужені біля основи листки. Рослина вегетує у квітні-червні, цвіте у квітні-травні. Квіти поодинокі, трубчасто-дзвоникovidні, пурпурово-коричневі. Рoste у

листяних лісах на багатих ґрунтах. Скополія карніолійська - центральноевропейський вид. В Україні зрідка трапляється в Карпатах, Західному і Правобережному Лісостепу. На Хмельниччині ця рослина трапляється зрідка. Відома на території заказників "Панівецька дача", "Велика і Мала Бугаїха", "Іванковецький", "Городоцький". Необхідно виявляти місцезнаходження виду та контролювати стан популяцій.

Вони заслуговують на охорону

В розмаїтті рослинного світу Хмельниччини чимало рослин, місцезростання яких є давні і останнім часом не підтверджуються. До таких рослин належить **синюха голу́ба** (*Polemonium caeruleum* L.), яка вперше була виявлена (коли?) в північній малополіській частині області. Це євразійський вид, який в Україні трапляється на Поліссі, в Лісостепу і на північному сході степової зони. Це вологолюбна і вибаглива до ґрунтів рослина. Основні її місцезростання пов'язані з торф'янистими та заболоченими луками. Саме в таких умовах і виявлена ця рослина в урочищі Лізне на території РЛП "Мальованка", де на торф'янистих луках серед квітучого різнотрав'я - вербозілля звичайного, валеріани високої та інших видів - добре помітні її сині квіти. Листки синюхи непарнопірчастороздільні з яйцевидно-ланцетними листочками. Популяція є досить чисельною, рослини мають добру життєвість. Поодинокі синюха голу́ба виявлена в околицях м.Нетішина.

Ситник розчепірений (*Juncus squarrosus* L.) - вид, ареал якого охоплює Атлантичну та Центральну Європу. В Україні він знаходиться на східній межі поширення. Основні місцезростання ситника розчепіреного в Україні знаходяться у Західному та Центральному Поліссі, розсіяно вид трапляється у Передкарпатті, Розточчі, Опіллі, Західному Поділлі. Росте ця рослина по краях боліт, в заболочених лісах, вздовж доріг в соснових лісах. На Хмельниччині перші відомості про цю рослину датуються 1885 роком. Зібраний в цей час І.Ф.Шмальгаузенем зразок зберігається у національному гербарії України (KW). Це багаторічно сіро-зелена рослина з жорсткими дуговидними листками, зібраними біля основи стебла, які лежать на моховому покриві та підстилці. Форма листків обумовила видову назву рослини. Цей вид відомий на Хмельниччині в урочищі Тереміжі. Рослини виявлені у заболоченому злаковому березняку біля заболочених озер. Росте ситник розчепірений і на березі оз.Святе. Ці ділянки входять до природно-заповідних територій - гідрологічного заказника місцевого значення "Тереміжі" та гідрологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Озеро Святе".

Багно звичайне (*Ledum palustre* L.). Це вічнозелений розгалужений чагарник до 1,5 м висоти. Листки вузькі, зверху темно-зелені, блискучі.

Білі квіти зібрані на верхівці стебла в щитковидне суцвіття. Рослина має сильний запах. Рoste на сфагнових болотах, у заболочених та сирих соснових лісах. В Україні багно звичайне поширене переважно на Поліссі. На Хмельниччині ця рослина трапляється в північній частині області. Охороняється в РЛП "Мальованка".

Бобівник трилистий (*Menyanthes trifoliata* L.). Трав'яна рослина з трійчастими листками на довгих черешках. В народі цю рослину називають трилисник або трифоль. Квіти білі або біло-рожеві. Рoste на низинних та переходових болотах, в заболочених лісах. Вид зустрічається майже по всій Україні, але в степовій зоні рідко. На Хмельниччині бобівник трилистий трапляється нерідко нерідко. Вид є на території РЛП "Мальованка", в гідрологічному заказнику загальнодержавного значення "Башта", в гідрологічному заказнику місцевого значення "Вовчанський".

Вовче тіло болотне (*Comarum palustre* L.). Болотна рослина з пальчатороздільними гостропилчастими листками, які знизу опушені сріблястими волосками. Квіти темно-червоного кольору. Вовче тіло зростає на низинних та переходових болотах, в заболочених лісах, по берегах лісових річок. В Україні нерідко трапляється на Поліссі, в лісостеповій зоні значно рідше. На Хмельниччині вид поширений переважно в північних районах. Вид є на території РЛП "Мальованка", в гідрологічних заказниках "Башта" і "Вовчанський".

Латаття сніжно-біле (*Nymphaea candida* J.et C.Presl.) та **латаття біле** (*Nymphaea alba* L.). Це - гарні водні рослини. Ім'ям німф назвав рід відомий шведський ботанік К.Лінней. В народі рослини називають водяними ліліями, русалчиним цвітом. Латаття сніжно-біле відрізняється від латаття білого дещо меншим розміром квіток та особливостями її будови. Рослини ростуть в стоячих та слабопроточних прісних водоймах. Латаття біле поширене по всій території України, а латаття сніжно-біле - переважно в її північній половині. Латаття сніжно-біле відмічене в РЛП "Мальованка", в гідрологічному заказнику загальнодержавного значення "Башта". Латаття біле - у гідрологічному заказнику місцевого значення "Вовчанський".

Плющ звичайний (*Hedera helix* L.). Рослина є третинним реліктом. Плющ являє собою собою ліану з вічнозеленими блискучими лопатевими листками. Здерев'яніле стебло стелеться по землі або піднімається на дерева і скелі. Рoste в лісах на ґрунтах, багатих на кальцій. Вид поширений в Західній, Центральній та Південній Європі. В Україні. В Україні вид поширений в Карпатах, на Західному Поліссі, на Поділлі. Найсхідніші локалітети знаходяться у Вінницькій області. В умовах Хмельниччини плющ як правило не піднімається на дерева, а стелеться по землі, де взимку він захищений від морозів сніговим покривом. Трапляється в різних частинах області, але частіше в її південній частині. Вид є на багатьох природно-заповідних територіях, зокрема в заказниках

загальнодержавного значення "Велика і Мала Бугаїха", "Сатанівський", "Циківський", "Панівецька дача".

Косарики черепитчасті (*Gladiolus imbricatus* L.). Рослина з лінійними листками і однобічним верхівковим суцвіттям із рожевих квітів. Ростає на вологих і заболочених луках. В Україні вид поширений в лісовій і лісостеповій зоні, в основному на Правобережжі. На Хмельниччині відоме місцезнаходження в урочищі Лізне на території РЛП "Мальованка".

Вовчі ягоди звичайні (*Daphne mezereum* L.). Невеликий чагарник заввишки 40-120 см з довгасто-ланцетними листками, зібраними на кінцях гілок. Квітки запашні, рожевого кольору, скупчені пучками в піхвах торішніх листків. Цвіте у квітні-травні. Плід - червона кістянка. Вовчі ягоди звичайні ростуть у листяни лісах. В Україні вид поширений в лісовій зоні. Рідше трапляється на півночі Лісостепу. На Хмельниччині трапляється на багатьох природно-заповідних територіях, зокрема в ботанічному заказнику загальнодержавного значення "Панівецька дача", лісовому заказнику місцевого значення "Дорогоща".

Тирлич хрещатий (*Gentiana cruciata* L.). Багаторічна трав'яна рослина з довгасто-ланцетними супротивними листками, зрощеними при основі. В Україні вид зрідка трапляється на більшій частині території. Ростає на сухих узліссях і луках на ґрунтах, багатих на кальцій. На Хмельниччині трапляється рідко в різних частинах області. Вид відомий в ботанічній пам'ятці природи місцевого значення "Курган" (Славутський район).

Тирлич звичайний (*Gentiana pneumonanthe* L.). Інший вид роду. Листки вужчі, ніж у попереднього виду. Зростає на вологих луках, узліссях. Євросибірський вид, трапляється на більшій частині України.

РІДКІСНІ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Не лише види рослин та тварин, але й рослинні угруповання бувають рідкісними. Адже серед лісових, лучних, болотних, степових ділянок, типових для певного краю, трапляються особливо цінні, такі, які мають велике наукове значення. Насамперед, це ті рослинні угруповання, в яких переважають (є домінантами) рідкісні, реліктові та ендемічні види. Побудовані цими видами угруповання є вразливими і потребують охорони. Їх важливо зберегти - адже природа сторіччями формувала їх, даючи нам нині ключ до розуміння розвитку рослинного світу. Рідкісними також є угруповання, в яких переважаючі види (домінанти та співдомінанти) знаходяться на межі свого ареалу - наприклад, букові ліси на Хмельниччині, деякі угруповання середземноморських видів у Криму. В Україні рослинні угруповання, які потребують охорони, занесені до Зеленої книги України.

На Хмельниччині найбільша кількість рідкісних угруповань із Зеленої книги належить до лісової рослинності. Серед них переважають ті, основний ареал яких розташований в Середній (Центральній) Європі. Серед них насамперед треба назвати *дубові та грабово-дубові ліси трясунковидноосокові*. Домінант їх трав'яного ярусу - осока трясунковидна - є центральноєвропейським видом, нерідко переважає в листяних лісах цього регіону. Такі ліси розташовуються на плескатих, погано дренажованих ділянках межиріч з вологими та мокрими дерново-підзолистими оглеєними ґрунтами. Ці ліси мають густий деревостан, підлісок із ліщини або крушини. Густий травостій майже суцільно вкриває землю. Осока трясунковидна відіграє в ньому провідну роль, з нею зростають неморальні та бореальні лісові види з домішкою болотних. Ці угруповання поширені в поліській частині області, рідше трапляються в її центральній частині. Вони на значних площах представлені в РЛП "Мальованка".

До центральноєвропейських угруповань належать *грабово-дубові ліси плющові та підмаренниково-плющові з підмаренником запашним*. Це рідкісні для України угруповання з домінуванням реліктового виду - плюща звичайного. В Україні ці угруповання трапляються в Закарпатті та Передкарпатті, на Подільській та Волинській височинах, на Західному Поліссі. Угруповання мають деревостани, в яких перший ярус формує дуб, а другий - граб. Розріджений підлісок утворюють бруслина європейська, свидина. В наземному покриві переважає плющ. Він утворює густі зарості і часто піднімається по деревах до 10 м і вище. Крім плюща, тут звичайні такі неморальні види як яглиця, зеленчук, підмаренник запашний.

Листяні ліси із цибулею ведмежою також є угрупованнями, представленими в Центральній та Південній Європі, крім того такі ліси

трапляються на Кавказі та в Малій Азії. В Україні такі ліси спорадично поширені на Подільській та Придніпровській височинах, в Закарпатті та Передкарпатті, рідко трапляються на Поліссі та в Лівобережному Лісостепу. Угруповання листяних лісів з цибулею ведмежою нерідко займають днища балок, трапляються і на вирівняних плакорних ділянках та схилах. Деревний ярус побудований дубом, ясенем, грабом. В густому травостої в квітні-червні панує цибуля ведмежа, її білі суцвіття в травні утворюють суцільний аспект. В другій половині літа її надземна частина відмирає, тому ці ліси виглядають як рідкотравні.

Для угруповань, характерних для Центральної Європи в її південній частині та для східного Субсередземномор'я, належать *дубові ліси із дуба скельного та дуба звичайного з підліском із кизилу* (дерену) - субсередземноморського виду. Це - рідкісні для рівнинної частини України ліси на північній та східній межі ареалу. В Україні вони мають локальне поширення в Придністров'ї, Закарпатті, більші площі займають у Гірському Криму. В Придністров'ї, в тому числі на півдні Хмельниччини, зростають на стрімких схилах південної експозиції із сухими ґрунтами (темно-сірими, чорноземами опідзоленими та дерново-карбонатними). Це досить світлі ліси з участю в підліску свидини, субсередземноморських видів - кизилу, клокички пірчастої, калини-гордовини. Субсередземноморські види наявні і в травостої. Це осока парвська, купина широколиста, егоніхон (горобийник) пурпурово-голубий. Ці рідкісні на рівнині України лісові угруповання мають велику наукову цінність, вони є центрами поширення південноєвропейських видів на північній межі ареалу. На Хмельниччині такі ліси невеликої площі ділянками трапляються в південній частині області, зокрема в ботанічному заказнику загальнодержавного значення "Панівецька дача". В їх деревостані переважає дуб звичайний, дуб скельний на території області трапляється нечасто.

До рідкісних угруповань, поширених в Середній Європі та Східному Субсередземномор'ї належать і *дубові ліси дуба звичайного з переважанням у травостої осоки гірської та осоки парвської*. Вони поширені на Подільській височині і займають тут вирівняні ділянки межиріч з темно-сірими опідзоленими свіжими ґрунтами на лесах. Поширення таких лісів у Хмельницькій області недостатньо з'ясоване. Даних про їх наявність на природно-заповідних територіях немає.

Дуже рідкісними для області є угруповання *дубово-соснових лісів рододендронових*. Рододендрон жовтий (азалія понтійська) - реліктовий диз'юнктивно-ареальний вид, який зростає на Кавказі та на Українському Поліссі в межах Житомирської та прилеглої частини Рівненської областей. Дубово-соснові ліси з рододендроном жовтим, що утворює досить густий підлісок, представлені в залежності від екологічних умов рододендроново-чорницевими, рододендроново-осоковими (з осокою трясунковидною) та осоково-сфагновими ценозами. Видовий склад

типовий для дубово-соснових лісів - тут поєднуються бореальні види хвойних лісів та види широколистяних лісів. На Хмельниччині маленька ділянка дубово-соснового лісу рододендроново-чорницевого відома на території РЛП "Мальованка". Слід зауважити, що окремі локалітети рододендрона жовтого є також в Білорусі та Польщі, де вони охороняються. Таємниця поширення цього виду ще чекає на своє з'ясування.

Дубові ліси із дуба звичайного татарсьkokленові також є рідкісними на Хмельниччині. Вони є типовими південній частині лісостепової та в північній частині степової зони, в Хмельницькій області знаходяться на північно-західній межі ареалу. Формуються такі ліси переважно на схилах балок та долин в середній та південній частинах області. Дубові ліси татарсьkokленові мають багате флористичне ядро, яке об'єднує субсередземноморські, світлолюбні неморальні та лучно-степові види. Дуб утворює деревний ярус з домішкою ясена, липи, клена польового. Клен татарський формує підлісок, інколи досить густий. В травостой переважають яглиця, конвалія. Трапляються, а інколи й домінують, перлівка ряба, осока Мікеля, егоніхон пурпурово-голубий.

Решта занесених до Зеленої книги України лісових угруповань Хмельниччини - це зональні, найбільш типові для України та Хмельницької області угруповання, рештки старих лісів різних формацій. До них належать грабово-дубові ліси волосистоосокові та яглицеві, соснові ліси зеленомохові та чорницеві, дубові ліси ліщинові. Охорона добре збережених ділянок таких лісів, які сформувалися за довгі віки, допоможе нам зберегти біорізноманіття, вивчити розвиток рослинності.

На Хмельниччині виявлено також декілька рідкісних степових угруповань. Степи Поділля, в тому числі Хмельниччини, є не зональними, а едафічними. Вони тут трапляються на дерново-карбонатних ґрунтах, які формуються здебільшого на вапняках. Ці західні степи є дуже цінними для охорони біорізноманіття, оскільки в їх флористичному складі чимало рідкісних видів. Дуже рідкісними для Поділля є й деякі домінанти цих степів.

Характерними для Поділля є степи з домінуванням *осоки низької*, які на території України трапляються ще в Гірському Криму та на Середньоруській височині. Поширення таких степів пов'язане з ґрунтами, багатими на кальцій та карбонати. Осока низька формує звичайно досить щільний травостій. Як співдомінанти її трапляються типчак, келерія гребінчаста. Із рідкісних видів в низькоосокових степах на Поділлі трапляються зіноваті подільська та Блоцького. Ці реліктові степи вимагають повсюдної охорони.

Нерідко серед степової рослинності трапляються ділянки з домінуванням *ковили волосистої*. Такі степи поширені переважно степовій і лісостепових зонах Євразії. Вони повсюдно в Україні скорочують зайняту ними площу. На Хмельниччині трапляються на

товтрах, схилах річкових долин, найчастіше - у Дністровському каньйоні. Ці угруповання займають найсухіші ділянки - верхні та середні частини схилів південної експозиції, вершини вузьких гребенів. Трапляються як чисті волосистоковилі степи, так і волосистоковилі степи із співдомінуванням типчака, перстача піщаного, осоки низької, келерії гребінчастої, бородача.

Степи з домінуванням *ковили пірчастої* трапляються на території Хмельницької області рідше. Ці степи займають дещо вологіші ділянки, ніж степи з домінуванням *ковили волосистої*. Тут часто можна зустріти такі лучні-степові види, як суниця зелена, конюшина гірська, гадючник звичайний, які не характерні для волосистоковилих степів. Як співдомінанти трапляються типчак, осока низька, тонконіг вузьколистий.

До групи реліктових степових угруповань належать степи з домінуванням *сеслерії Гейфлера*. Це ценози центральноєвропейського гірського виду на східній межі ареалу. В Хмельницькій області вони відомі біля сіл Панівці, Шутнівці та Устя Кам'янець-Подільського району (НПП "Подільські Товтри"). Видовий склад сеслерієвих степів характеризується поєднанням лучно-степових, петрофітно-степових та узлісних видів таких, як тонконіг різнобарвний (занесений до Червоної книги України), шавлія мутовчаста, куцоніжка пірчаста, маренка рожева, ласкавець серповидний, оман мечолистий, ауринія скельна, самосил гайовий, суховершки великоквіткові, в'язіль барвистий та ін.

На кам'янистих ділянках південної частини області трапляються рідкісні степові угруповання з домінуванням *тонконогу різнобарвного*. Ареал цих угруповань охоплює лісостепову частину Західного Поділля та північний захід Молдови. Ці угруповання мають перехідний характер між степовою та скельною рослинністю. Крім домінанта, в них найчастіше трапляються типчак, ковила волосиста, перстач піщаний (інколи співдомінує), пирій середній, перлівка трансільванська, самосили гайовий та панонський, цибуля гірська.

Угруповання костриці блідуватої, які також трапляються на Хмельниччині, являють собою рідкісні угруповання на східній межі ареалу. Вони поширені в Центральній Європі, Середземномор'ї, Малій Азії. На території України є кілька локалітетів на Західному Поділлі. Займають верхівки та круті схили кам'янистих пасм з дерново-карбонатними ґрунтами на гіпсах та вапняках. Ці угруповання в еколого-ценотичному аспекті належать до петрофітного варіанту лучних степів. Як співдомінанти виступають осока низька, ковила волосиста, самосил гайовий.

Боліт на Хмельниччині небагато, тому тут із рідкісних болотних угруповань представлені лише ценози осоки Девелла. Це реліктові угруповання центральноєвропейського виду на східній межі ареалу. Осока Девелла в Україні утворює угруповання на Малому Поліссі, на Волинському лесовому плато та в Західному Поділлі. Вони займають

долини невеликих річок, представлені на карбонатних евтрофних болотах з неглибоким (1-2 м) шаром тофу. Осока Девелла утворює невеликі купини. Співдомінують з нею молінія голуба, медова трава шерстиста, щучник дернистий. Моховий покрив із гіпнових мохів частіше розріджений, але місцями добре виявлений. У флористичному ядрі разом з широкоареальними видами наявні такі центральноевропейські види, як сашник іржавий, товстянка звичайна, сверція багаторічна. Фрагменти цих угруповань наявні у малополіській частині області. Вони виявлені в околицях с.Комини та в кв. 83 Плужнянського лісництва Ізяславського держлісгоспу.

Наявні на Хмельниччині і рідкісні водні угруповання. До них належать угруповання плавуну щитолістого, їжачої голівки малої, глечиків жовтих, латаття сніжно-білого, латаття білого.

Особливий інтерес являє знаходження тут ценозів плавуну щитолістого. Це рідкісні на території України реліктові угруповання. На Хмельниччині вони виявлені по р.Південний Буг в Летичівському районі в заказнику "Башта". При квітнуванні плавуну щитолістого водойма влітку вкривається яскравими жовтими квітами.

Угруповання їжачої голівки малої знаходяться в області на південній межі ареалу. Вони спорадично трапляються в північній частині області. Ці угруповання займають прибережні мілководдя непроточних і напівпроточних водойм з не дуже багатим мінеральним живленням. Охороняються вони на території РЛП "Мальованка".

Угруповання глечиків жовтих спорадично трапляються у водоймах по всій території області. Дещо рідше трапляються ценози латаття білого та латаття сніжно-білого. Латаття сніжно-біле та його угруповання в Хмельницькій області знаходяться на південній межі ареалу. Вони спорадично трапляються у водоймах на півночі області, в південніших районах - рідко. Охороняються в пам'ятці природи "Озеро Святе", заказнику "Теребіжі", РЛП "Мальованка". Угруповання латаття білого відомі з різних частин області, зокрема відмічені у гідрологічному заказнику "Вовчанський" у Деражнянському районі.

Нині ботаніки України працюють над другим, доповненим виданням Зеленої книги України, яка буде державним документом, подібно до Червоної книги. Всі охарактеризовані рідкісні рослинні угруповання Хмельниччини знайдуть своє місце як об'єкти вивчення та охорони.

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА МЕРЕЖА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Регіональний ландшафтний парк "Мальованка" - лісова казка Хмельниччини

В мальовничому лісовому краї на півночі Хмельниччини, на межі Шепетівського та Полонського районів, знаходиться регіональний ландшафтний парк "Мальованка". Він створений в 1999 році. В 2004 році рішенням Хмельницької обласної ради народних депутатів територія "Мальованки" розширена і становить 16920 га (в тому числі заповідної зони - 3160,4 га - 18,7%). Вона включає околиці сіл Савичі, Хролин, Мальованка, Поляни, Купино, Городнявка. **До складу регіонального парку "Мальованка" входять 6 заказників: лісовий - "Полонський", ботанічний - "Русалчині поляни", гідрологічні - "Купинський", "Савицький", "Горіле болото", "Мальованський" та дві пам'ятки природи - "Азалія понтійська" та "Дуб черешчатий".**

Це казковий край смарагдових лісів, духмяних боліт та голубооких озер. Через велику заболоченість, незначну родючість ґрунтів, придатних для сільськогосподарського виробництва, він здавна залишався малоосвоєним. Саме в цих лісових нетрях український люд рятувався від монголо-татарського нашествия. Тут переховувались язичники від місіонерів з Візантії, які вихрещували Русь.

Проте в історії розвитку регіону був період, коли територія парку зазнала підвищеного антропогенного впливу. В кінці XVII і на початку XIX століття колоністи з Німеччини, Польщі, Чехії активно освоювали цей край. Серед лісів виникали численні хутори з гончарним та гутним ремеслом. Адже на території парку зосереджені великі запаси будівельного та кварцового піску, родовища різних сортів глини. Є тут лікувальні сапоніти з радіопротекторними властивостями. Ними здавна підгодовували свиней. Широко поширені волинські каоліни, які використовувались у керамічному, силікатному, паперовому та гумовому виробництвах. Великі запаси якісної червоної глини дозволяли виготовляти черепицю. Ще й досі на дахах будинків в Шепетівському та Полонському районах можна побачити черепицю зі штампами, які свідчать про виробництво на заводах польського князя Сангушка.

Значним попитом користувались вироби мальованських та судимонтських гончарів, які вміли виготовляти та розмальовувати посуд, іграшки-мальованки. Напевно звідси походить назва села "Мальованка", яке знаходиться в центрі регіонального ландшафтного парку. А можливо мальовнича природа цього чарівного краю дала йому таку прекрасну назву?

В 30-ті роки ХХ століття Шепетівський округ був прикордонною територією. В результаті масової колективізації та депортації з прикордонної зони колоністів хутори були ліквідовані. Про їх існування нині нагадують лише залишки садів на узліссях, галявини та їх назви - Ботвівщина, Острівщина, Стаховщина, Муравщина, Альбінеччине, Даусове, Брандісове.

Зараз на території парку є три невеликих населених пункти Шепетівського району – села Мальованка, Купино, Савичі. Їх населення зайняте в сільському господарстві та лісництві. Сільськогосподарськими угіддями зайнято 3138 га, що складає 20% території парку, тоді як в Шепетівському районі на сільськогосподарські угіддя приходить 62%. Лише 10% території становлять орні землі. Громадське тваринництво розвинене слабо. Жителі приватно добувають торф, варять з березової кори дьоготь, збирають на продаж гриби, ягоди, лікарські рослини.

Промислових об'єктів на території парку немає. За радянських часів в Купино працював цегельний завод вогнетривів. Він переробляв каоліни, які добувались на Купиненському, Судимонтському та Буртинському родовищах (потужність каолінових пластів 5-10 метрів). Останні роки завод не працює.

В минулому на території краю були розвинені залізрудні промисли - добували болотну залізну руду. Тут багато торфовищ. Майже 20 років (70-80 роки ХХ століття) біля Мальованки добували торф. Про це нагадують штучні озера, на які перетворились торф'яні кар'єри.

Територія регіонального ландшафтного парку "Мальованка" дуже відрізняється за рельєфом, кліматичними умовами, характером ґрунтів, підстилаючих порід, рослинного та тваринного світу від основної, подільської частини області. Вона розташована на межі Малого та Центрального Полісся.

Тут переважає відносно незмінений природний ландшафт. Поверхня відзначається рівнинним рельєфом, вкрита зандровими пісками на неглибоко залягаючих кристалічних породах. При залісненні області 11,9% понад 60% території РЛП "Мальованка" вкриті лісами.

Специфічність рослинного світу полягає в тому, що він поєднує в собі риси рослинності як західної частини Малого Полісся, так і Центрального Полісся. Саме по території парку, по лінії Миньківці - Червоний Цвіт - Судимонт – Поляни, проходить східна межа Малого Полісся.

Територія західної частини "Мальованки" належить до Малого Полісся. В її рослинному покриві переважають соснові та дубово-соснові ліси. В соснових лісах поширені неморальні види та види, характерні для Карпат. Як і для західної частини Малого Полісся характерна значна участь центральноєвропейських видів, які знаходяться тут на східній межі ареалу. Переважають торф'янисті та болотисті луки, багато різноманітних боліт. Не зовсім характерними для Малого Полісся є

незначна глибина залягання кристалічних порід, наявність дерново-середньопідзолистих ґрунтів, велика залісненість.

Територія східної частини парку належить до Житомирського Полісся. Тут повністю відсутні водно-льодовикові морени, елювій вапняку, більш багаті ґрунти, частіше трапляються дубові і дубово-соснові ліси ліщиново-трясунковидноосокові та крушиново-трясунковидноосокові. В Полонському лісництві виявлено фрагмент угруповання дубово-соснового лісу рододендрово-чорницевого, яке зустрічається переважно в Центральному Поліссі. На вододілах є багато боліт-блюдець. Проте тут мало березово-соснових та похідних березових лісів, осикових боліт, властивих для Центрального Полісся.

На території парку виявлено чотири типи рослинності - лісовий, лучний, болотний, фрагментарно представлена водна рослинність. Переважає лісова рослинність (Рис.1. Карта рослинності регіонального ландшафтного парку "Мальованка"). Головними лісоутворюючими породами є сосна звичайна та дуб звичайний. Характер розподілу рослинних угруповань в залежності від рельєфу та характеру ґрунтів показує еколого-фітоценотичний профіль території парку. (Рис.2. Розподіл рослинності на еколого-фітоценотичному профілі "Мальованка")

Соснові ліси зростають на дерново-слабопідзолистих і середньопідзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах різного ступеня зволоженості. Вони вкривають майже всі елементи мезорельєфу. Трапляються зазвичай навколо озер, боліт. Найпоширенішими в північній частині парку є соснов та березово-соснові ліси, в травостої яких домінує молінія голуба - шовковистий злак, що має синюватий відтінок основи стебла та суцвіття. Такі угруповання формуються в пониженнях рельєфу.

На знижених плескатих міжсхлових ділянках трапляються соснові та дубово-соснові ліси із суцільним зеленим моховим килимом, який утворюють плевроцій, політрих, дикран та інші мохи.. В травостої зазвичай зростають типові мешканці північних лісів - чорниця, брусниця, одинарник європейський, грушанки круглолиста та мала, ортілія однобока, щитники шартський та зрідка - австрійський. У більш вологих місцях на моховому килимі розростається чорниця. Часто трапляються великі плями плауна колючого - виду, занесеного до "Червоної книги України". Він тут почувається досить добре, спороносить і утворює угруповання. Дуже рідко можна зустріти маленькі (40-50см) темно-зелені куртини іншого плауна - баранця, який також занесений до "Червоної книги України" та місцезростання осоки кульконосної.

На підвищеннях, піщаних горбах соснові ліси зеленомохові мають дещо інший вигляд. Приклад тому - рослинний покрив Вінярського горба. Тут сосни дещо нижчі, але стовбури їх більш кремезні та покручені. В другому ярусі подекуди трапляються дуби. Ліс розріджений, сонячний. В травостої зростають духмяні чебреці, верес, чорниця, ожика волосиста, смовдь гірська, скорзонера низька, зіновать Цінгера.

Внаслідок антропогенного впливу соснові ліси зеленомохові трансформувались в похідні угруповання, які мають спрощені склад та будову ценозів, розріджений моховий покрив. Вони займають значні площі біля населених пунктів, пасовищ, зростають на сухих підвищених ділянках з дерново-слабопідзолистими піщаними ґрунтами. В трав'яному покриві домінують мітлиця тонка, костриця червона, біловус стиснутий. Ці ценози часто формуються і в насадженнях сосни.

Незначні ділянки в регіональному ландшафтному парку "Мальованка" займають старі сосново-дубові ліси з домінуванням в травостої осоки трясунковидної. Вони формуються на дерново-середньопідзолистих та дерново-слабопідзолистих супіщаних і піщано-суглинистих ґрунтах.

Широколистяні ліси поширені на більш родючих сірих лісових ґрунтах головним чином на Полонщині. Серед них найбільшу площу займають дубові ліси - переважно крушиново-трясунковидноосокові - центральноєвропейські угруповання на східній межі ареалу. Вони занесені до "Зеленої книги України". Зростають такі ценози у великому лісовому масиві на межі Полонського та Шепетівського районів. Вони в основному середньовікові, інколи зустрічаються старі (урочище Лізне). Зниженість поверхні, значне зволоження, м'який клімат створюють сприятливі умови для формування таких лісів. Домішка інших порід у деревостані невелика, це - осика, подекуди береза та сосна. Деревостан утворюють дуб звичайний та поодинокі граб звичайний, вільха клейка. В підліску переважає крушина ламка, трапляються ліщина звичайна, бруслина бородавчаста, вовчі ягоди звичайні. Трав'яний покрив у вигляді суцільного зеленого моря утворює осока трясунковидна. Шовковистими хвилями стелиться вона між деревами. Ця краса надихнула поета на такі чудові рядки пісні: "Над дубами вгорі неба синь, називає народ ту траву "волосін". Флористичний склад фітоценозів досить бідний. Тут переважають здебільшого північні, бореальні види, такі як куничник очеретяний, веснівка дволиста, вербозілля звичайне, проте трапляються і центральноєвропейські - кадило сарматське, підмареник середній, молочай гранчастий, живокіст серцевий та осока затінкова, яка занесена до "Червоної книги України".

На плескатих підвищеннях зростають дубові ліси крушиново-конвалієві та ліщиново-орляково-конвалієві. Вони більш флористично багаті. В трав'яному покриві таких лісів з'являються світлолюбні рослини. Здалеку можна побачити темно рожеві свічечки буквиці лікарської, жовтаві "наперстки" наперстянки великоквіткової, "царські кучері" лілії лісової, бордово-коричневі глечики серпію фарбувального. Особливо яскраво виглядають ділянки, де зростає перестріч гайовий - рослина з жовтим віночком та синіми приквітковими листками. Згідно з легендою, брат Іван та сестра Мар'я були розлучені відразу після народження. Коли ж через деякий час вони зустрілись, то покохали один одного, але одружитись не змогли. Ось і перетворились на жовто-синю квітку.

Рослина має нормальні зелені листки, проте недорозвинені корені не здатні повноцінно її годувати, тому перестріч веде напівпаразитичне життя. Його корені прикріплюються до кореневої системи рослини-господаря.

В північній частині парку місцями трапляються дубові ліси чорницеві та молінієво-чорницеві, в основному середньовікові, із поростевим дубом. У травостої тут переважають бореальні види.

На території "Мальованки" мало грабово-дубових лісів. Це пояснюється несприятливими орографічними умовами для зростання грабу – зниженістю поверхні, застоюванням ґрунтових вод. Такі ліси зростають на Полонщині невеликими ділянками на плескатих підвищеннях з сірими лісовими свіжими ґрунтами. Внаслідок високої затіненості підлісок в них зазвичай відсутній, а травостій розріджений, утворений осокою волосистою, зеленчуком жовтим, квасеницею звичайною. Під зеленим пологом лісу, ховається гніздівка звичайна – багаторічна жовтувато-бура сапрофітна рослина. Вона має м'ясисте кореневище з густозвивистими коренями, які нагадують пташине гніздо. Звідси походить назва рослини.

Значні площі на території регіонального ландшафтного парку «Мальованка» займають вільшняки. Вони зростають на знижених ділянках, біля озер, потоків, тому часто обводнені. Формуються на дерново-підзолисто-глеюватих, мулувато-глеевих ґрунтах. В травостої таких лісів зазвичай домінують гадючник оголений та безщитник жіночий.

Лучна рослинність представлена ценозами чотирьох класів формацій: справжніми, болотистими, торф'янистими та пустищними луками. В цілому луки регіонального ландшафтного парку "Мальованка" не відзначаються ценотичною різноманітністю, але вони надзвичайно мальовничі – справжні русалчині поляни. Займають значну площу у північно-західній частині парку між селами Мальованка та Савичі, а також у південній частині парку біля села Поляни. Луки зазвичай є вторинними за походженням, сформувались на місці осушених боліт у заплавах невеликих водотоків та на місці зведених вільшняків. Великий масив колишніх чорновільшяків між селами Савичі та Мальованка нині являє собою лучний масив із фрагментами чорновільшяків. Це велике зниження є вірогідно колишньою долиною стоку льодовикових вод. Нині найбільші площі тут займають торф'янисті та пустищні луки із смугами та куртинами розрідженої вільхи. На луках переважають угруповання щучника дернистого та біловуса стиснутого, на більш сухих ділянках – мітлиці тонкої. Серед барвистого різнотрав'я нерідко трапляються орхідеї – пальчатокорінники м'ясочервоний та плямистий. Зрідка тут можна побачити осоку Гартмана, півники сибірські, дикі гладіолуси – косаріки черепитчасті.

Найбільш поширені луки з домінуванням щучника дернистого. Його сріблясті суцвіття виблискують на сонці і створюють неповторність

ландшафтів. Зустрічаються на різних елементах рельєфу, хоча здебільшого приурочені до плескатих знижень з дерново-лучними оглеєними та торф'янисто-глейовими ґрунтами з послабленим алювіальним режимом. На таких луках часто співдомінує мітлиця повзуча, трапляються підмареник болотний, жовтець вогнистий, вербозілля звичайне, медова трава шерстиста. Особливо гарними стають ці угруповання, коли цвіте зозулин цвіт. Його світло-рожеві квіти відкриваються лише під вечір. Коли ж рослина відкриває свої квіти вдень - чекай дощу.

Щучникові луки сформувалися як природним шляхом, так і внаслідок випасання. Останнє приводить до випадання з травостою справжніх і болотистих лук кореневищних та нещільнодернинних рослин, а це допомагає щучнику порівняно легко проникати в їх травостої. Крім того, ущільнення ґрунту посилює окислювальні процеси в дерново-глейових ґрунтах, сприяє їх перетворенню на торф'янисто-глейові, що є оптимальним для щучника. Таким чином справжні та болотисті луки перетворюються на щучникові.

Пустищні луки представлені формаціями біловуса стиснутого та булавоносця сіруватого. Це похідні угруповання, які розвиваються на місці вирубаних соснових та дубово-соснових лісів, висушених боліт. Появі і розселенню біловуса сприяє випасання, до якого вид досить стійкий, та підсушення низинних лук і евтрофних боліт. Ценози поширені на підвищених плескатих гривках вододілів. В них зазвичай багато перстачу прямостоячого - рослини, яку називають "козацьким женьшенем" за її цілющу силу.

Справжні дрібнозлакові луки представлені ценозами мітлиці тонкої, тонконога лучного та костриці червоної. Найбільш поширені угруповання мітлиці тонкої. Вони зростають на рівнинно-підвищених та схилових ділянках вододілів з дерново-підзолистими ґрунтами, на яких були вирубані ліси. На цих ділянках дерново-підзолисті піщані ґрунти. Ценози формації тонконога лучного зустрічаються на вододілах, а костриці червоної - зрідка трапляються на підсушених торф'янистих луках, торфових болотах і не займають значних ділянок. Незначне поширення таких угруповань пояснюється невеликими площами підвищених суходільних місцезростань з оптимальними екологічними умовами, що необхідні для їх розвитку. Біля села Мальованка вони виявлені на підвищеній ділянці за смугою заболоченого лісу, на плескату горбі біля озера Образки. Зростають на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах. Місцями на таких луках співдомінує гірчак зміїний. Його пухнасті рожево-білі суцвіття надають ценозам особливої чарівності. Невеличкими групами зростають тут тендітні півники сибірські. Нерідко можна побачити лучно-болотні красуні-орхідеї - пальчатокорінники плямистий та травневий. Трапляються тут і досить великі (місцями до 200 особин) популяції чемериці Лобеля.

Болота на території парку відзначаються значним різноманіттям. Тут неначе зібрані різні типи боліт Малого Полісся. Найчастіше зустрічаються евтрофні болота - трав'яні та трав'яно-мохові. Раніше вони займали на цій території значні площі, тепер велика частина їх трансформована у торф'янисті луки. На болотних ділянках переважають осоки (насамперед, пухирчаста), очерет, а з видів різнотрав'я - вовче тіло болотне. Чимало таких ділянок в урочищі Лізне, їх відзначає яскраво квітуче болотне різнотрав'я, в складі якого - вербозілля звичайне, скереда болотна, смовдь болотна, чемериця Лобеля. Із рідкісних видів тут знайдена осока Буксбаума, із малочисельних - вишукані купальниця європейська та косарики черепитчасті.

Лісові евтрофні болота представлені чорновільшнями, що збереглися на лучних та лісових масивах в найбільш обводнених місцях. В їх трав'яному покриві переважають осоки гостровидна та пухирчаста, лепешняк великий, комиш лісовий.

Проте найбільш цікаві в "Мальованці" бореальні сфагнові болота. Вони зосереджені переважно в північно-західній частині парку біля села Мальованка. Це болота, на яких сфагновий покрив лише почав встановлюватись (еумезотрофні) або вже встановився (мезотрофні). На сфагновому покриві зростають характерні для таких боліт види - пухівка багатоколоскова, вовче тіло болотне, бобівник трилистий. Саме на таких болотах трапляються маленькі болотні верби - чорницева та лапландська. Це реліктові види, свідки епохи зледеніння.

Лише подекуди (біля озер Мальованського гідрологічного заказника, по периферії Брандісового болота, навколо озера Цілюще) сфагнові болота досягають високої стадії розвитку - олігомезотрофної. Їх середовище бідне на поживні речовини та кисле. Тому на таких болотах зростає всього 8-9 видів рослин. Значну роль у травостої відіграють пухівка піхвова, журавлина болотна, буяхи, багно болотне. Тут трапляється і комахоїдна рослина - росичка круглолиста. Своєю назвою вона зобов'язана крапелькам липкої рідини на листочках, якою приваблює комах. На кожному з листків нараховується 130-260 залозистих щупалець. Вони ловлять комаху. Таким чином росичка збагачує своє меню азотом. За характером живлення - вона міксотроф, оскільки живиться і автотрофно, і гетеротрофно. Особливо великі популяції цієї цікавої рослини виявлені на болотах навколо озера Цілющого. Зрідка в оліготрофних ценозах трапляється андромеда багатолиста. Її можна побачити на Брандісовому болоті.

У зв'язку з тим, що територія "Мальованки" не була вкрита льодовиком, тут мало озер. Переважають штучні водойми, що утворилися після торфорозробок. Але вони дуже живописні і здаються синіми очима на фоні смарагдових мальованських лісів.

Озера мають своєрідний характер заростання - вони затягуються переважно хиткими сфагновими плавами. На території України таке

відмічається на півночі Українського Полісся. та в Карпатах. І хоча озера виникли на болотних масивах у повоєнний час, але нині, в результаті активного заростання, вони мають цілком природний вигляд. Тут відмічено рідкісні типи плавів, що сформувалися внаслідок заростання мезотрофних озер сфагнами зі значною участю - образків болотних. Особливо неповторні озера в заказнику Русалчині поляни. На хитких сфагнових плавах, що їх оточують, неначе маленькі лебеді, біліють образки та латаття сніжно-біле. Серед такої краси здається, що ось-ось виринуть із дзеркального плеса русалки та "охне" Водяний.

Часто основну роль у заростанні озер відіграють осока пухнатоплода, вовче тіло болотне. Вони затягують водне плесо, а на шарі мохів біля берега зростають ситник розлогий, осока здута, пухівка піхвова.

Водні угруповання рослин приурочені до озер, ставків, канав, потоків. На них поширені ценози прикріпленої водної рослинності - латаття сніжно-білого, їжачої голівки малої, гірчака земноводного.

Угруповання латаття сніжно-білого виявлені в озерах заказників Русалчині поляни та Мальованського гідрологічного. Вони утворюють густий надводний килим з великими багатопелюстковими сніжно-білими квітами. І як тут не згадати затишне помешкання Дюймовочки, героїні казки Христіана Андерсена!

Ценози формації їжачої голівки малої спорадично зустрічаються на території парку. Маленькими колючими голівками видають вони себе на прибережних мілководдях (30-80см) мезо-евтрофних замкнених водойм з потужними мулистопіщаними відкладами.

Угруповання формації гірчака земноводного трапляються в слабопроточних або замкнених водоймах з товщею води до 1м. В них виявлено ще одну рідкісну комахоїдну рослину - пухирника малого.

Вільноплаваюча водна рослинність представлена ценозами ряски триборозенчастої, спіродели багатокореневої, жабурника звичайного. Вони характерні для водойм з повільною або майже відсутньою течією. Смугами вздовж берегів озер зростають очерет південний, рогіз широколистий.

Флора регіонального ландшафтного парку "Мальованка" відзначається значним багатством та різноманіттям. Повне виявлення її можливе при дальших дослідженнях. Орієнтовно до складу флори входять близько 600 видів судинних рослин. Серед них значна частка рідкісних рослин.

Тут зростають гляціальні релікти (верби чорнична та лапландська, плаун-баранець, росичка круглолиста) та третинний - кадило сарматське. Виявлено лише один ендемічний вид - загальнокарпатський ендемік - живокіст серцевий. Це свідчить про молодість флори, низький рівень самобутності і пояснюється її міграційним походженням.

В "Мальованці" поруч зростають як бореальні види, властиві Українському Полісся, так і центральноєвропейські. Бореальні види знаходяться на південній, центральноєвропейські – на східній межі свого ареалу. На південній межі ареалу знаходяться тут осоки Буксбаума та багнова, пальчатокорінник м'ясочервоний, плаун-баранець, верба лапландська, верба чорнична, їжача голівка мала, півники сибірські; на південно-східній - пальчатокорінники плямистий та травневий, гніздівка звичайна; на східній - осока затінкова, розхідник рутвицелистий, фітеума колосиста, кадило сарматське, дентарія залозиста, молочай гранчастий, живокіст серцевий, ожика лісова, підсніжник білосніжний. Оскільки види на межах ареалів найменш стійкі до дії антропогенних чинників, їх охорона має особливо важливе значення.

Цікаву групу складають монтанно-рівнинні види - щитник австрійський ожика лісова.

В складі флори парку виявлено 14 видів, занесених до Червоної книги України - плаун баранець, плаун колючий, осока Буксбаума, осока затінкова, верба чорнична, лілія лісова, любки дволиста та зеленоквіткова, пальчатокорінники м'ясочервоний, плямистий, травневий, Фукса, підсніжник сніжнобілий, гніздівка звичайна та 37 регіонально рідкісних видів. З останньої групи дуже рідкісними є лазурник трилопатекий, верба лапландська, цірцея середня, осоки кульконосна та Гартмана, живокіст серцевий, пухирник малий, молочай гранчастий, синюха голуба, скорзонера низька.

Із рідкісних угруповань, занесених до Зеленої книги України, виявлені дубові ліси трясунковидноосокові, угруповання, властиві лісам Центральної Європи, і в нас знаходяться на східній межі ареалу, ценози латаття сніжно-білого, їжачої голівки малої, які знаходяться тут на південній межі ареалу, та дубово-соснового лісу рододендронovo-чорницевого, які відірвалися від острова ареалу ценозу, що займає західну частину Житомирської області та крайню східну Ровенської. В останньому угрупованні унікально поєднані домінанти деревного та чагарникового ярусів. Підлісок утворений реліктовим видом - рододендроном жовтим, який ще називають азалією понтійською. В регіональному ландшафтному парку виявлено фрагмент такого угруповання, площею 0,2га.

Висока частка рідкісних видів та рідкісних рослинних угруповань свідчить про унікальність та збереженість природних екосистем ландшафтного регіонального парку "Мальованка".

Біотопічне різноманіття, багатство рослинності обумовлюють різноманітний склад і високу чисельність тваринного населення.

На території парку виділено три функціональні зони, які відрізняються між собою за призначенням і режимом.

Заказна зона об'єднує площі природно-заповідних територій (заказників, пам'яток природи), які нині тут є. Як і у більшості парків - як

національних, так і регіональних, територія цієї зони є роз'єднаною, вона являє собою неначе цінні острівці природи серед територій, що використовуються більш інтенсивно. Тут встановлено найвищий в межах парку режим охорони природних комплексів. На території майбутнього парку нині є 5 природно-заповідних територій. Це - лісовий заказник "Полонський" площею 911 га, гідрологічні заказники "Мальованський", площею 107 га, та Савицький (56 га), ботанічний заказник "Русалчині поляни" (60 га), пам'ятка природи "Дуб черешчатий" (21 га).

Лісовий заказник Полонський, створений у 1990 році, є найбільшою природно-заповідною територією парку. Це - великий лісовий масив, розташований на північ від р. Дружня на землях Полонського та Мальованського лісництв, а також агрофірми "Маяк" та с.с ім. Островського. Крім того, рішенням 14 сесії обласної ради у 1992 році зарезервовано і буде використано під створення ландшафтного парку ще 1078 га. В заказнику, де переважають дубові ліси трясуцковидноосокові, багатий рослинний і тваринний світ. Тут зростає 7 видів з Червоної книги України, ряд видів, дуже рідкісних для області - аконіт строкатий, синюха голуба, дзвоники оленячі. Різноманітним є і тваринний світ. Тут знайдене велике поселення борсуків, три гнізда чорних лелек. Є ряд поселень бобрів, особливо по річці Лизнявка.

Ботанічний заказник "Русалчині поляни" знаходиться на північ від села Мальованка, на землях колективного відгодівельного підприємства. Це - три лісові озера серед лісу з мальовничими галявинами. Саме на цих озерах утворюються сфагнові плави, зростають образки болотні, латаття сніжно-біле. Заказник є однією з найбільш мальовничих територій Малого Полісся.

Гідрологічний заказник Мальованський розміщений на північ від с. Мальованка, в мішаному лісі на території Мальованського лісництва. Озеро "Лісова пісня" площею 27 га є окрасою заказника. Хоча воно утворилось при видобутку торфу, болотна рослинність активно відновлюється, тут наявні цінні угруповання сфагнових боліт високого ступеня розвитку - із пухівкою піхвовою, росичкою круглолистою, журавлиною болотною на сфагновому килимі. Тут знайдений льодовиковий релікт - верба чорнична. Заказник має багату фауну. Це улюблене місце лосів, козул, місце полювання чорного лелеки.

Гідрологічний заказник Савицький включає озеро на місці торфорозробок площею 28 га, лісовий і болотний масиви, що прилягають до озера. Цей масив живить річку Цвітоху в районі села Савичі. Тут виявлені місцезростання багатьох рідкісних рослин - росички круглолистої, пухирника середнього, журавлини болотної. Є нори ондатри.

В пам'ятці природи "Дуб черешчатий" охороняється цінна ділянка старого дубового лісу.

Наукові дослідження довели, що є можливість і необхідність розширення всіх вищезгаданих природно-заповідних територій з тим, щоб вони включали виявлені неподалік цінні ділянки із місцезнаходженнями рідкісних видів рослин і тварин. Вже нині ці території мають увійти до заказної зони. Відвідування її узгоджується із режимом заказника.

Зона регульованої рекреації (її ще називають екскурсійною) охоплює більшу частину території парку. На ній прокладені маршрути постійних екскурсій та екологічного туризму. Чарівна краса ландшафтів, різноманітність рельєфу, наявність озер є привабливими для туристів (особливо екотуристів), екскурсантів - як дітей, так і дорослих. Основною вимогою до режиму цієї зони є збереження існуючого ландшафту, заборона побудови промислових комплексів, підприємств, що забруднюють довкілля. **Тут забороняються рубки головного користування, промислове рибальство та промислове мисливство.** Можлива реконструкція ландшафту, ренатуралізація окремих ділянок природних комплексів. В зоні регульованої рекреації мають бути прокладені і обладнані маршрути екскурсій для різних груп відвідувачів, складені путівники по них. Ця зона є основною у вирішенні одного з найважливіших завдань регіонального ландшафтного парку - здійснення екологічної освіти і виховання.

Господарська зона парку включає території населених пунктів в межах парку, а також ділянки ланів, городів тощо. Тут проводиться традиційне господарство, закладання об'єктів комунального призначення.

Екологічними стежками по РЛП "Мальованка"

Одним із найбільш ефективних методів екологічного виховання є система екологічних стежок. Поряд з пізнанням природи, вихованням та відпочинком екологічні стежки сприяють охороні природи. Стежки прокладаються у цікавих у науковому та естетичному аспектах ділянках, проте не проходять через території високої наукової цінності, ті, що мають режим охорони, який не дозволяє відвідування. Головною метою є виховання екологічно грамотної поведінки людини в природі.

На території РЛП "Мальованка" прокладено три екологічні стежки. Розглянемо основну із цих стежок: "Лісами та болотами РЛП "Мальованка". Вона перетинає всю територію із сходу на захід. Її довжина 30 км (рис.). Пересування по стежці може бути пішохідним або з використанням кінного транспорту. Стежка співпадає з широкою лісовою дорогою, яка з'єднує навколишні села. Подорож по цій стежці розрахована на декілька днів, є місця відпочинку, ночівлі, визначені оглядові майданчики. Подорожуючи по цій стежці, спілкуючись з малозайманою природою, ми ознайомимося із спектром лісів та боліт цього краю, своєрідними озерами, що надають мальовничості цій території. Радісного, хвилюючого настрою додає різноголосий спів птахів. На стежці позначені точки розповіді.

Точка 1. "Початок подорожі по екологічній стежці". Точка знаходиться на краю невеличкого села Савичі. Перед тим, як вирушати далі за маршрутом, тут збирається група, проводиться інструктаж та загальне ознайомлення з особливостями природних комплексів парку.

Точка 2. Ліс під Савичами". Від с.Савичі потрапляємо в лісовий масив і зупиняємось на флористично багатій ділянці дубового лісу. Проводиться розповідь про дубові ліси парку, про їх місце в рослинному покриві, значення дуба серед лісових порід України, про рослини, які є супутниками дуба і утворюють так звану "неморальну світу": буквиця лікарська, серпій увінчаний, дзвоники персиколісті, кадило сарматське та інші. Особливої наукової цінності цим екотопам надають місцезростання таких видів із Червоної книги України, як лілія лісова та осока затінкова. Демонструвати ці рослини доцільно лише фахівцям.

Точка 3. "Мішаний ліс поблизу гідрологічного заказника "Савицький". Тут познайомимось різноманіттям лісових рослинних угруповань, розміщення яких залежить по рельєфу. На підвищеннях переважає верес звичайний з плямами брусниці, по зниженнях - чорниця. Є ділянки заболоченого соснового лісу з типовими рослинами сфагнових боліт, рідкісними для Хмельниччини - багном болотним, лоханню, пухівкою піхвою та журавлиною болотною. Саме тут наявне рідкісне угруповання парку - сосновий ліс з покривом із плауна колючого. Плаун колючий - рослина з Червоної книги України, утворює суцільний килим в смузі, прилеглій до Савицького болота. Такі угруповання рідкісні не лише для області, а й для України.

Точка 4. "Вапнярський горб". В декількох кілометрах від попередньої зупинки потрапляємо в найбільш підвищену, погорбовану частину парку, відому під назвою "Вапнярський горб". Це гарна, суха, місцями з піщаними горбами ділянка, де група зупиняється, відпочиває. Тут можна ознайомитись з сосновим лісом зеленомоховим, склад якого є в цілому типовим для Українського Полісся. Зустрічається гвоздика несправжньорозчепірена, яка є одним із нечисленних ендеміків Полісся, та інші рослини, пов'язані з цими екологічними умовами.

Точка 5. "Дубовий ліс барвінковий". Цей ліс є дуже мальовничим під час цвітіння навесні барвінка малого. Ведеться розповідь про ці рідкісні у парку угруповання, про барвінок - цікаву центральноевропейську рослину.

Точка 6. "Урочище Ревни". Проводиться розповідь про характерну для парку заболочену прохідну долину, оточену з усіх боків лісовим масивом. Найбільш знижені обводнені ділянки зайняті високотравними болотами. Основні площі тут займають угруповання очерету та рогозу широколистого з кущами верби попелястої. У вузькій смузі болота є дамба. Основна частина болотного масиву непрохідна, тут тримаються сірі журавлі, є поселення бобрів. Далі лісова дорога приводить нас до сфагнового болота.

Точка 7. "Журавлине болото". Зупиняємося зліва від основної стежки біля сфагнового болота. Проводиться розповідь про різні стадії розвитку болота, приділяється особлива увага оліготрофним болотам, рослинним угрупованням, які є на цьому болоті. На цій точці можна побачити зарості журавлини болотної. Це північна ягода, яка зростає на сфагнових болотах з бідним живленням та кислим торфом.

Точка 8. "Альтанка". Далі стежка виводить нас на мальовниче відкрите підвищення, де панують луки. Тут є місце відпочинку - гарна альтанка, збудована із берези. Група може відпочивати, а при нагоді і заночувати. З одного боку відкривається вид на чарівні озера, які з'єднуються неширокою заболоченою смугою. Озера утворилися на місці болота після видобутку торфу. Нині добування торфу тут не проводиться, озера починають заболочуватись. З протилежного боку стежки перед нами відкриваються простори справжніх та заболочених лук, відомих під назвою "Русалчині поляни". Серед різноманітного злакового травостою, на сухих ділянках з мітлицею тонкою та біловусом стиснутим, виділяється гвоздика дельтовидна. Ведеться розповідь про луки - важливу частину ландшафту парку. Після перебування на лучній ділянці група знову потрапляє у ліс.

Точка 9. "Дубові ліси парку". Згадуємо, які дубові ліси зустрічалися нам на стежці. В цій точці ми ознайомимось з дубовим лісом, в трав'яному покриві якого переважає осока трясунковидна, яку в народі називають "волосінь". Такі ліси поширені в Центральній Європі, в Україні вони занесені до Зеленої книги України. Ведеться розповідь про цю книгу - книгу рідкісних рослинних угруповань. Далі стежка проводить нас до соснового лісу.

Точка 10. "Сосновий ліс". Тут знаходиться досить велика ділянка середньовікових та більш старих за віком соснових лісів зеленомохових. Через негусті крони сосен і відсутність підліску ці ліси є світлими, просторими. Розповідаємо про флоистичний склад соснових лісів, про бореальні рослини, які є супутниками сосни. Далі стежка приводить до урочища Муравщина.

Точка 11. "Урочище Муравщина". На цій точці можна побачити лучні ценози. Типовими рослинами тут є королиця звичайна, волошка лучна. На узліссі знаходяться дуби-велетні. Їх вік близько 300 років. Ці дерева заслуговують на особливу охорону. Далі біля 2 км стежка проходить лісами і перетинає просіку.

Точка 12. "Просіка". Точка знаходиться на освітленій ділянці. Особливої мальовничості їй надають білокорі берези. Тут група відпочиває і слухає розповідь про лісові просіки, мету їх створення. Прямуючи стежкою далі, попадаємо на болото.

Точка 13. "Брандісове болото". На цьому болоті, як і на значній частині боліт парку, раніше добувався торф. Нині частина болота збереглась у природному стані, а в іншій частині утворилась водойма, яка

починає заростати. Ведеться розповідь про виникнення боліт шляхом заростання водойм.

Точка 14. "Дубовий ліс". Тут дубові ліси характеризуються значною домішкою сосни та берези в одному ярусі з дубом, а також наявністю граба і липи в другому ярусі деревостану. Ведеться розповідь про ярусну будову деревостану, про підлісок, який тут на більш знижених ділянках утворює крушина ламка, про підріст - майбутнє лісу. Демонструються численні гарноквітучі рослини - дзвоники персиколісті, конвалія та ін. Проходимо по стежці далі до відкритої ділянки. Це місце колишньої садиби лісника.

Точка 15. "Криниця". Тут є криниця з питною водою, альтанка. Мальовничості цій ділянці надає алея ялин віком понад 60 років. Тут можна обладнати місце відпочинку та ночівлі. Ведеться розповідь про охорону гідрологічних об'єктів - джерел, струмків тощо.

Точка 16. "Озеро Глибоке". Це озеро на відміну від попередніх має велику площу. Характер його утворення такий, як у всіх "озер" РЛП "Мальованка" - воно утворилось на місці добування торфу на болоті. Озеро оточує сухий сосновий ліс. Тут планується обладнати стаціонарне місце відпочинку для відвідувачів. На заболочених ділянках, прилеглих до озера, в найбільш знижених місцях можна зустріти журавлину болотну, багно болотне, лохину, а також комахоїдну рослину - росичку круглолисту. Далі проходимо густими ялиновими культурами. Розповідь про ялину, про особливості її біології. На ділянці можна побачити нори лисиць. Далі стежка повільно йде вниз.

Точка 17. "Вільшняк". Вільховий ліс розміщений у вузькій долині водотоком посередині. Багате мінеральне живлення та зволоження створює умови для зростання такої вибагливої породи, як вільха чорна. Група слухає розповідь про вільху, а також про інші рослини, що ростуть на багатих вологих ґрунтах, зокрема осоку омську.

Точка 18. "Озеро Вісова". Озеро, як і попередні, виникло на місці добування торфу. Нині краї озера заростають очеретом на сфагновому покриві. Далі стежка веде до дубово-грабового лісу.

Точка 19. "Дубово-грабовий ліс". Ведеться розповідь про грабові ліси та їх екологічні умови. Демонструються типові рослини, що пристосувалися до зростання у цих темних лісах. Ведеться розповідь про граб - східноєвропейський вид, східна границя ареалу якого проходить на території України.

Точка 20. "Вирубка". Група слухає про вирубку, посадку культур, піонері трав'яні рослини, які поширюються на вирубках (іван-чай, кунічник наземний), поступове формування лісу. Далі стежка знову йде по густому дубово-грабовому лісу. Трав'яний покрив тут розріджений. Біля стежки - старі густі насадження ялини. Злісу стежка виходить на шосе, яке з'єднує Полонне і Буртин. Продовжуємо подорож в напрямку с.Буртин до озера Цілюще.

Точка 21. "Озеро Цілюще". Озеро знаходиться за 7 км від с.Буртин. Це місце відпочинку місцевого населення. Площа озера - 21 га. Озеро, як і попередні озера, являє собою обводнений колишній колишній кар'єр. Тут можна спостерігати, як з боків на озеро насуваються болотні плавні. На плавах досить багато комахоїдної рослини росички круглолистої. Наголошується на необхідності збереження цього виду. Група відпочиває біля цього озера, обмінюється враженнями. Далі стежка виходить на автомобільну дорогу, повертає на північ і Через Полонське лісництво йде до с.Буртин, звідки відвідувачі роз'їжджаються.

Екологічна стежка "Лісами і болотами РЛП "Мальованка"" дає цілісне уявлення про неповторну природу парку, різноманітні ліси і болота, мальовничі озера, знайомить із специфікою ландшафтів, рослинного та тваринного світу північної частини Хмельниччини.

“Знов конвалії квітнуть в гаю ...”

Заказник “Конвалія” розташований в малополіській частині області – у Плужнянському лісництві Ізяславського району. Площа його 120 га. Місцевість, де він знаходиться, характеризується вирівняним рельєфом, переважанням піщаних відкладів, значними площами соснових лісів з домішкою дуба. Територія власне заказника – дещо підвищена ділянка з піщаною грядою, зайнята середньовіковим та пристигаючим сосновим лісом із домішкою дуба.

Трав'яний покрив у заказнику нерівномірний, оскільки в ньому переважає конвалія, яка утворює плями. Конвалія – одна з найкрасивіших і найкорисніших для людини рослин нашої флори. Їй присвячено чимало пісень та віршів. Згадаємо ліричні рядки Володимира Сосюри:

“Знов конвалії квітнуть в гаю,
Білі й ніжні, як вітер у полі,
Аромат їх солодкий до болю,
Так нагадує юність мою ...
Знов конвалії квітнуть в гаю”.

В заказнику конвалія рясно квітує, має високу життєвість, поширена на всій його площі. Разом з конвалією зростають переважно північні (бореальні) види – чорниця, плаун булавовидний, верес, брусниця, келерія струнка. Все це здебільшого поліські рослини, які є звичайними і на Малому Поліссі. Із цієї групи досить рідкісним видом є піщанка вузьколиста.

Є в заказнику “Конвалія і дуже рідкісні рослини”. Тут виявлені вовчі ягоди пахучі – реліктова рослина третинного віку, занесена до Червоної книги України. На Хмельниччині вона поодинокі відмічена лише на Малому Поліссі. Її називають інколи боровим бузком, оскільки вона зростає в соснових лісах і квітує ніжним рожевим цвітом. Заказник “Конвалія”, місцезростання цього рідкісного виду, де зберігаються також зарості конвалії і багатьох рослин флори Малого Полісся, є важливим для охорони фіторізноманіття цього регіону.

Де гніздиться чорний лелека

У Шепетівському районі в лісовому масиві на границі Климентовицького та Мальованського лісництв охороняється гніздів'я рідкісного птаха Хмельниччини – чорного лелеки. Заказник «Климентівський» площею 36 га розташований на границі Малого Полісся та Центрального (Житомирського) Полісся.

Гніздо чорного лелеки розташоване на великому дубі посеред листяного лісу з трав'яним покривом із осоки трясунковидної. Лісові угруповання з домінуванням цієї осоки, яку в народі називають «волосін» (вона дійсно нагадує зелені **волоси**), занесені до Зеленої книги України. Вони характерні для центральної Європи, а в Україні знаходяться на східній межі свого поширення. Це – знижена вирівняна волога ділянка. Серед середньовікового лісу тут трапляються окремі великі дуби – свідки давніх часів.

Дуб, на якому оселився чорний лелека, має висоту близько 25 м. Гніздо розташоване на гілці, спрямованій на схід, на висоті 11 м. Гніздо мало діаметр 1,2 м і висоту 0,8 м, для птахів був зручний підліт до нього. Під час обстеження гніздової ділянки один із птахів постійно знаходився у гнізді.

Деревостан лісу, що отчує дуб з гніздом чорного лелеки, складають береза повисла, дуб звичайний, як домішка трапляються сосна, вільха чорна. У підрослі переважає дуб 1-5 м заввишки, поодинокі трапляються молоді ялини, граб, горобина. Підлісок не виявлений, поодинокі зростають малина, верба попеляста. Трав'яний покрив, як це характерно для трясунковидних угруповань, досить густий – з проективним покриттям 80-85%. Інші види – це переважно північні види вологих лісів – вербозілля звичайне, щитник шартрський, хвощ **весняний**, веснівка дволиста. Навесні у лісі виявлені синузії весняних ефемероїдів з переважанням анемони дібрової.

Такий характер має частина лісу, прилегла до гнізда. Подекуди трапляються плескаті підвищені гривки, вкриті грабово-дубовим лісом з типовими видами широколистяних лісів, таких як зірочник лісовий, просянка розлога, круціата гола. Із рідкісних видів відмічена любка дволиста, занесена до Червоної книги України. Загалом, територія

заказника – вологий лісовий комплекс із сполученням неморальних та бореальних лісових видів.

У фауністичному відношенні ділянка має значну цінність. Чорний лелека – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Важливо взяти під охорону всі гнізда цього рідкісного птаха, виявлені в регіоні. При обстеженні заказника тут було відмічено 16 видів птахів. Найбільш чисельними виявились зяблик, славка чорноголова, вівчарик-ковалик та синиця велика. В меншій кількості трапляються дрізд чорний, щеврик лісовий, соловейко східний, іволга, вівчарик жовтобровий, синиця голуба. Поодинокі відмічені крук та великий строкатий дятел. Із великих ссавців ділянку відвідують козуля європейська, дика свиня та лось.

В заказнику на ділянці навколо дерева з гніздом в радіусі 100 м має бути повністю заборонена будь-яка господарська діяльність, на решті території слід обмежити її на період з квітня до серпня. Відвідування ділянки з гніздом в цей період має бути заборонене, за винятком служби лісової охорони та фахівців-науковців.

Бобри в долині Лизнявки

У Шепетівському районі вздовж річки Лизнявки розташований загальнозоологічний заказник “Лизнявський” площею 422 га. Заказник розташований на межі Малого Полісся та Центрального (Житомирського) Полісся.

Рослинність Лизнявського заказника відбиває особливості його розташування та представлена листяним лісом, прибережно-водними та водними угрупованнями. Більшу частину території заказника займає середньовіковий ліс з переважанням в деревостані дуба, ясена, клена гостролистого. Як домішка трапляються липа, граб, в'яз. В деревостані є декілька старих дубів. Особливу увагу привертає дуб-велетень, вік якого близько 300 років, а діаметр стовбура – більше 1 м. Висота дерева сягає 30 м, дуб має високу життєвість. Серед розрідженого підліску трапляються черемха, бірючина та ліщина. У підрості переважає граб.

У трав'яному покриві влітку переважає зірочник **лісовий**. Навесні на цих ділянках виявлена синюзія ефемероїдів з переважанням центрально-європейського виду рівноплідника рутвицелистого. На знижених місцях значні площі займають угруповання цибулі ведмежої (відомої також під назвою черемша, левурда), занесеної до Червоної книги України. Лісові угруповання з домінуванням цибулі ведмежої занесені до Зеленої книги України. В заказнику зростає також підсніжник звичайний, рослина, яка є символом весни, також занесена до Червоної книги. Флористичний склад лісів досить багатий. Тут трапляються зубниця залозиста, чистець лісовий, просянка розлога, осоки лісова і трясунковидна.

На заболочених ділянках переважають високотравні угруповання очерету та осоки гостровидної. Зарості лепешняку великого оточують береги річки Лизнявки. На болотах та заболочених луках ростуть

калюжниця болотна, м'ята водяна, жовтець повзучий, півники болотні. Водна флора вищих рослин небагата – відмічені глечики жовті, їжача голівка пряма, елодея канадська, деякі види рдесників.

В цілому, в ботанічному аспекті заказник "Лизнявський" характеризується різноманітною рослинністю і типовою флорою, серед якої є рідкісні види.

Фауни заказника достатньо багата і різноманітна. Вона має в цілому лісостеповий характер. Ядро її складають в основному лісові та навколоводні тварини. Найбільш численною групою хребетних є птахи. На лісових ділянках при обстеженні переважали соловейко східний, вівчарик-ковалик, вівчарик-жовтобровий, дрізд чорний, зяблик, славка чорноголова та синиця велика. Численними були горлиця звичайна, зозуля, іврлґа, костогриз. Виявлені гнізда канюка звичайного, яструба великого та крука. Менш різноманітним є населення водно-болотних екотопів. Тут мешкають чапля сіра, крижень, а також деркач – вид з Європейського червоного списку. Із копитних найчастіше трапляється козуля, восени численні свині дикі, зрідка навідується лосі.

На річці Лизнявці оселилися бобри. Вони побудували на ній греблю, що поліпшило умови для мешкання інших навколоводних тварин, таких як чаплі, качки, пастушкові, жаби та деякі інші.

Таким чином, у Лизнявському зоологічному заказнику охороняється не лише типовий лісостеповий комплекс тварин, а й рідкісні рослини та рослинні угруповання. Заказник має значну наукову цінність.

Де живуть сірі гуси та чаплі

В заплаві р.Вовк у Деражнянському районі знаходиться значний за площею (1629 га) Вовчанський гідрологічний заказник. Колись заплава цієї річки була типовою для Поділля і являла собою комплекс лук, боліт, заплавних водойм. Нині найменш зміненою виявилась середня за течією ділянка, в якій зберігся або відновився типовий краєвид вовчанської заплави. Тут значні площі займають різні за ступенем зволоження луки, зарості верб, ділянки вищої водної рослинності і багато плесів. В нижній частині, яка починається від дамби за міським ставом м.Деражня, болото в заплаві внаслідок підпору вод дамбою дуже обводнене. Краєвид цієї частини заплави формують масиви високотрав'я, вологі осокові луки, численні плеса. Верхня за течією частина заказника (вниз за течією від границі з Хмельницьким районом) – це сукупність зароствючих (місцями зарослих) кар'єрів, що лишилися без рекультивації після видобутку торфу, та окремих болотних ділянок між ними. До осушення і видобутку торфу ця частина болота була купинно-осоковою із фрагментами високотрав'я. Нині відбувається як поступове відновлення вихідної рослинності у зниженнях, так і формування щучникових лук на її місці. У нижній частині заплави переважають зарості високотрав'я – рогозові та очеретяні, які сполучаються з плесами, зайнятими водними рослинами.

Серед останніх переважають тілоріз алоевидний, їжача голівка пряма, жабурник. Є куртини латаття та глечиків жовтих.

Флористичний склад заказника досить різноманітний. Тут наявні північні види на південній межі поширення, такі як цикута отруйна, кизляк болотний, теліптерис болотний. На периферії болота на заболоченій луці виявлена популяція лучно-болотної орхідеї пальчатокорінника м'ясочервоного, занесеного до Червоної книги України. На болоті зростає малопоширений вид, характерний для заплав Південного Бугу та його приток – ситник мілководний.

Найчисленнішою групою хребетних є птахи, представлені переважно водоплавними та навколоводними видами. Поширені тут крижень та чирок-тріскунок, червоноголовий нирок, відмічені сіра гуска та лебідь-шипун. Вони гніздяться переважно в середній частині заплави. Дуже численні на нижній за течією ділянці пастушкові – лиска, водяна курочка, на верхній ділянці відмічений деркач. В заплаві гніздяться руда чапля, квак та бугай, на годівлю прилітають сіра та велика біла чаплі, лелека білий. Скрізь в заплаві спостерігалась велика чисельність болотного луня, з інших хижих птахів були відмічені лунь лучний, яструб великий та сова болотяна. Серед горобиних птахів дуже численний дріздиш, фоновими видами є жулан та очеретянки (болотна, ставкова, лучна, велика). У верболозах вздовж русла гніздяться синьошийки, декілька разів були відмічені ремези.

Земноводні представлені жабами (озерною, гостромордою та тра'яною), кумкою та квакшею. Із ссавців на луках та біля кар'єрів відмічені заєць сірий, полівка-економка, бурозубка звичайна, кріт. На руслах річок Вовк та Вовчок, особливо в нижній за течією частині заказника, досить звичайні ондатра і водяна полівка. Живе в річках довгопалий рак, що свідчить про задовільну якість води.

Таким чином, заказник, особливо його середня і нижня за течією частини є цікавим та цінним як в ботанічному, так і в зоологічному аспекті. Він зберігає різноманіття рослинного і тваринного світу.

Заказник в заплаві Південного Бугу

У Летичівському районі на мальовничій заплаві Південного Бугу, між селам Трибухівці та Головчинці знаходиться заказник "Башта". Місцеве населення називає цю ділянку Дохва. Площа заказника ... га.

За своїм характером – це типова заплавна ділянка Поділля. Краї широкої заплави займають луки, центральна її частина зайнята досить обводненими болотними угрупованнями. Деревя і чагарники займають порівняно невелику площу і зосереджені переважно біля старих тофових кар'єрів та на схилах долини. На добре виявленому прирусловому валу поширені луки, що випасаються. Найцікавішими як у ботанічному, так і в зоологічному відношенні є заболочені ділянки із старицям та тимчасово обводненими зниженнями. Тут переважають осокові угруповання з

домінуванням осок омської, чорної та здутої. Тут зростають типові болотні рослини, насамперед північні (бореальні). По долинах річок вони просуваються з півночі у лісостепову зону. Це насамперед бобівник трилистий з ажурними біло-рожевим суцвіттями навесні та вовче тіло болотне. Останній вид отримав свою назву за м'ясо-червоні поодинокі квіти. Влучною є і російська назва рослини “сабельник” – стебло його **увігнуте** і дійсно нагадує шаблю. На болотах можна побачити й інші рослини з цієї групи – вербозілля звичайне, чистець болотний, теліптерис болотний. Відмічені куртини рідкісного реліктового виду – хвоща рябого. Тоненькі безлисті **стебельця** цього хвоща мають інакше, ніж **стебло** в цілому, забарвлені смужки – вони дійсно рябі, строкаті.

В цій заболоченій частині є чимало інших рідкісних та малопоширених видів рослин. Найрідкіснішим є мабуть плавун щитolistий – реліктовий водний вид. На воді він утворює невеликі розетки з досить великими жовтими квітами. Люди, які не є ботаніками, нерідко кажуть, що вони схожі на квіти огірків. Ботаніки ж, які дуже шанують цю рідкісну рослину, порівнюють її квіти із жовтими зірками на поверхні води. В декількох місцях була відмічена болотна орхідея – пальчатокорінник м'ясочервоний. Найбільші популяції він утворює по периферії правобережної частини заплави.

Біля русла – смуги очерету з осокою омською та ценози лепешняку великого. Тут можна побачити такі вологолюбні види, як півники болотні, гірчаки земноводний та перцевий, очеретянка. Виявлені у заказнику латаття сніжно-біле, угруповання якого занесені до Зеленої книги України, верба розмаринолиста, шолудивник болотний, водяна сосонка звичайна. Все це – малопоширені на Хмельниччині види. Особливо слід відмітити найбільш отруйну рослину нашої флори цикуту отруйну, яка трапляється по берегах водойм.

Заказник є досить багатим і у фауністичному відношенні. Найчисленнішою групою хребетних є птахи. Тут відмічені значні популяції чапель – сірої, рудої, великої білої та квака. Багато водяної курочки та лиски, відмічені пастушок, погонич, великий норець, луні болотяний та лучний, яструб малий. В заплаві годуються лелека білий, мартин звичайний, крячки річковий та білощокий, відмічено кілька видів куликів. В болотному високотрав'ї та в чагарниках мешкають очеретянки, вівсянка очеретяна, плиска жовта та інші. Наявність плесів та сховищ, а також прилеглого до заказника Щурівського водосховища є приваблюючим фактором для зупинки тут зграй мігруючих птахів.

Заказник є одним із найцікавіших болотних угідь області.

Озеро Святе

На Хмельниччині небагато озер. Одне із найцікавіших знаходиться в Ізяславському районі на території Михельського лісництва. Святе озеро – таку назву дали йому жителі цього краю – є свідком і наслідком давнього

зледеніння. Ця місцевість була прохідною долиною між Волинським лесовим плато та Подільською височиною, по якій стікали льодовикові води. В місці їх стояння і утворлось озеро з островом посередні. Площа озера 4 га. По берегах озера, особливо в його південній частині, а також навколо острова утворились сфагнові плави. В південній частині озера плав зайняв всю затоку і перетворився в болото. Озеро оточене сосновим лісом. Зі сходу це – сухий сосновий ліс на піщаних горбах, в інших частинах – вологий березово-сосновий ліс на вирівняних ділянках.

Плави утворені кореневищам болотних рослин, порослими сфагновими мохами, та купинами осок. Це свідчить про бідність води поживними речовинами та про її кислу реакцію. Утворення таких сфагнових “плавів” – шлях заростання північних озер (властивий, скажімо, болотам Карелії, північної Білорусі). В Україні він відмічений лише на декількох болотах на півночі Українського Полісся, неподалік від території Білорусі. На Малому Поліссі ці плави більше ніде не відомі. Це робить озеро Святе унікальним серед озер Хмельниччини.

На плавах сформувались угруповання осоки шерстистоплодої і пухівки на килимі сфагнових мохів. В цих угрупованнях зростає низка рідкісних, в тому числі реліктових видів рослин. Серед них насамперед слід назвати третинний релікт шейхцерію болотну, занесену до Червоної книги України, яка знайдена тут вперше на Хмельниччині. Рідкісними для області північними видами є осока багнова, журавлина болотна, образки болотні, бобівник трилистий. Знайдена тут і рідкісна комахоїдна рослина – росичка круглолиста, що свідчить про бідне мінеральне живлення на плавах. Рясно росте північна болотна рослина з довгими кореневищами – вовче тіло болотне, яка є одним із утворювачів плаву. По привідній смузі ростуть осоки омська і здута, очерет, рогіз широколистий. В купинах осоки омської, а також в заболочених зниженнях на березі озера зростає ситник бульбистий – рідкісний центральноевропейський вид, занесений до Червоної книг України. Він знаходиться тут поблизу східної межі свого поширення. В обводнених угрупованнях виявлений пухирник малий – бореальна комахоїдна водна рослина, малопоширена в Україні та рідкісна для Хмельниччини.

У повоєнний час на березі Святого озера відомий дослідник флори Полісся та Малого Полісся д.б.н. А.І.Барбарич знайшов льодовиковий релікт – вербу чорничну. Ці гербарні збори зберігаються в національному гербарії України. Нами цей вид був виявлений неподалік від озера на сфагновому болоті в тому ж Михельському лісництві.

В східній частині території, що отчує озеро, на піщаних горбах переважає середньовіковий і пристигаючий сосновий ліс. В його деревостані є домішка берези та дуба. Трав'яний покрив цього лісу дуже змінений внаслідок витоупування. В травостої переважають злаки – костриця червона, куничник наземний, окремими куртинами трапляються орляк, чорниця, верес, чебрець звичайний та інші типові види соснових

лісів. Серед них є група малопоширених видів, властивих сухим сосновим лісам Полісся. Це – один з небагатьох ендеміків Полісся гвоздика несправжньорозчепірена, а також ліщиця пучкувата, піщанка вузьколиста. Ці рідкісні види флори області знаходяться тут на південній межі свого поширення.

Далі на південь піщані горби поступаються місцем вирівняній плескатій поверхні. Тут поширені вологі соснові ліси з дубом та березою – молінієво-чорницеві та чориницеві. Тут ростуть типові для таких лісів види – перстач прямостоячий (калган), плаун булавовидний, одинарник європейський, веснівка дволиста. У вологих лісах знайдені рідкісні для України види рослин – осока кульконосна, що трапляється в межах України переважно в Карпатах і дуже рідко – на Поліссі, і ситник відстовбурчений – центральноєвропейський вид на південно-східній межі ареалу. Обидва ці види не вказувалися раніше для Хмельниччини.

Фауна озера досить різноманітна, хоча має дещо збіднений склад внаслідок антропогенного впливу. Із ссавців відмічені козулі, білки, кроти, зрідка трапляються лисиці, лісові куниці. В норах на берегах озера селиться ондатра. Виявлено біля 20 видів птахів. Звичайним виявились іволга, зяблик, щеврик лісовий, синиця велика, великий строкатий дятел. Поодинокі трапляються хижі птахи – канюк, чеглок. Є крук та одуд. Із водоплавних птахів гніздяться крижень, малий норець. Зрідка трапляються чаплі сірі та мартини звичайні.

Таким чином, озеро Святе є унікальним природним утвором, осередком бореальної флори та рослинності, просунутими на південь. Рідкісними утворами природи є сфагнові плавні. Нині бажання людей ознайомитись з цим незвичайним куточком приходить у протиріччя з необхідністю його збереження. Ця ділянка має бути одним із природних ядер майбутнього національного природного парку, при організації якого можливим є вирішення цих питань.

Рідкісне болото Хмельниччини

В Михельському лісництві Ізяславського району є незвичайне, рідкісне для Хмельниччини болото. Воно охороняється в гідрологічному заказнику “Купинський”. Болото має округлу форму. Ймовірно, воно виникло шляхом заростання озера, вірогідно, карстового. Рослинність його змінюється від центру до країв.

В центральній частині болота воно має оліготрофний характер, тобто тут виявлені угруповання верхових боліт. Такі болота виникають там, де торфовий поклад при своєму наростанні вже втрачає зв'язок з ґрунтом, що його підстелює і живиться переважно атмосферними опадами. В трав'яному покриві цих боліт переважають рослини, що зуміли пристосуватись до умов малопоживного і кислого торфу. Поверхня верхових боліт звичайно буває майже суціль вкрита сфагновими мохами. В заказнику “Купинський” на сфагновому покриві переважає пухвака

піхвова, поміж її купинами по моху стелиться журавлина болотна. Тут зростають типові рослини сфагнових боліт – андромеда багатолиста, лохина (буяхи), багно болотне. Всі ці рослини є рідкісними для Хмельницької області, трапляються вони зрідка в її північній частині. В обводнених зниженнях трапляються вовче тіло болотне, вербозілля болотне, осока сірвата. В заказнику виявлений пальчатокорінник м'ясочервоний – лучно-болотна орхідея, занесена до Червоної книги України.

З боку лісової дороги на болоті представлений обводнений горбасто-мочажинний комплекс, розвиток якого нині йде від переходового (мезотрофного) болота до верхового (оліготрофного). Тут сполучуються обводнені зниження з трав'яно-моховими угрупованнями і заліснені горби. Зниження видовженої форми займають тут 70-75% поверхні. В них на шарі плаваючих у воді сфагнових мохів зростають такі вологолюбні болотні рослини, як кизляк болотний, осока сірвата, пухівка багатоколоскова. Тут трапляється і рідкісна комахоїдна водна рослина пухирник середній. Крім цього місцезнаходження для Хмельниччини є лише давні вказівки про зростання цієї рослини поблизу Летичева.

У периферійній смузі болота виявлені угруповання переходового (мезотрофного) болота. Тут разом з очеретом на сфагновому килимі зростають вовче тіло болотне, пухівка багатоколоскова, куничник сірватий, осоки, журавлина болотна. В цій смузі, заходячи і на центральну частину болота, зростає льодовиковий релікт верба чорнична. Цей вид занесений до Червоної книги України. Досі в Хмельницькій області було відоме лише одне її місцезнаходження неаодак від Святого озера в цьому ж лісництві. Вірогідно, що на Хмельниччині це єдині місцезростання виду у локалітетах на південь від межі суцільного поширення виду.

Таким чином, болото має центрально-оліготрофний хід розвитку – його розвиток йде від дещо підвищеної центральної частини до периферії болота. Такі болота, тим більше з наявністю горбасто-мочажинного комплексу, характерні для північних регіонів, насамперед, для півночі тайгової зони, прибалтійських країн. Вони дуже рідко трапляються в Україні – лише подекуди на Поліссі та в Карпатах.

Фауна хребетних заказника не відзначається значним різноманіттям. Із птахів в центральній оліготрофній частині болота відмічені щеврик лісовий, жулан та малинівка. Біля знижених вологих ділянок оселяється бекас – кулик, досить характерний для верхових боліт. Орнітофауна прилеглих до болота ділянок більш різноманітна. В значній кількості тут трапляються вівчарик-ковалик, зяблик, дрізд чорний, вівсянка звичайна та деякі інші види птахів. Із ссавців до центральної частини болота заходять лосі, козулі, заєць сірий, лисиця. Із земноводних виявлена жаба гостроморда.

Наявність горбасто-мочажинного комплексу, зростання рідкісних видів рослин – реліктових та погранично-ареальних, в тому числі занесених до Червоної книги України, роблять болото в заказнику “Купинський” унікальним для Хмельниччини. Найбільший інтерес у ботанічному аспекті становить зростання на болоті льодовикового релікту – верби чорничної. Заказник має увійти до проєктованого національного природного парку “Святі озера”.

Притулок рідкісних тварин і рослин

У Летичівському районі на землях Бохнянського лісництва є значний лісовий масив переважно листяного лісу, розташований на схилах великої балки і частково - на плакорі, оточений ланами. Це – зоологічний заказник “Чоботарня”. Площа його 429 га. Дно балки займає вузька луговина, по якій протікає струмок. Завдяки дамбі нижня частина балки затоплена, тому частина лук заболочена, утворився невеликий ставок. В лісі зустрічаються джерела.

Заказник “Чоботарня” являє собою масив похідного грабового лісу з участю граба, дуба, клена гостролистого, ясена, осики, черешні. В масиві багато липи, що є не частим явищем на Поділлі. Переважають середньовікові та молоді насадження. Є середньовікові культури дуба, сосни, подекуди – ялини, дуба північного (червоного). Травостій є “успадкованим” від природних листяних лісів, тому є багатим і різноманітним. В ньому виявлено 5 видів з Червоної книги України. Із них – 4 види лісових орхідей – коручки пурпурова та чемерникова (морозниковидна), любка дволиста, гніздівка звичайна, а також карпатський, дуже рідкісний на рівнині вид – астранція велика. Із реліктових видів виявлені кадило сарматське та арум Бессера. В масиві зростає низка центральноєвропейських видів – герань темна, коручка пурпурова, кадило сарматське, явір, черешня. Деякі з них перебувають тут на східній межі свого поширення. Виявлені тут такі малопоширені в області види, як хвощ зимуючий, перстач білий, жовтозілля надрічкове. В цілому, масив має типовий для регіону і багатий флористичний комплекс.

Види фауни завдяки острівному характеру лісового урочища та наявності в ньому відкритих ділянок представлені мешканцями не лише лісу, а й лук, зволжених ділянок, в тому числі високотрав'я. Із земноводних біля ставка та на заболочених ділянках відмічені ставкова та озерна жаби, в лісі – ропуха, трав'яна та гостроморда жаби, на вирубах – квакша та гребінчастий тритон. Із плазунів досить численна веретільниця ламка, наявні вуж звичайний та ящірка живородяча.

Серед орнітофауни особливий інтерес викликає знаходження на ділянці голуба-синяка. За даними опитувань тут гніздувався чорний лелека, занесений до Червоної книги України. Нині ці дані потребують перевірки. Із хижих птахів були відмічені канюк звичайний і лунь болотяний. Біля ставу тримаються крижні, сірі та великі білі чаплі. У лісі

звичайними є велика, голуба та чорноголова синиці, дрозди чорний, співочий та чикотень, вівчарики ковалик та жовтобровий, великий строкатий дятел. Відмічені крук, жулан, волове очко, соловейко, корольок жовтоголовий та ін.

Із ссавців видом із Червоної книги є борсук. Наявні ласка, заєць сірий, кріт, козуля та дика свиня. Чимало дрібних ссавців. До найбагатших у фауністичному відношенні ділянок належать ділянки старого лісу, де збереглися дуплясті дерева та є розвинений підріст, а також узлісся з чагарниками. Тварин приваблюють також ділянки, де є вода. Найбіднішими щодо фауни є монодомінантні культури та ділянки грабового лісу.

Заказник “Чоботарня” – осередок різноманіття рослинного та тваринного світу. Тут виявлено 5 видів рослин та 1 вид тварин із Червоної книги України. Слід зробити більш дійовим режим охорони в цьому цінному лісовому масиві.

Урочище “Липняк”

Липа рідко домінує в лісах Хмельниччини. Проте, в деяких лісових урочищах участь її є значною. Урочище “Липняк” саме тому отримало свою назву. Це заповідне урочище розташоване у Деражнянському районі в долині яру, який впадає в річку Ровець. Урочище межує з Шиєнецьким заказником.

Урочище “Липняк” – ділянка грабового лісу із значною участю липи. В деревостані є також домішка дуба, осики, черешні, берези, в'яза, клена польового. Ліс в основному середньовіковий, але в нижній частині схилу балки, а також в західній частині масиву є ділянки старішого лісу. Підлісок у зв'язку із затіненістю виявлений мало. Він представлений бруслиною європейською, бузиною чорною.

В трав'яному покриві переважають типові види широколистяних лісів (неморальні види). Це – зірочник ланцетолистий, зеленчук жовтий, копитняк європейський. Є ділянки рідкотравних ценозів. Добре виявлене типове флористичне неморальне ядро. Його складають актея колосиста, цирцея звичайна, підлісник європейський, чистець лісовий. Є ділянки з переважанням барвінку.

В урочищі зростає значна кількість рідкісних видів рослин. Тут виявлено 3 види рослин, занесених до Червоної книги України. Це коручка пурпурова – вид, ареал якого охоплює західну і південну /вропу і яка перебуває тут на північно-східній його межі, лісова орхідея гніздівка звичайна, а також лілія лісова. Є в заповідному урочищі рідкісна на рівнині папороть – багаторядник шипуватий. В Україні вона трапляється переважно в Карпатах. В лісі можна побачити старі дерева липи, черешні, дуба.

Із птахів фоновими видами є вільшанка, зяблик, костогриз, синиці (велика, голуба, чорноголова), дрізд чорний, повзик. В тій частині лісу, що виходить до заплави, мешкають дрізд-чикотень, славка прудка.

Із земноводних в урочищі “Липник” були виявлені трав’яна та гостроморда жаби, сіра ропуха, кумка. Копитні представлені досить численними дикими свинями та козулями. На схилах балки в грабовому лісі була знайдена нора борсука – виду, занесеного до Червоної книги України. Найбільше різноманіття фауни хребетних спостерігалось на ділянках старого лісу. Саме тут відмічались канюки, круки, великий строкатий дятел.

Значна кількість липи вирізняє урочище серед лісових природно-заповідних територій області. Значним є багатство рослинного і тваринного світу.

Долинка притоки Горині

Біля с.Михлі Ізяславського району знаходиться заповідне урочище Гайок площею 17 га, яке займає долинку невеликої притоки р.Горині. Русло її **загачене**, в кінці урочища знаходиться невеликий став. Схили долини, особливо правий, заліснені. Тут переважає різновіковий листяний ліс, складений дубом, грабом, осикою, липою. Підлісок розріджений, є окремі кущі ліщини, крушини.

В рослинному покриві, як це нерідко буває в лісах заплав, сполучаються типові лісові видами з видами лук і боліт. До перших належать такі види, як яглиця, осока волосиста, копитняк – лісові папороті – щитник чоловічий, безщитник жіночий. На вологих місцях у лісі зосереджені такі типові види заплав, як гравілат річковий, слабник водяний, жовтяниця черговолиста. В урочищі Гайок навесні виявлені синузії ефемероїдів – ліс вкривається килимом різнобарвних квітів, які зникають з настанням літа. Серед ефемероїдів тут переважає центральноевропейський вид рівноплідник рутвицелистий. Звичайними тут є й інші ефемероїди – анемона дібровна, пшінка звичайна.

По днищу долинки виявлені різноманітні водно-болотні угруповання – хвою **річкового**, очерету комишу лісового, м’яти довголистої – дикої м’яти з довгим сірим від опушення листям та сильним запахом.

Там, де днище розширюється, є ділянки вільшняка з кропивою жабрійовистою, очеретянкою, хмелем, який оплітає дерева та чагарники. Тут зростає кілька видів верб – ламка, пурпурова, біла, попеляста. Став оточують осокові угруповання з переважанням осок гострої та здугої. Тут виявлений рідкісний вид флори України – осока остюкова. Поміж осоками є куртини лепешняка великого, очерету.

Фауністичне ядро урочища складають дендрофільні та гідрофільні види. Із ссавців тут постійно мешкають заєць сірий, кріт. Заходять козулі, лисиці, дикі свині. Серед птахів найбагатшою є група деревно-чагарникових

видів, таких як вівчарик-ковалик, зяблик, славка чорноголова, горлиця звичайна, соловейко. Цікавим є комплекс лучних птахів, основу якого складають чекан луговий, синьошийка, очеретянка лугова та занесений до Європейського червоного списку деркач. Досить типовий і різноманітний комплекс водно-болотних та навколоводних птахів – лелека білий, чапля сіра, крижень, чирок-тріскунок, чайка, лунь болотяний та ін.

В нижній частині схилів є декілька джерел. Одне з них, під старою липою, традиційно відвідують мешканці села, набирають тут воду, яка начебто є цілющою. Джерела чисті, незабруднені. Під час нашого відвідування біля джерела лежав вінок із польових квітів.

“Безодня”

Таку назву має гідрологічний заказник площею 15 га у Летичівському районі. Він розташований в долині невеликої правобережної притоки р.Південний Буг і знаходиться в історичному місці – біля смт. Меджибіж.

Болото Безодня має вигляд неширокої (60-70 м) смуги поміж двома пасмами горбів. На лівому березі болота знаходиться водозабірна станція. Тут знаходиться потужне джерело, з якого вода подається в Меджибіж. Решта води потрапляє в болото через трубу, тому в своїй нижній частині болото більш обводнене. На болоті є кілька менших джерел, від яких відходять струмки.

В нижній за течією більш обводненій частині болота переважають зарості очерету, рогозу широколистого, лепешняку великого. На менш обводнених ділянках переважають осоково-хвощеві (з хвощем річковим) та осокові угруповання осок омської та гостровидної.

На болоті добре представлене флористичне ядро болотних видів. Тут зростають плакун верболистий, півники болотні, незабудка болотна, м'ята польова, калюжниця болотна, гравілат річковий. Тут є цінна лікарська рослина – валеріана висока. Виявлена болотна орхідея, занесена до Червоної книги України – пальчатокорінник м'ясочервоний.

Болото Безодня зберегло свій природний стан, вона має типовий для Поділля рослинний покрив з переважанням купинноосокових та високотравних угруповань. Цікавою особливістю є переважання на значній площі в рослинному покриві хвоща річкового. Болото є ландшафтною компонентою цінної історичної місцевості Меджибіж.

Лісова балка в басейні Південного Бугу

Заповідне урочище “Михайлівецьке” площею 253 га знаходиться у Краси́лівському лісництві Строкостянтинівського лісгоспу. Регіон, в якому воно розміщується, характеризується густою мережею ярів та балок. Балки здебільшого широкі і пологі. Урочище Михайлівецьке і являє собою систему балок з водотоками, які належать до басейну Південного Бугу, і

прилеглих горбів. Вони створюють своєрідний та мальовничий ландшафт.

В рослинному покриві переважають дубово-грабові (з переважанням граба) та похідні від них грабові ліси, в основному середньовікові. Вони поростевого походження, трапляються також ділянки лісових культур. Крім дуба і граба, в деревостані досить значну домішку утворюють липа та черешня, меншу – ясен, береза, осика. По зволожених ярах зростають вільха, верби ламка та козяча.

У зв'язку з тим, що такі ліси влітку дуже затінені, ярус підліску в них не виявлений. Поодинокі трапляються ліщина, бруслини європейська та бородавчаста, свидина кривавочервона. В літній період в трав'яному покриві переважають зірочник ланцетолистий, зеленчук жовтий, а по днищах та в нижній частині схилів – яглиця. Значну участь в травостої беруть підмаренник запашний, жовтець кашубський, копитняк європейський. Флора заповідного урочища різноманітна. Тут можна зустріти високі показні рослини, такі як просянка розлога, чистець лісовий, осока лісова, лісові папороті – щитники чоловічий та шартрський, щавель лісовий. Невисокі, нерідко цікаві лісові види ховаються в нижньому ярусі травостою. Це адокса мускусна, вороняче око, медунка темна, фіалка **дволиста**, веснівка дволиста та інші. По днищах балок трапляються вологолюбні лучні та лучно-болотні види. Смуги навколо струмків утворюють пшінка весняна та жовтяниця черговолиста, трапляються калюжниця болотна, гадючник в'язолистий. На схилах ярів можна побачити зарості хвоща зимуючого, малопоширеного в регіоні виду. В лісовому масиві виявлено один вид лісових орхідей, занесений до Червоної книги України. **Який?**

Навесні в заповідному урочищі виявлені синузії весняних ефемероїдів. Найбільшу площу займають синузії рясту ущільненого та анемони дібрової. Окремі куртини утворює високий ряст порожнистий з білим та ліловими квітами. Такі синузії в цілому характерні для дубово-грабових лісів. Значну площу тут займають синузії центральноєвропейських видів. Насамперед це стосується синузій рівноплідника рутвицелистого з ніжними білими квітами. Місцями, особливо на схилах ярів, вони переважають у рослинному покриві. Нерідко тут можна побачити підсніжник білосніжний, занесений до Червоної книги України. Частіше він трапляється окремим куртинами, інколи його участь більша, він виступає співдомінантом трав'яного покриву. Із ефемероїдів тут ще відмічені проліска дволиста, гусячі цибульки жовта та маленька.

В цілому, заповідне урочище Михайлівецьке – мальовнича, типова за рослинним світом для регіону ділянка переважно грабового лісу з типовою та досить багатою флорою. Є дані про зростання у віддалених частинах масиву ще одного виду з Червоної книги – цибілі ведмежої

(левурди). Без сумніву, подальші обстеження виявлять тут нові рідкісні види, насамперед, лісових орхідей.

Лісовий заказник "Дорогоща"

В лісовому масиві Кривинського лісництва, що неподалік м.Нетішина, знаходиться лісовий заказник місцевого значення "Дорогоща" являє собою слабо погорбовану територію, вкриту майже суцільним масивом середньовікового та пристигаючого лісу. На цій ділянці переважає типовий для Малого Полісся грабово-сосновий ліс рідкотравний з участю дуба, берези, у зниженнях вільхи. В зв'язку із значним затіненням підлісок виявлений слабо (0,1-0,2), він представлений ліщиною, бруслиною бородавчастою. Травостій в цих тінистих лісах розріджений, в ньому переважають зеленчук жовтий, копитняк європейський. У складі травостою є чимало рідкісних та малопоширених видів. Тут виявлені 2 великі куртини дуже рідкісного реліктового виду - баранцю звичайного. Цей голарктичний вид, занесений до Червоної книги України, в Україні знаходиться на південній межі ареалу. Він є дуже рідкісним для Малого Полісся. Баранець зростає тут двома великими куртинами, діаметр яких досягав 100 та 120 см. Вони розширюються, розростаючись з периферії. Баранець зростав у природному зниженні у вільхово-грабово-сосновому лісі рідкотравному. В деревостані є домішка клену гостролистого, клена несправжньо-платанового (явору). В заказнику виявлене також зростання двох інших видів з Червоної книги - лілії лісової та коручки чемерниковидної. У зниженнях великі плями утворює плаун колючий - бореальний вид із Червоної книги України, який тут знаходиться на південній межі ареалу. Тут є великі популяції кадила сарматського та вовчих ягід звичайних. Ці види занесені до списку видів, що охороняються в Хмельницькій області.

Таким чином, на ділянці зростають і утворюють багаточисельні популяції 4 види з Червоної книги України. Серед них - дуже рідкісний на рівнині України вид баранець звичайний.

Єдине на Хмельниччині місцезростання осоки богемської

Гідрологічний заказник "Теребіжі" знаходиться у Славутському районі в межах Голицького лісництва. Загальна площа заказника 30,3 га. Ця мальовнича ділянка розташована в перехідній смузі від Малого Полісся до Житомирського Полісся

Урочище "Теребіжі" - це колишня долини стоку льодовикових вод. Ділянка, яка нині охороняється, є комплексом чотирьох озер, які перебувають на різних стадіях заростання, підвищених грив між ними та прилеглих соснових лісів. Своєрідність ландшафту надають озера, на трьох із яких вже утворились болота різних типів.

Наявність різноманітних екотопів на цій території обумовила своєрідний рослинний покрив, який перебуває у природному стані і

характеризується унікальними флористичними особливостями. Тут представлена лісова, болотна, прибережно-водна рослинність, фрагментарно лучна.

Болотна рослинність, яка добре представлена в заказнику, характеризується широким спектром болотних угруповань, розміщення яких пов'язане із стадією розвитку болота. Найбільш поширеними є угруповання мезотрофних боліт, оскільки три озера перебувають на мезотрофній та олігомезотрофній стадіях розвитку. На цих ділянках представлені ценози асоціації пухнатоплодоосоково-сфагнової. Це безлісні ділянки із значним обводненням, місцями вони являють собою плави. Співдомінантом в цих угрупованнях часто виступає осока омська. Поодинокі відмічені такі болотні види як вербозілля звичайне, пухівка піхвова, великі популяції утворює рідкісна комахоїдна рослина - росичка круглолиста та типовий вид мочажин - образки болотні. На ділянках боліт, які досягли найвищого ступеню розвитку і перебувають на олігомезотрофній стадії, поширені угруповання пухівки піхвової на суцільному сфагновому покриві. Вони характеризуються наявністю розрідженого деревного ярусу із берези пухнастої та сосни. Проективне покриття пухівки в них становить 60%. Флористичний склад цих угруповань збіднений, тут зростає не більше 5 видів судинних рослин. Серед оліготрофних угруповань слід відмітити також ценози сосново-пухівково-сфагнової асоціації. Наявні в заказнику і угруповання евтрофних боліт, зосереджені в основному на найменш зарослому озері із значною площею водної поверхні. По краях цього озера утворились смуги евтрофних боліт, які представлені тут угрупованнями очерету, рогузу вузьколистого, осоки омської, місцями із співдомінуванням лепешняку великого. Між купинами осоки локально співдомінантом виступає типовий бореальний болотний вид - вовче тіло болотне.

Велику наукову цінність мають виявлені в цих екотопах фрагменти ценозів дуже рідкісного виду - осоки богемської, занесеного до Червоної книги України. Місцезростання цього виду в Україні вважались зниклими. Майже ніхто із нині працюючих ботаніків України не бачив цієї своєрідної рослини. В заказнику осока виявлена навколо слабозарослого озера в декількох місцях. На одній із ділянок це екотонні смуги між високотрав'ям та лучними ценозами, завширшки 7-8 м. Тут осока богемська має проективне покриття 20%, співдомінантами виступають ситник розлогий та жовтець отруйний. Рослина рясно квітує і плодоносить. Тут вона зростає в оптимальних для себе умовах значного обводнення.

Водна рослинність не займає значних площ. В складі водних ценозів заслуговують на увагу угруповання латаття сніжно-білого, які включені до книги рідкісних угруповань - Зеленої книги України, та фрагменти угруповань, утворених центральноєвропейським видом - ситником бульбистим, занесеним до Червоної книги України. Серед

типових водних ценозів відмічені угруповання гірчаку земноводного та пухирника малого, рідкісного бореального виду.

Лісова рослинність, яка розміщується на погорбованих підвищених ділянках навколо озер представлена в основному сосновими лісами, угруповання яких змінюються в залежності від рельєфу. Більш сухі підвищені горби займають соснові ліси лишайникові, плескаті вирівняні ділянки та некруті схили - соснові ліси зеленомохові. Невеликі зниження у рельєфі зайняті сосновими лісами чорницево-зеленомоховими.

Найбільші площі займають тут соснові ліси зеленомохові, які виявились дуже цінними в науковому відношенні. В них виявлена велика популяція рідкісного бореального виду - діфазіастрому сплюснутого з Червоної книги України. Цей оригінальний невисокий плаун, який досі не наводився ні для області, ні для Малого Полісся, має форму сплюснутого віяла. Поодинокі виявлені місцезростання рідкісних на рівнині України видів - баранця звичайного та плауна колючого, занесених до Червоної книги України.

Різноманітність рослинного покриву території заказника обумовила розвиток багатой і цінної в науковому відношенні флори. Повний флористичний склад ще, безумовно, не виявлений. Це справа майбутніх дослідників. Проте, слід відзначити, що вже нині в складі флори виявлено 5 видів з Червоної книги України (це - три види плаунових, ситник бульбистий та осока богемська), а також ціла низка регіонально рідкісних видів, які підлягають охороні в області. Особливої наукової цінності надає цій території наявність тут великої популяції осоки богемської.

Заповідне урочище "Вільшина" у м. Нетішин

Заповідне урочище "Вільшина" площею 26 га знаходиться у східній частині м.Нетішин на землях Кривинського лісництва. Ділянка являє собою притерасну частину заплави річки Горинь, де знаходиться м.Нетішин, і чітко виділяється у рельєфі, займаючи природне зниження. Зволоження ділянки досить значне, особливо в частині, прилеглій до торф'янистої луки. Тут в нижній частині вільшняк обводнений, у зниженнях стоїть вода. Частина урочища, прилегла до дороги, менш обводнена, тут у вільшняк "заходять" невеликі підвищення, зайняті старою сосною, з яких вода стікає у вільшняк.

Більша частина ділянки залісна, менша частина її зайнята торф'янистою лукою. Переважає на ділянці вільшняк папоротевий - на зниженій ділянці із теліптерисом болотним (болотною папороттю), який є малопоширеною бореальною рослиною, а у більш підвищених частинах - із безщитником жіночим та щитником шартрським. Трапляється тут і щитник чоловічий. У вільшняку зростають типові рослини-супутники вільхи, такі як осоки несправжньоосмикавцева і видовжена, паслін солодко-гіркий, вовконіг болотний, чистець болотний. Є смуги з переважанням сідача коноплевого. У частині, прилеглій до траси, у

вільшняк заходять старі сосни, вік яких близько 170 років. Тут виявлений вільшняк злаково-папоротевий з мітлицею тонкою, куртинами чорниць. В цій частині урочища по його краю великі плями (місцями в декілька десятків квадратних метрів) утворює ожина шорстка. Це карпатський вид, який знаходиться тут на східній межі ареалу і рясно зростає в лісах, що оточують місто Нетішин. Тут зростає інший вид ожини - ведмежина (ожина несійська), а також центральноєвропейський вид - шипшина дрібноквіткова. В південній частині урочища на місці зведеного вільшняка на плескатому підвищенні сформувалась торф'яниста лука. На ній є окремі екземпляри і групи поростевої вільхи. Луки щучниково-дрібноосокові із щучником дернистим, осоками жовтою, чорною, просовидною. Великі популяції утворюють осот річковий, плакун верболистий, калюжниця болотна. На цьому лузі виявлені популяції двох видів лучно-болотних орхідей, занесених до Червоної книги України - пальчатокорінників м'ясочервоного та плямистого. Вони квітуть і плодоносять. Крім того, тут зростають такі малопоширені види болотних рослин як тризубець болотний, звіробій чотирикрилий, валеріана висока - цінна лікарська рослина.

Заповідне урочище "Вільшина" є ділянкою, що зберегла свій природний стан. Тут зростає багато типових для цих екотопів лучно-болотних рослин, є також рідкісні види флори, названі вище.

Осередок азалії понтійської

Окрасою Полонської землі є цей чудовий куточок, де в лісовому масиві виявлений осередок рідкісного для Хмельниччини третинного релікту рододендрона жовтого (азалія потнійська). Це невелика за площею (0,2 га), але цінна ділянка. Вона є найзахіднішим локалітетом виду на території України. Західніше лише в Польщі існує ізольоване місцезнаходження цього виду.

В рослинному покриві пам'ятки природи переважає лісова рослинність у поєднанні з болотною. Лісова рослинність представлена дубовими, дубово-сосновими лісами та культурами сосни на місці дубово-соснових лісів (це все на 0,2 га?). Дубові ліси, де в підліску плямами зустрічається рододендрон жовтий, є добре збереженими. Деревостан утворює дуб з невеликою домішкою сосни та берези. В цих лісах добре виявлений підлісок зімкненістю до 0,6. Підлісок утворюють горобина та крушина ламка. Місцями є значна домішка рододендрону жовтого. У травні він квітує великими жовтими духмяними суцвіттями.

Основу розрідженого трав'яно-чагарничкового покриву в цих ценозах утворює чорниця. В травостої тут звичайними є також брусниця, веснівка дволиста, куничник тростиновий, орляк, ожика волосиста, одинарник європейський, конвалія, воронець колосистий, серпій фарбувальний. Є центральноєвропейські види - кадило сарматське, живокіст серцевидний. Серед дубових лісів є ділянки дубових лісів

рододендрово-чорницевих та по зниженнях дубових лісів трясучковидноосокових, занесених до Зеленої книги України. На території пам'ятки природи виявлені червонокнижні плаун річний, любка дволиста, лілія лісова та регіонально рідкісні щитник австрійський, котячі лапки дводомні, скорзонера низька, перстач білий, кадило сарматське, живокіст серцевидний.

Особливу цінність в цьому гурті рослин становить рододендрон жовтий, який має на Хмельниччині саме в цій пам'ятці природи єдине відоме місцезростання.

Рідкісні лісо-болотні комплекси на Славуччині

У Славутському районі в Хутірському лісництві неподалік одна від одної є ділянки боліт різних типів з багатою болотною флорою. Це ботанічний заказник "Хутірський" площею 46,8 га і гідрологічна пам'ятка природи "Три дуби" площею 1,2 га.

В Хутірському заказнику охороняється рідкісний для регіону лісо-болотний комплекс, де болота досягли високого ступеня розвитку. Оліготрофні та олігомезотрофні болота тут утворились на місці водойм і є системою кількох заболочених знижень у лісовому масиві. Болота на більшій частині площі перебувають на оліго-мезотрофній стадії і тільки окремі їх частини досягли найвищого (оліготрофного) ступеня розвитку. Це лісові досить обводнені болотні ценози із суцільним сфагновим покривом, які зберігають цілу низку рідкісних бореальних та реліктових болотних видів. Рослинний покрив боліт характеризується різноманітним складом рослинних угруповань. Серед угруповань мезотрофних ділянок найбільш поширеною є асоціація березово-сосново-пухнатоплодоосокова. Деревостан тут розріджений, в досить густому трав'яному покриві (80%), крім домінантів, значну домішку утворює кунічник сіруватий, місцями очерет і вовче тіло болотне. Крім типових болотних видів, в цих екотопах виявлений такий реліктовий вид як верба чорнична, занесена до Червоної книги України, та малопоширений бореальний вид - осока багнова, який охороняється в області. Ці види утворюють великі популяції і мають добру життєвість. Серед інших угруповань мезотрофного типу слід назвати ценози асоціації березово-сосново-осоково-сфагнової (з осоками пухнатоплодою та чорною), березово-сосново-очеретяно-сфагнової, березово-сосново-очеретяно-вовчетілово-сфагнової та деякі інші. На всіх ділянках цих угруповань сфагновий покрив дуже насичений водою, покриття його складає 80-90%. На ділянках, які досягли більш високого ступеню розвитку, панують сосново-піхвовопухівкоосоково-сфагнові ценози. Тут значну домішку утворює осока пухнатоплода, є багно болотне, лохина. Ці болотні види в області охороняються. Серед угруповань оліготрофних боліт слід назвати і такі асоціації як сосново-багново-пухівково-журавлиново-сфагнова та

березово-пухівково-журавлиново-сфагнова. Ці болотні угруповання є рідкісними для області.

Серед лісової рослинності, прилеглої до боліт, переважають сосново-дубові та соснові ліси типового складу та набору рослинних угруповань. На екотонних смугах між болотом та лісом виявлений плаун колючий, занесений до Червоної книги України.

В пам'ятці природи "Три дуби" охороняється природне лісове озеро, яке утворилось у видовженій улоговині. Центральну частину цієї ділянки займає природне лісове озеро, яке утворилось у видовженій улоговині. Озеро тягнеться на 250-300 м і має ширину біля 40 м, загальна площа озера біля 1 га. Озеро оточене з усіх боків лісом, який утворює з озером єдиний лісо-озерний комплекс. Озеро має оригінальний для регіону еумезотрофний хід заростання. Еумезотрофні рослинні угруповання розміщені вузькими смугами по боках озера. Найбільш інтенсивний процес заростання виявлений в східній частині озера, де глибина найменша. Саме тут утворились болотні угруповання значної площі. В цій частині переважають угруповання рогозу широколистого із співдомінуванням бореального виду - вовчого тіла болотного. Характерною їх особливістю є наявність сфагнового покриву, проективне покриття якого досягає 50%. Флористичне ядро в цих ценозах утворюють типові болотні види - смовдь болотна, кизляк китицецвітій, півники болотні, ситник розлогий. Виявлені тут і такі малопоширені в регіоні види як образки болотні та в найбільш обводнених місцях комахоїдна рослина - пухирник малий. В нешироких прибережно-водних смугах, які оточують озеро, переважають угруповання куничника сіруватого, місцями із співдомінуванням вовчого тіла болотного на сфагновому покриві.

Лісова рослинність в прилеглих до озера смугах представлена сосновими та сосново-дубовими лісами, місцями із сосново-грабово-дубовими лісами. На більш знижених, прилеглих до озера ділянках переважають соснові ліси чорницеві та чорницево-зеленомохові, в яких виявлені великі вопуляції плауна колючого, занесеного до Червоної книги України. Вище в рельєфі розміщуються сосново-дубові ліси, другий ярус в яких утворює дуб звичайний, інколи -з грабом звичайним. В трав'яно-чагарничковому покриві цих лісів переважає чорниця. Тут зростає ожика лісова, дуже рідкісний на рівнині вид, який в Україні поширений в основному в Карпатах.

Пам'ятка природи "Три дуби" за своїм рослинним покривом та флорою є типовою для Малого Полісся. Водночас в зв'язку з переважанням у заростанні водойми еумезотрофних ценозів із сфагновим покривом вона має специфічні бореальні риси. Основу флори утворюють типові болотні та лісові види. В складі флори є вид із Червоної книги України (плаун колючий) та ряд малопоширених - образки болотні, пухирник малий, ожика лісова. Ділянка є дуже мальовничою, відомою в регіоні.

Давидковецький заказник

Лісовий заказник місцевого значення "Давидковецький" площею 506 га знаходиться в Хмельницькому районі поруч з обласним центром на схід від нього. Територія являє собою плакорний широколистяний масив. В деревостані переважає граб. Як правило з ним співдомінують інші широколистяні види - дуб звичайний, ясен. Є ділянки чистих грабових лісів. З невисокою участю в деревостані присутні липа серцелиста, в'язи гірський та граболистий, черешня, клени гостролистий та польовий. В трав'яному ярусі влітку переважають копитняк європейський, підмаренник запашний, зірочник ланцетолистий, зеленчук жовтий, яглиця. Навесні в трав'яному покриві домінують ефемероїди - пшінка весняна, рясг у щільнений, анемона жовтецева. З інших видів у лісі найчастіше трапляються бруслина європейська, медунка темна, рівноплідник рутвицелистий, зірочки жовті, купини широколиста та багатоквіткова, фіалка Рейхенбаха. В заказнику виявлено два види рослин із Червоної книги України. Це гніздівка звичайна і лілія лісова.

Розташування заказника поруч із великим містом, поблизу автомобільного шосе разом з невисокою лісистістю регіону призводять до високого рекреаційного навантаження на його територію. Наслідком цього є значна участь в ценозах на деяких ділянках лісу таких видів, як підмаренник чіпкий, глуха кропива плямиста, пшінка весняна. Незважаючи на це, тут зберігається багата лісова флора. Рослинність заказника в цілому типова для Поділля.

МАЙБУТНЄ ЗАПОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

(ЦІННІ ДІЛЯНКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ, ЯКІ ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА ОХОРОНУ)

Півнева гора

Урочище “Півнева гора” - одна із мальовничих ділянок Хмельниччини, яка знаходиться біля одноіменного хутора (на місці колишнього села) Півнева гора Ізяславського району. Це - великий піщаний видовжений горб на боровій терасі Горині, добре помітний у рельєфі. Цей горб засаджений сосною віком близько 40 років. Основне угруповання, яке формується в цих культурах сосни - сосновий ліс зеленомоховий. Місцями є плями конвалії, куртини дзвоників круглолистих, смовді гірської, очитку Рупрехта, чебрецю звичайного - типових видів сухих соснових лісів.

В цьому урочищі виявлене зростання рідкісних та малопоширених видів рослин. Насамперед, слід відмітити наявність тут великих популяцій реліктової папороті багатоніжки звичайної. Цей вид поширений в північній та помірній зонах Голарктики, на території України він є малопоширеним, на Малому Поліссі відомі лише поодинокі його знаходження. В урочищі “Півнева Гора” ця папороть утворює великі куртини (їх було виявлено більше 10), має хорошу життєвість, спороносить.

Тут були знайдені і інші рідкісні та малопоширені види рослин - молодило руське та еремогонне скельна. Молодило руське, що утворює характерні мальовничі розетки, на Поліссі і особливо на Малому Поліссі трапляється зрідка, переважно на піщаних горбах. В околицях м. Нетішин воно більше ніде не було виявлене. На Півневій горі на схилі, майже позбавленому трав'яного та мохового покриву, молодило руське утворювало великі популяції. В деяких з них нараховувалось декілька сотень молодих розеток. Такі великі популяції на Малому Поліссі ще не відмічались.

Найбільший науковий інтерес становить знаходження на Півневій горі в нижній частині схилу великої популяції еремогонне скельної (піщанки вузьколистої). Цей вид із євразійським ареалом є рідкісним на європейській його частині. В Україні він зростає на Українському Поліссі, де проходить південна межа його ареалу. Для Малого Полісся цей вид ще не був відомий.

Щоб зберегти цей своєрідний куточок необхідно створити тут природно-заповідну територію.

Унікальна ділянка на терасі Горині

Багата за флористичним складом ділянка загальною площею біля 10 га знаходиться у Славутському районі неподалік від колишнього хутора Сільце (кв. 21 Кривинського лісництва). Це ділянка тераси р.Горинь із досить погорбованим рельєфом, яка включає піщані горби та заболочені зниження з водоймами, вірогідно штучними, але вже зарослими. По краю цієї території прокладена лінія вузькоколійної залізниці. Тут виявлені лісова, болотна та лучна рослинність.

На терасі Горині є зниження, в центрі якого розміщується озерце овальної форми. По краях озеро заросло очеретом, місцями з густим покривом сфагнових мохів. З західного боку озера співдомінантом очерету виступає малопоширений в регіоні вид вех сизаровидний, відмічені угруповання очерету із співдомінуванням болотної папороті - теліптерісу болотного. Великі популяції по краю цих ценозів утворює регіонально рідкісна рослина - росичка круглолиста, а на обводнених ділянках - малопоширений вид їжача голівка маленька. Велику наукову цінність мають виявлені в цій улоговині популяції ряду рідкісних видів. Тут виявлена велика популяція лікоподієлли заплавної, занесеної до Червоної книги України. Слід відмітити, що цей рідкісний в Україні вид плаунових на Малому Поліссі виявлений вперше. Тут він має добру життєвість і утворює багаточисельні популяції. В подібних екотопах зростає і рідкісна болотна орхідея - коручка болотна (Червона книга України), яка тут також у хорошому життєвому стані - квітує і плодоносить. Не менш цінним є і наявність і такого реліктового пограничноареального виду як хвощ рябий. Цей вид у плескатих зниженнях між залізницею і лісом утворює угруповання. Це невеличкі ділянки площею 3х4 м, по краях яких зростають окремі дерева берези повислої та сосни. Основою травостою на цих ділянках є хвощ рябий, покриття якого досягає 60-70% на покриві зелених мохів. Серед різнотрав'я тут зростають лучно-болотні та болотні види - осока просовидна, осока жовта, хвощ річковий, ситник жаб'ячий, льон проносний, зозулин цвіт тощо.

Лісова рослинність представлена культурами сосни різного віку, переважно в сухих екотопах. Значні площі займають культури сосни віком 20-25 років, майже без трав'яного покриву з плямами лишайників. Невеликими ділянками зустрічаються соснові ліси зеленомохові. В них відмічені такі західні види як саротамнус віниковий та лемботропіс чорніючий, які при просуванні на схід випадають з травостою. В західній частині цієї ділянки виявлений грабовий ліс рідкотравний з розрідженими соснами в першому ярусі. В трав'яному ярусі переважають такі неморальні види як осока пальчаста, печіночниця звичайна, перлівка поникла, під'ялиник звичайний.

Враховуючи наукову цінність цієї ділянки, де виявлені великі популяції таких рідкісних для регіону та України в цілому рослин як лікоподієлла заплавна, коручка болотна, занесених до Червоної книги, хвощ рябий, який є рідкісним реліктовим видом, вважаємо за доцільне

створити тут ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення. З метою збереження цих екотопів необхідно охороняти весь комплекс - прилеглу з усіх боків смугу лісового масиву шириною до 100м та улоговину, не продовжувати розробку кар'єів та підтримувати гідрологічний режим, який забезпечував би збереження цих вологолюбних видів

Праліс біля атомної станції

Ділянка "Праліс" знаходиться на території, підпорядкованій міській раді м. Нетішин. Вона входить у лісові землі Кривинського лісництва (кв. 15). Ділянка являє собою вцілілу частину старого дубово-грабового лісу, більша частина якого нині вирубана. Вік старих дубів, які складають основу деревостану близько 200 років. Висота дубів сягає 22-24 м, середній діаметр 90-92 см. Є окремі дуби-велетні діаметром 110 см і більше. Дуб утворює перший ярус, в якому також наявні старі сосни та поодинокі берези. Граб утворює густий другий ярус висотою 14-16 м, він дає численний підріст. Чимало також підросту клену гостролистого.

Внаслідок значної затіненості підлісок не розвинений, а трав'яний ярус розріджений. В ньому переважають види як широколистяних лісів (неморальні), так і північні (бореальні) види, характерні для хвойних лісів. Вони утворюють розріджений трав'яний покрив. Основну роль у ньому відіграють зеленчук жовтий та квасениця звичайна. Поодинокі зустрічаються такі типові лісові види як зірочник лісовий, веснівка дволиста.

На ділянці "Праліс" виявлене зростання декількох рідкісних та малопоширених видів. Тут зростає три види з Червоної книги України: лілія лісова, коручки широколиста та темночервона. Лілія лісова утворює великі популяції - місцями відмічають по 30-40 молодих неkvітучих екземплярів, на освітлених місцях вона kvітує та плодоносить. Популяції лісових орхідей - двох вищезгаданих видів коручки - зростають в основному по узліссях, в частково освітленій смугі, де вони рясно kvітують та плодоносять. В складі флори ділянки відмічені деякі малопоширені в регіоні види - печіночниця благородна, папороть австрійська, наперстянка великоквіткова. Із боку вирубки в смугі старого лісу є також невелика ділянка старого дубово-соснового лісу на підвищенні. На цій, більш освітленій, ніж дубово-грабовий ліс, ділянці з'являються малопоширені світлолюбні лісові види - шипшина травнева, холодок лікарський, холодок багатолістий. На узліссях ділянки "Праліс" рясно kvітують перестріч гайовий, наперстянка великоквіткова, воловик високий, в'язіль різнобарвний.

Ділянка старого грабово-дубового лісу, яка збереглась, має високу наукову значущість. Це цінне лісове насадження - еталон пралісів, яких в цьому регіоні вже немає. Такі ліси занесені до Зеленої книги України і підлягають охороні. Праліс є місцезростанням вищезгаданих видів

рідкісних рослин, з яких 3 - занесені до Червоної книги України. Тому доцільно оголосити цю ділянку лісовим заказником місцевого значення, включивши до нього всю ділянку старого лісу в кв. 15.