

Флористичні цінності Європи

Шиверекія подільська (*Schivereckia podolica* Andrzej. et DC). Реліктова рослина з диз'юнктивним (розірваним), поширена в Центральній та Східній Європі. Вид, названий в честь польського ботаніка Шивер^рка. В Україні відомий із Правобережного Лісостепу та східного Степу. Зростає на вапнякових та крейдяних відслоненнях. Рослина вразлива до антропогенного впливу. Зникає при спалюванні, випасанні, витоптуванні. Знищується при стихійному добуванні вапняку у місцях зростання виду. Багаторічна рослина із опушеним зеленим зимуючим листям і китицею білих квітів. На Хмельниччині відомо біля 10 місць зростання шиверекії в межах НПП “Подільські Товтри”: Вільховецькі товтри Чемеровецького р-ну, схили р. Смотрич біля м. Кам'янця-Подільського та с. Устя, скелясті береги р. Збруч біля с. Кудринці, пам'ятка природи "Китайгородське відслонення" та схили р. Дністер біля Бакотського скельного монастиря. Утримується в колекції Кам'янець-Подільського ботанічного саду.

Зіновать Блоцького (*Camaecytisus blockianus* Pawł.). Ендемічна реліктова рослина, що зростає в Правобережному та Лівобережному Лісостепу. Ростає на лісових галявинах, узліссях, лучно-степових і степових ділянках та вапнякових кам'янистих схилах. Рослина зникає при залісненні схилів хвойними породами, при видобутку вапняків. Невисокий кущ (20-40 см). Блідо-жовті квіти утворюють щитковидно-головчасте суцвіття на верхівці молодих гілок. В Хмельницькій області рослина зростає в Придністров'ї та на товтровій гряді (заказники загальнодержавного значення “Чапля”, “Самовита”, Циківський”) та на територіях Дунаєвецького (с. Слобідка Смотрицькі), Новоушицького (с. Пижівка) р-нів, які не є природно-заповідними.

Зіновать подільська (*Chamaecytisus podolicus* Blocki.). Ендемічний реліктовий вид, що зростає в Закарпатті та Західному Лісостепу на ґрунтах, багатих на кальцій. Рослина дуже рідко зустрічається серед чагарників, на лучно-степових, степових схилах, гине при руйнуванні місць зростання, випалюванні травостою. Кущ до 50 см заввишки. Квіти утворюють головчасте суцвіття на верхівках молодих і минулорічних гілочок. Віночок блідожовтий. На Хмельниччині зустрічається біля с. Гуменці (гербарні збори 1950 р., НПП “Подільські Товтри”) та в заказнику “Чапля” на схилах р. Тернави та Дністер. Утримується в колекції Кам'янець-Подільського ботанічного саду.

Змієголовник австрійський (*Dracosephalum austriacum* L.). Реліктовий вид з родини губоцвітих. Відомий з Розточчя-Опілля та Поділля, де зростає на вапнякових відслоненнях. Квіти фіолетові. Форма віночка нагадує голову

дракона, що зумовило назву виду. Відоме одне місце зростання с. Закупне Чемеровецького р-ну (Круцкевич, 1937). В останні десятиріччя вид не був знайдений.

Зозулині черевички справжні (*Cypripedium calceolus* L.). Реліктова рослина. Північноєвразійський вид, що спорадично зустрічається по всій Україні у листяних та мішаних лісах. Назва рослини зумовлена формою квітів, що нагадують черевички. Рослина багаторічна. Квітка велика, з червоно-бурою оцвітиною, губа еліптична, коротша від листочків світло-жовта, всередині з пурпурними плямками. У Хмельницькій області знайдена поки що в Городоцькому (заказник загальнодержавного значення “Кошарна”, вид гарно відновлюється) та Кам'янець-Подільському району (заказник загальнодержавного значення “Совий яр”, спостерігається скорочення чисельності особин, оскільки рослини зростають біля стежки, вони витоптуються і зриваються), в дубово-грабових лісах.

Рябчик гірський (*Fritillaria montana* Норре). Рослина є ефемероїдом, квіти мають фіолетово-пурпурове забарвлення з характерним візерунком. Рослина поширена в південній Європі, в Україні перебуває на північно-східній межі поширення. В Україні рябчик гірський трапляється дуже рідко. Відомі поодинокі місця зростання в Придністров'ї (Хмельницька, Чернівецька обл.) в дубово-грабових лісах. Рослини вириваються та викопуються дачниками, що знижує відновлення рябчика в природному місцезростанні. Єдине поки що відоме на Хмельниччині місцезростання – ліс в улоговині біля с. Устя (**у кварталах** НПП “Подільські Товтри”).

Шавлія кременецька (*Salvia cremenecensis* Bess.). Ендемічний вид, поширений на Поділлі (Кременецькі гори та Придністров'я). Зростає на вапнякових кам'янистих степових схилах Кременецьких гір та Товтровою круку. Вид утворює малочисельні групи. Дуже негативно впливає викошування в період цвітіння та плодоношення Рослина багаторічна, дуже схожа на більш поширені види шавлію лучну та шавлію пониклу, але вирізняється будовою квітки. На Хмельниччині вид відомий на території заказника місцевого значення “Мукшанський” та на схилах р. Мукша біля с. Мала Слобода).

Цибуля коса (*Allium obliquum* L.). Реліктовий вид з диз'юнктивним центральноєвропейсько-азійським ареалом, відомий з Румунії, Південного Уралу, Середньої Азії. Квіти у цього виду цибулі мають блідо-зелений віночок. Любить багаті на кальцій ґрунти. Еродованість схилів призводить до загибелі рослин при зсувах та змивах вапнякової породи. В Україні росте лише в Хмельницькій області на схилах р. Смотрич в заказнику місцевого значення “Устянський”. Культивується в Кам'янець-Подільському ботанічного саду.

Цибуля пряма (*Allium strictum* Schrad.). Диз'юнктивноареальний реліктовий вид, відомий з Центральної Європи та Середньої Азії, в Україні - з Кременецьких гір, Гологор та Придністров'я. Небагаточисельний вид з проростками, які гинуть при значній сухості ґрунту. Цибулинна рослина з рожево-пурпуровими квітами. Зростає на вапнякових відслоненнях В Хмельницькій області вид знайдено в заказнику "Устянський" на схилах р. Смотрич Кам'янець-Подільського р-ну.

Цибуля переодягнена (*Allium pervestitum* Klok.). Рослина ендемічна, реліктова з розірваним ареалом. Багаторічна цибулинна рослина з рожевими квітами. Вид відомий з Придністров'я та Приазов'я. Зустрічається поодиноким на невеликих степових вапнякових схилах. За даними Б.В. Заверухи (1985) наводиться для околиць м. Кам'янець-Подільський (каньйон р.Мукша). Територія знаходиться під значним антропогенним впливом (викошування, випалювання, засмічення). Місцезростання не вдалося віднайти.

Ковила волосиста (*Stipa capillata* L.). Євразійський вид. В Україні зустрічається в лісостеповій та степовій зоні, в Передкарпатті та Криму. Поширений на степових ділянках, вапнякових відслоненнях. Ковила багаторічною трав'яною рослиною, що утворює щільні дернини. Квіти утворюють суцвіття волоть з одноквітковими колосками. Остюк нижньої квіткової луски неперистий, покручений. У Хмельницькій області зростає в на Товтровій гряді, в на крутих схилах Дністра та його приток, утворюючи місцями невеликі степові угруповання. Охороняється вид в заказниках загальнодержавного значення "Чапля", "Вербецькі товтри", "Смотрицький каньйон" Кам'янець-Подільського р-ну, в пам'ятці природи "Товтра "Самовита", заказниках "Івахновецький", Вільховецькі Товтри" Чемеровецького р-ну, "Данилевський", "Дністровський", "Калюський" Новоушицького р-ну. Крім цього рослина зростає на крутих схилах Дністра в районі сіл Жванець, Брага, річок Тернави біля с.Врублівці, Студениці біля с.Колодіївка Кам'янець-Подільського району, на схилах р. Смотрич біля с. Смотрич Дунаєвецького р-ну. Потерпає при випалюванні, викошуванні та надмірному випасанні. Рослина зберігається в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Ковила пірчаста (*Stipa pennata* L.). На відміну від ковили волосистої остюки мають пірчастий сріблястий додаток. Рослина має євразійський ареал, в Україні відома з Лісостепу та Степу. Зростає на степових ділянках. На ковилу пірчасту негативно впливає знищення рослин в період цвітіння на букети-сухоцвіти, випалювання, викошування та надмірне випасання. На Хмельниччині зростає в Придністров'ї, утворюючи невеликі угруповання. Охороняється в заказниках "Чапля", "Вербецькі товтри", "Смотрицький каньйон" Кам'янець-Подільського р-ну, в пам'ятці природи "Товтра

Самовита" Чемеровецького р-ну, в заказниках "Данилевський", "Дністровський", "Калюський" Новоушицького р-ну.

Лешиця дністровська (*Gypsophila thyratica* A. Krasnova). Рослина з родини гвоздичних. Має розгалужене стебло і білі квіти. Рослина є подільським ендеміком. Зростає на вапнякових відслоненнях. Латинська назва "гіпсолюбка" вказує на приуроченість виду до багатих на кальцій ґрунтів. На стан популяцій впливають зривання рослини на букети та випалювання травостою. В Хмельницькій області рослина поширена в межах НПП "Подільські Товтри" (заказники "Вербицькі Товтри", "Івахновецький").

Сон великий (*Pulsatilla grandis* Wend.). Високодекоративний вид з центральноєвропейським ареалом. Багаторічна трав'яна рослина із світло-фіолетовими квітами, опушена шовковистими жовтуватими волосками. В Україні трапляється в Західному та Правобережному Лісостепу. Зростає на лісових галявинах, між чагарниками, лучно-степових схилах подільських товтр. Рослина знищується через свої декоративні та лікувальні властивості, чисельність популяцій дуже знижується при випалюванні сухої трави, викошуванні. В Хмельницькій області відомі місцезростання на території НПП "Подільські Товтри": остепнені р. Смотрич біля м. Кам'янця-Подільського, заказниках загальнодержавного значення "Чапля", "Совий яр" та "Івахновецький", біля Бакотського скельного монастиря та на степових схилах біля с. Стара Ушиця. Латинська назва роду *Pulsatilla* означає маленький дзвіночок. Утримується в колекції Кам'янець-Подільського ботанічного саду.

Рутвиця смердюча (*Thalictrum foetidum* L.). Європейсько-азіатський реліктовий вид з родини жовтецевих. Має розірваний ареал. В Україні поширений в Західному Лісостепу, Донецькому Степу. Зростає у степових угрупованнях. Зникає при випалюванні трав, розробці вапняка. На Хмельниччині рослина відома з околиць м. Кам'янець-Подільського.

Булатка великоквіткова (*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce). Один із трьох видів роду на території України та Хмельницької області. Квіти білі, листки еліптичні, відносно широкі. В Хмельницькій області відома з південних та західних районів. Росте в листяних лісах та на узліссях. Охороняється в заказниках загальнодержавного значення "Панівецька дача", "Кармалюкова гора", "Совий яр" Кам'янець-Подільського р-ну, заказниках "Івахновецький ліс", "Велика і Мала Бугаїха", "Сокіл" Чемеровецького р-ну. "Городоцька дача", "Сатанівський", "Карабчіївський" Городоцького р-ну, "Данилевський" Новоушицького р-ну. Зустрічається в лісах Маківського лісництва Дунаєвецького р-ну.

Коручка чемерникова (*Epipactis helleborine* (L.) Crantz.). Євразійський вид, поширений на більшій частині України. В Хмельницькій області трапляється в

усіх районах. Зростає в листяних лісах та на узліссях. Охороняється в заказниках загальнодержавного значення “Панівецька дача”, “Кармалюкова гора”, “Совий яр” Кам’янець-Подільського р-ну, заказниках “Івахнівецький ліс”, “Велика і Мала Бугаїхи”, “Циківський”, “Жабинецька дача”, “Сокіл” Чемеровецького р-ну, “Сатанівський”, “Кошарна”, “Карабчіївський” Городоцького р-ну, “Данилевський” Новоушицького р-ну, “Залісецька дача” Дунаєвецького р-ну, “Чоботарня” Летичівського району, “Дорогоща” у м.Нетішин

Зозулинець салеповий (*Orchis morio* L.). Рослина має європейсько-середземноморсько-азійський ареал. Вид трапляється на більшій частині території України, однак в степовій зоні дуже рідко. Зростає на лучних і лучно-степових ділянках. Трав’яна багаторічна рослина з кулястими бульбами, квіти мають губу трилопатевою з темнопурпурними плямами. Має біологічні особливості, які обмежують його поширення, зникає під впливом антропогенної дії (добування вапняку, випалювання, витоптування). В Хмельницькій області відоме місцезростання на степових схилах біля с. Гораївка ближче до Бакотської затоки над р. Дністер.

Коральковець тричінадрізаний (*Corallorhiza trifida* Chatel.). Вид зустрічається в помірній зоні Євразії. Рослина є сапрофітом, не має хлорофілу. Квітки жовтуваті-зелені, Губа трилопатева з червонуватими смужками. В Україні трапляється в Карпатах, Гірському Криму, дуже рідко на рівнині - на Правобережжі в межах лісової і лісостепової зон. утворює малочисленні групи по всій Україні. Орхідея зникає при зміні умов середовища (вирубці лісів, випасанні тварин у лісі, засміченні). В Хмельницькій області коральковець тричінадрізаний відомий з Кам’янець-Подільського району, де зростає у грабово-дубовому лісі в Суржинецькому яру.

Астрагал монпельйський (*Astragalus monspessulanus* L.) - рослина з родини бобових. Має пурпурові квіти та своєрідні серповидні великі плоди. Вид має субсередземноморський ареал. В Україні трапляється в Західному Лісостепу, де знаходиться на північно-східній межі свого поширення. Зростає астрагал монпельйський на вапнякових осипах, кам’янистих схилах. На чисельність рослин впливають процеси заліснення схилів, ерозія ґрунтів. На Хмельниччині трапляється в південній частині області: в Кам’янець-Подільському (заказники “Наддністрянський”, “Чапля”, “Староушицький”, “Устянський”, “Мукшанський”, схили по рр. Смотрич, Мукша, Студениця, Дністер), Новоушицькому (заказники “Данилевський”, “Дністровський”, “Калюський”), Чемеровецькому (пам’ятка природи “Товтра Самовита”, заказник “Вільховецький”, товтри в с. Яцьківці, Залуччя, Черче), Дунаєвецькому (біля смт. Смотрич) районах.

Тонконіг різнобарвний (*Poa versicolor* Bess.). Ендемічний вид злаків, зростає в Західному Поділлі та Передкарпатті, утворюючи угруповання на степових

схилах. Зникає при добуванні вапняку, залісені степових схилів, випалюванні та випасанні. Багаторічний злак із барвистими колосками. На Хмельниччині трапляється по берегах р. Дністер та її приток в межах Кам'янецького Придністров'я, в т.ч. у заказниках "Устянський", "Староушицький", "Наддністрянський", "Калюський".

Клокичка периста (*Staphylea pinnata* L.) - кущ або невисоке деревце до 5 м. Реліктова рослина з субсередземноморським ареалом. В Україні вид відомий з Поділля, Волині, Закарпаття. Зростає в грабово-дубових, рідше - букових, лісах, на кам'янистих вапнякових заліснених схилах. Знищується при вирубках лісу. Квіти білі, зібрані у волоть. На Хмельниччині зустрічається поодинокі або невеликими групами в Городоцькому, Чемеровецькому, Кам'янець-Подільському, Дунаєвецькому та Новоушицькому районах. Зберігається у Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Шафран Гейфеля (*Crocus heuffelianus* Herb.) - весняний ефемероїд з фіолетовими шестипелюстковими квітами і лінійними листками. Вид має центральноєвропейський ареал. В Україні рослина відома із Закарпаття, Передкарпаття та Поділля. На Хмельниччині знаходиться на східній межі ареалу. Зростає в дубово-грабових, букових лісах на галявинах. Масово винищується в період цвітіння та кількісно зменшується при рубках лісу. Багаторічна бульбо-цибулина рослина. Квіти фіолетові, поодинокі. На Хмельниччині охороняється у заказниках "Циківська дача" та "Залісецький". В культурі зберігається в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Бруслина карликова (*Euonymus nana* Vieb.) - палеарктичний вид з диз'юнктивним ареалом, третинний релікт. Невеликий кущ з вузькими шкірястими листками. Квіти бурувато-червоного забарвлення. Плід - блідожовта чи зелена з рожевим принасіником коробочка. Зростає в дубово-грабових та букових лісах. Зникає при зруйнуванні місць зростання, викопуванні, при лісових пожежах. Вид дуже вразливий, в умовах України насіннєве відтворення є незадовільним. На Хмельниччині вид знайдено в Городоцькому (заказник "Сатанівський") та Чемеровецькому (заказник "Циківська дача") районах.

Молочай волинський (*Euphorbia volhynica* Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl.) - третинний релікт, волино-подільський ендемік. Зростає на узліссях, на луках, в лучних степах і чагарникових угрупованнях. Зникає при знищенні місць зростання: при добуванні вапняку, випалюванні травостою. Зберігається в заказниках загальнодержавного значення "Чапля", "Совий яр", "Циківський", "Данилівський", "Іванковецький".

Аконіт Бессера (*Aconitum besseranum* Andr.) - волино-подільський ендемік. Висока трав'яна рослина з пальчаторозсіченими листками. Квіти бруднувато-білі, зібрані в розгалужене гроно. Шолом квітки конічний, тупий,

бокові чашолистки округлі, опушені, шпорка кільцевидно вигнута. Рoste в широколистяних лісах, по чагарниках. Зникає після вирубки лісу. В Хмельницькій області відомий з Кам'янець-Подільського (заказники “Совий яр”, “Княжпільський”) та Городоцького районів (заказник “Кошарнинський”).

Фіалка біла (*Viola alba* Bess.). Центральноевропейський вид, в Хмельницькій області знаходиться на східній межі ареалу. В Україні відомий із Закарпаття, Прикарпаття, Поділля. Рoste фіалка біла в дубово-грабових лісах, на галявинах, узліссях. Виринається на букети. Квіти цього виду фіалок білі, запашні. На Хмельниччині зустрічається в Кам'янецькому Придністров'ї (заказник “На валу”, Кам'янець-Подільський дендропарк). Вирощується в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Беладонна звичайна (*Atropa belladonna* L.) - третинний релікт з європейським ареалом. Належить до родини пасльонових. Квіти мають буро-фіолетовий колір, плоди - чорні ягоди. В Україні зустрічається в Закарпатті, Прикарпатті, на Поділлі та в Криму в букових та дубово-грабових лісах. На Хмельниччині вид відомий у заказниках “Сатанівський,” “Кошарнинський”. Видова назва рослини ("bella donna") означає "гарна жінка" - колись вважалося, що красивими є широкі зіниці, а рослина містить алкалоїд атропін, який їх розширює. Вид зберігається в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Зіновать біла (*Chamaecytisus albus* (Nasq.) Roth.) - куш з родини бобових. Центральноевропейський вид. В Україні відомий із Закарпаття, Прикарпаття, Поділля, Придністров'я. Зростає на лісових галявинах, степових схилах. Потерпає при спалюванні трав'яного покриву, розробці вапняків. Куш, який досягає 80 см заввишки. Гілки прямостоячі, квіти білі або блідожовті. На Хмельниччині вид зустрічається в Кам'янець-Подільському (пам'ятка природи “Смотрицький каньйон”, заказники “Чапля”, “Староушицький”, “Наддністрянський”), Чемеровецькому (пам'ятка природи “Товтра Самовита”, заказники “Циківський”, “Сорочинські Товтри”), Дунаєвецькому, Городоцькому (заказник “Карабчіївський”) та Новоушицькому (заказники “Глібівський”, “Калюський”) районах, а також на не заповіданих ділянках на схилах Дністра.

Лунарія оживаюча (*Lunaria rediviva* L.). Реліктова рослина з диз'юнктивним ареалом. В Україні зустрічається в Карпатах, Розточчі-Опіллі, Західному та Лівобережному (Сумська область) Лісостепу. Рослина належить до родини хрестоцвітих. Її легко впізнати по характерних великих стручечках, великих серцевидних листках. Квіти рожево-фіолетові, інколи - білі, запашні. Цвіте рослина у травні-червні. Трапляється в листяних лісах на кам'янистих ґрунтах. На Хмельниччині зустрічається в Чемеровецькому районі у заказнику “Циківський” та в урочищі “Недобір” Кам'янець-Подільського району.

Ясенець білий (*Dictamnus albus* L.) - центральноєвропейський реліктовий вид. Народні назви: червона рута, неопалима купина. В Україні трапляється на Правобережжі, в основному на Поділлі. Рослина багаторічна, трав'яна, із залозистим опушенням. Квіти досить великі (діаметром близько 5 см) блідорожеві з темнішими прожилками, інколи білі, зібрані на верхівці стебла у китицю. Контакт рослини із шкірою спричиняє опіки. В Хмельницькій області малочисленні популяції трапляються на території НПП "Подільські Товтри": заказники "Староушицький", "Наддністрянський", "Чапля", пам'ятка природи "Смотрицький каньйон" (Кам'янець-Подільський район), пам'ятка природи "Товтра Самовита", заказник "Вільховецькі Товтри" (Чемеровецького р-ну), заказнику "Дністровський" (Новоушицький район). Вирощується у Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Шоломниця весняна (*Scutellaria verna* Bess.). Ендемічний подільсько-причорноморський вид. В Україні зустрічається в Придністров'ї та в Західному Причорномор'ї. Зростає на вапнякових відслоненнях. Рослина утворює невеликі куртини, зникає при руйнуванні екоотопів. Багаторічна рослина, півкущик. Віночок жовтий з синюватою плямкою на верхній губі і голубими лопастями боковими. На Хмельниччині зростає на осипах та вапнякових схилах в долинах Дністра та його приток (заказники "Устянський", "Мукшанський", Староушицький", "Наддністрянський", "Чапля", "Дністровський", "Калюський", "Данилевський").

Льон лінійнолистий (*Linum linearifolium* (Lindem.) Jav.). Подільсько-причорноморський ендемік. В Україні відомий вид з Правобережного Лісостепу та Степу. Рослина зустрічається на вапнякових відслоненнях. Зникає при добуванні вапняку, терасуванні схилів та їх залісені сосною. Рослина з численними стеблами, пелюстки віночка жовті. В Хмельницькій області поширена по схилах р. Дністер та її притоків в Кам'янецькому Придністров'ї (заказники "Староушицький", "Наддністрянський", "Чапля"), в Новоушицькому районі (заказники "Глібівський", "Калюський"). Вирощується в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Льон бесарабський (*Linum bessarabicum* (Savul. et Rayss.) Klok ex Juz.). Ендемік Західного Лісостепу. Квіти жовті, стебла густо улишені. Трапляється на степових схилах, вапнякових відслоненнях. Знищується при випалюванні травостою, добуванні вапняку, залісені схилів. Пелюстки жовті. На Хмельниччині вид відомий в Кам'янець-Подільському районі (заказники "Наддністрянський", "Чапля").

Гіацинтик блідий (*Hyacinthella leucophaea* (C.Koch) Schur.). Європейсько-малоазійський вид, що поширений в Україні в Лісостепу, Степу та в Криму. Рослина зростає на кам'янистих степових ділянках.

Цибулинна багаторічна рослина з 2-3 листками, квіти блідо-голубі, зібрані в китицю. Рослина декоративна, викопується, зникає при добуванні вапняку. Вид відомий з південної частини області: Кам'янець-Подільський район (заказники “Мукшанський”, “Чапля”, “Устянський”), Чемеровецький район (заказник “Івахновецький”), Новоушицький район (заказник “Дністровський”).

Цибуля подільська (*Allium podolicum* (Aschers. et Graebn.) Blocki ex Racib.) - подільсько-причорноморський ендемічний вид. Квітки лілово-рожеві, знаходяться на досить довгих ніжках. Це кальцелюбна рослина, росте на вапнякових скелях. На чисельність цибулі подільської негативно впливають випалювання та добування вапняку. На Хмельниччині зростає на скелястих берегах р. Дністер та приток (заказники “Устянський”, “Мукшанський”, “Наддністрянський”, “Чапля”, “Староушицький”, “Дністровський”, “Глібівський”, “Калюський”) та на товтровій гряді (заказники “Вербецькі Товтри”, “Івахновецький”, “Вільховецький”, пам'ятка природи “Товтра Самовита”) на товтрах Дунаєвецького р-ну біля с. Слобідка Смотрицькі, Смотрич, Яцківці, які не мають природно-заповідного статусу. Культивується в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Китятки сибірські (*Polygala sibirica* L.). Реліктова рослина з центральноєвропейсько-сибірським ареалом. В Україні зустрічається в Лісостепу (Придністров'я), та Лівобережному Степу на вапнякових степових ділянках. Зникає при руйнуванні місцезростання та випалюванні трави. Багатостебла гілляста рослина з блідо-фіолетовими квітами. В Хмельницькій області трапляється в Придністров'ї (заказники “Устянський”, “Мукшанський”, “Наддністрянський”, “Чапля”, “Староушицький”, “Дністровський”, “Глібівський”, “Калюський”)

Ефедра двоколоскова (*Ephedra distachia* L.). Реліктова рослина з євразійським ареалом. В Україні зустрічається в південній частині Лісостепу, в Степу та Криму. Ефедра зростає на вапнякових схилах, осипищах. Вид зникає при залісенні, терасуванні, випалюванні. Багаторічний кущик з своєрідними лусочкоподібними листками та з соковитими червоними лусочками жіночих шишок. На Хмельниччині виявлений в заказниках “Чапля”, “Староушицький” Кам'янець-Подільського району. Старе місцезростання, що наводиться для с. Жванець, не вдається підтвердити.

Шипшина синювата (*Rosa livescens* Bess.) - невеликий прямостоячий кущик заввишки до 45 см. Вид ймовірно є придністровським ендеміком. Зростає на кам'янистих степових схилах. В Хмельницькій області вид виявлений у заказнику “Мукшанський” (Кам'янець-Подільський район).

Шипшина блискуча (*Rosa nitidula* Bess.) - кущ до 2 м заввишки. Ареал точно не з'ясований. В Україні вид трапляється на Поділлі. Ростає на вапнякових схилах в угрупованнях чагарникових степів. Вид відомий на території НПП "Подільські Товтри" (схил р. Дністер біля с.Устя).

Волошка Маршалла (*Centaurea marchalliana* Spreng.). Приземкувата рослина прикореневою розеткою сизуватих листків та малиновими квітами. В Україні зустрічається в Степу та на півдні Лісостепу, де зростає в степових угрупованнях, на вапнякових відслоненнях. На Хмельниччині вид виявлено на Товтрах, на схилах долин Дністра та його приток у Кам'янець-Подільському районі (заказники "Вербицькі Товтри", "Чапля", "Нігинська товтра", "Наддністрянський", "Устянський", "Мукшанський", пам'ятка природи "Китайгородське відслонення", біля с. Шустівці), в Чемеровецькому районі (пам'ятка природи "Товтра Самовита", заказники "Сокіл", "Вільховецький", біля сс. Залуччя, Черче), в Дунаєвецькому районі (біля смт. Смотрич, сс. Яцківці, Блищанівка), в Новоушицькому районі (заказники "Дністровський", "Данилевський", "Калюський").

Волошка східна (*Centaurea orientalis* L.). Євразійський вид, який в Хмельницькій області знаходиться на західній межі ареалу. Досить висока рослина з жовтими квітами. Зростає в степових угрупованнях на вапнякових схилах. На Хмельниччині волошка східна відома з території НПП "Подільські Товтри" (схили р. Дністер біля с. Устя та заказник "Нігинський").

Кадило сарматське (*Melittis sarmatica* Klok.) - вид з родини губоцвітих. Лісостепу, поширений в Центральній Європі. Пелюстки білуваті, з темноружевою плямкою на нижній губі. Зростає в дубово-грабових, букових лісах. На Хмельниччині вид трапляється майже по всій території, зокрема, відмічений в заказниках "Лазарево", "Совий яр", "На валу" (Кам'янець-Подільський район), "Циківський" (Чемеровецький район), "Сатанівський" (Городоцький район), "Чоботарня" (Летичівський район) в РЛП "Мальованка". Вид зберігається в культурі в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Аконіт строкатий (*Aconitum variegatum* L.). Центральноєвропейський вид, відомий в Україні із Західного Лісостепу. Має сині шоломоподібні квіти. Зростає в дубово-грабових та грабових лісах. На Хмельниччині зустрічається в південних районах (заказники "Панівецька дача", "Кармалюкова гора" Кам'янець-Подільського району, "Данилевський" Новоушицького району). Вид вирощується в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Аконіт куцистий (*Aconitum anthora* L.). Європейський вид, що зустрічається в Україні в лісостеповій зоні. Квіти жовтуватого забарвлення, опушені, утворюють густе гроно. Зростає в широколистяних лісах. В Хмельницькій області росте в Кам'янець-Подільському районі в заказнику "Чапля" та в

пам'ятці природи "Товтра Самовита" Чемеровецького району. Вид вирощуються в Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

НПП “Подільські Товтри”

НПП “Подільські Товтри” створений за указом Президента України N 474/96 від 27 червня 1996 року на основі природоохоронних об’єктів різного рангу та унікальних історико-культурних комплексів Поділля, зокрема, Товтрового горбогірного кряжу й Кам’янецького каньйонового Придністров’я. Загальна площа становить 261316 га, з яких 3081,5 га надані парку в постійне користування. Парк розташований на території трьох адміністративних районів Хмельницької області: він повністю охоплює Кам’янець-Подільський район, більшу частину Чемеровецького району, і невелику частину Городоцького району. Унікальні ландшафти, сформовані в різні геологічні епохи, приваблюють своєю неповторністю. Назва “товтри” пішла від фракійського “тердрос” або латинського “турмур” – край, вістря, а в слов’янських мовах набула звучання “татри”, “товтри”. Інколи товтрову грядку називають “Медобори” (“медубаріс” – між водами) або “Недобір”. Формувалася гряда 25-15 млн. років тому під час існування Тортонського та Сарматського морів з коралових рифів морських водоростей, молюсків. Сьогодні має вигляд невисоких гряд (горбів, товтр), вкритих лісами або степами, а інколи відкритими вапняками, на яких живуть мохи, лишайники, водорості та кальцелюбні вищі судинні рослини. Дністровська каньйонова частина парку складається із каньйонів лівих приток Дністра та каньйону Дністра. Біля 440 млн. років тому тут вирувало Силурійське море, яке залишило після себе вапнякові скелі, стінки із скам’янілими відбитками різних організмів силурійського періоду (брахіоподи, остракоди, трилобіти, корали та водорості - рабдопарелла, гірванелла). Мандруючи по Придністров’ю можна побачити відкриті прямовисні стінки з відбитками або незначні уступи-терраси на яких оселилися як рослини древніх епох, наприклад пліоценовий релікт – шивереція подільська, так і ендеміки – мінуарція дністровська, цибуля подільська, шавлія кременецька. Ріки, перетинаючи Товтрову грядку, утворюють чудернацькі петлі, а кам’яністі скелі під впливом ерозійних процесів впродовж тисячоліть створили різні кам’яні “примари” – голови велетнів, чортові пальці та гроти і печери.

Важливою особливістю території парку є високий рівень ландшафтно-геоморфологічної репрезентативності щодо регіону Поділля загалом, що зумовлено, перш за все, великими розмірами, а також - значним рівнем різноманітності геоморфологічної структури. Це сприяло формуванню високого рівня біорізноманітності.

Загальна площа парку (261316,0 га) розподіляється за основними типами використання таким чином: сільськогосподарські землі становлять 148048,8 га (56,6%), з них на рілля припадає 130264,4 га (49,8%), багаторічні насадження 4628,7 га (1,8%), сіножаті 7028,4 га (2,7%), пасовища 6127,3 га (5,1%); заповідні й рекреаційні території (сюди належить частина лісових, степових та лучних ділянок) - 13229,5 га (5,1%).

Панівне значення в природному рослинному покриві парку мають ліси з переважанням дуба звичайного і граба звичайного, ясена високого. На межі

ареалу зростає бук лісовий, значний масив якого знаходиться в північно-західній частині парку (Сатанівська дача). Також на території парку є штучні насадження деревних порід, зокрема тих, які є чужими аборигенній флорі (робінія (біла акація), сосна звичайна, сосна чорна, сосна кримська).

З трав'яної рослинності найбільші площі займають степові й лучно-степові угруповання з домінуванням осоки низької, костриці валійської, ковили волосистої, ковили найкрасивішої, наскельні степи з домінуванням тонконогу різнобарвного тощо. На території парку трапляються своєрідні скельні угруповання за участю очитка їдконого, аспленія мурового.

Інші типи рослинності, зокрема, водна, прибережно-водна, болотна представлені на порівняно незначних площах. Переважають угруповання з домінуванням з домінуванням елодеї канадської, ряски малої, рогозів широколистого та вузьколистого, очерету звичайного.

Флора парку відзначається високим рівнем таксономічної різноманітності. За час існування парку були проведені додаткові дослідження, критично проаналізовано гербарні фонди, зібрано значний обсяг оригінальних гербарних матеріалів. За останніми даними авторів список флори парку налічує 1543 види судинних рослин, що належать до 676 родів зі 124 родин.

Важливою особливістю флори парку, як і загалом флори Поділля, є наявність великої кількості граничноареальних, реліктових, ендемічних і субендемічних видів.

Інтенсивна господарська діяльність упродовж багатьох століть, а особливо, другої половини XX століття зумовила значне порушення стану популяцій багатьох з них, і, навіть, зникнення видів з флори регіону. Цьому процесу сприяло заповнення Дністровського водосховища, внаслідок чого були зруйновані унікальні екотопи нижньої частини стінок каньйону Дністра, складені силурійськими і девонськими відкладами, а також екотопи прибережних алювіальних наносів, до яких були приурочені види, які нині відсутні в регіоні.

За різними даними для території, яка нині належить до національного парку, різними авторами наводилося 64 види судинних рослин, що включені до Червоної книги України (1996), але підтверджено знаходження 49 видів. Це аконіт Бессера, астрагал монпельйський, астранція велика, беладонна звичайна, бруслина капликова, булатки великокріткова, довголиста і червона, гніздівка звичайна, зіноваті Блоцького і Пачоського, змієголоівник австрійський, зозулинець салеповий, зозулинні сльози яйцелисті, зозулинні черевички справжні, клокичка периста, ковили волосиста, пірчаста та Граффа (ковила найкрасивіша), коральковець тричінадріаний, коручки темночервона, чемерникова і пурпурова, лещиця дністровська, лілія лісова, лунарія оживаюча, любки дволисті та зеленокріткова, пальчатокорінники м'ясочервоний і травневий, підсніжник білосніжний, плавун щитolistий, рябчик гірський, скополія карніолійська, сон великий, сон чорніючий, тонконіг різнобарвний, фіалка біла, цибуля ведмежа, цибуля коса, цибуля

переодягнена, цибуля пряма, чина ряба, шавлія кременецька, шафран Гейфеля, шиверекія подільська, шоломниця весняна, ясенець білий.

До Червоного списку МСОП занесено цибулю перевдягнену, зіновать Блоцького, зіновать Пачоського, зіновать подільську, шавлію кременецьку, шиверекію подільську, відкашник осотовидний.

До Європейського Червоного списку включено зіновать Блоцького, зіновать подільську, шавлію кременецьку, шиверекію подільську, відкашник осотовидний.

До Додатку I Бернської конвенції занесено зозулині черевички справжні, змієголовник австрійський, рябчик гірський, сон великий, шиверекію подільську.

Як типові лісові угруповання, що підлягають охороні, до Зеленої книги України включені: грабово-дубові ліси волосистоосокові та яглицеві, дубові ліси татарськокленові та дубові ліси ліщинові. Як рідкісні до Зеленої книги України включені такі лісові угруповання, виявлені на території парку: скельнодубові ліси кизиліві, звичайнодубові ліси кизиліві, звичайнодубові ліси свидиново-гірськоосокові та свидиново-парвськоосокові, грабово-дубові ліси плющеві та підмаренниково-плющеві, широколистяні дубові ліси ведмежоцибулеві.

Серед степових угруповань парку до Зеленої книги занесені формації мигдалю степового, ковили волосистої, ковили найкрасивішої, ковили пірчастої, тонконогу різнобарвного, осоки низької, сеслерії Хейфлерової, серед водних - формації глечиків жовтих, плавуна щитолистого.

В межах парку знаходиться 129 природоохоронних об'єктів, зокрема, 15 - заказників загальнодержавного значення, 4 - пам'яток природи загальнодержавного значення, 1 - ботанічний сад, 17 - заказників місцевого значення 3 - парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, 88 - пам'яток природи місцевого значення, 1 - заповідне урочище.

Охоронні об'єкти, що мають степові території, можуть значно відрізнятися один від одного як різними угрупованнями так і видовим складом. Заказники “Самовита”, “Вербицькі Товтри”, , “Нігинська Товтра”, “Іванковецький”, “Вільховецький”, “Устянський”, “Мукшанський” вкриті переважно угрупованнями за участю осоки низької, костриці валійської. “Наддністрянський”, “Староушицький” сформовані на степових ділянках, які засаджені частково інтродукованими видами, тому тут є лише залишки степової флори за участю ковили волосистої, ковили пірчастої, сеслерії Хейфлерової. Унікальними є пам'ятки природи, зокрема “Смотрицький каньйон” , який утворює прямовисні стінки над руслом р. Смотрич, а також “Китайгородське відслонення”, яке є одним із еталонів силурійських розрізів. Тут на скелях зростають реліктові (шиверекія подільська) та ендемічні (цибуля подільська) види.

На території парку багато цінних історико-культурних об'єктів: Бакотський печерний монастир, Кам'янець-Подільська фортеця (XI—XII ст.), Домініканський (XIV ст.), Францисканський (XIV ст.) монастирі та ін.

Площа заповідної зони парку становить 1603,8 га, зони регульованої рекреації – 11452,2 га, зони стаціонарної рекреації – 173,5 га. Господарська

зона займає 248086,5 га (94,9% площі парку), у т.ч. на землях у постійному користуванні парку – 77,5 га.

Важливими завданнями парку є організація й ведення моніторингу тенденцій рослинного покриву території, перш за все – степового типу рослинності, зокрема у випадках, коли функціонування було порушене внаслідок необґрунтованих господарських, зокрема створення лісових культур з агресивних інтродуцентів. Необхідним є обґрунтування заходів, спрямованих на їх поступову ліквідацію і відновлення нормального екологічного режиму степових та лісових угруповань.

Кам'янець-Подільський ботанічний сад

Неповторною перлиною Хмельниччини є Кам'янець-Подільський державний ботанічний сад - природно-заповідний об'єкт загальнодержавного значення з 1963 року. Заснований в жовтні 1930 р. як Кам'янець-Подільський ботанічний сад. Ботанічний сад знаходиться в південній частині м. Кам'янця-Подільського і займає пл. 17,5 га. (дендропарк - 11,0 га, експозиційно-наукова зона - 6,9 га). Ботанічний сад знаходиться у підпорядкуванні Подільського аграрного університету. В колекціях ботанічного саду утримується 386 видів тропічних та субтропічних видів, з яких до Європейського Червоного списку віднесено 2 види, 581 видів, форм і сортів дерев та кущів, з яких 6 видів із Червоної книги України, 192 види і сорти квітково-декоративних рослин. В колекції рідкісних рослин із 44 видів - 20 червонокнижних (лунарія оживаюча, цибуля ведмежа, цибуля коса, ковила волосиста та ін.) і 3 види з Європейського Червоного списку (зіновать Блоцького, шавлія кременецька, шивереція подільська). В ботанічному саду зустрічаються рідкісні представники орнітофауни (4 види з Європейського червоного списку та 2 види з Червоної книги України). Рано навесні в саду розкриваються білосніжні порцелянові квіти магнолії кобус, золотяться форзиція, золотий дощ, тюльпан дібровний, синім, фіолетовим, яскравочервоним цвітом квітують проліски, шафран Гейфеля, гіацинти, тюльпани, півники, півонії, влітку - різнобарв'я жоржин, канн, осінь вабить барвичками айстр, чорнобривців. В оранжереях та теплицях плодоносять монстера та банани, квітують кактуси, агави та алоє, навколо смарагд папоротей, араукарій, казуар, нолін та інших екзотів з далеких країв. Працівники бот саду та студенти займаються інтродукцією рослин, збереженням та відтворенням фітогенофонду місцевої та світової флори.

“Велика і Мала Бугаїха”

Неподалік від р. Збруч оточені полями стоять дві товтри – Велика і Мала Бугаїхи. Тут створено ландшафтний заказник загальнодержавного значення

“Велика і Мала Бугаїха” пдлщею 66 га. Велика Бугаїха є найвищою на Хмельниччині і досягає 409 м над рівнем моря. Слово "бугаїха" ("богаїха") походить від слова "бог". Товтри вкриті грабовим, грабово-дубовим та грабово-ясеновим лісом. В деяких місцях у лісі багато плюща. На скелях можна побачити папороті - багатоніжку звичайну, аспленій муровий та аспленій волосовидний. Серед видів з Червоної книги України в заказнику виявлені скополія карніолійська, підсніжник білосніжний, цибуля ведмежа, булатка великоквіткова, коручка чемерникова.

“Циківський”

Заказник знаходиться в Чемеровецькому районі неподалік села Цикова, від якого і отримав свою назву. Значний лісовий масив вирізняється дубово-грабовими угрупованнями в яких навесні ефемероїди (анемони дібровна і жовтецева, рясти порожнистий, ущільнений та проміжний, підсніжник звичайний, проліска весняна, зірочки жовті) суцільним килимом вкривають землю. В окремих куточках можна знайти орхідні – булатку велико квіткову, коручки пурпурову та чемерникову, любки дволисту та зеленоквіткову. Плющ місцями цвіте і плодоносить, це рідкісне явище для нашого регіону. Також у лісі зростає реліктовий вид – лунарія оживаюча, яка прикрашає своїм рожевим цвітом квітневий ліс, а влітку цвіте лілія лісова. В заказнику багато грибів - трапляються боровики, підосичники, зонтики, польський гриб, сиріжки, опеньки. Оскільки заказник розташований неподалік від сіл, тут помітний негативний антропогенний вплив, на його території інколи випасають тварин, викопують та зривають первоцвіти.

“Сокіл”

Ландшафтний заказник "Сокіл" площею 55 га також знаходиться біля с.Цикова. Товтра, яка увійшла до складу заказника, найвища з-поміж сусідніх скель, тому й назвали іменем гордого птаха. Частина гори вкрита лісом з переважанням дуба звичайного, кленів, граба, ясена і липи серцелистої. В підліску багато ліщини, кизилу та гордовини. Із червонокнижних видів у лісі трапляються гніздівка звичайна, булатка великоквіткова, любка дволиста, коручка чемерникова, підсніжник білосніжний. Є скелі та степові ділянки, на яких серед кущів терену та шипшини ростуть ковила волосиста, сон чорніючий, горицвіт весняний. На кам'янистих кручах ростуть цибуля подільська, очиток їдкий, молодило руське, аспленій муровий.

“Іванковецький”

Неподалік с. Іванківці Городоцького району та р. Збруч знаходиться ландшафтний заказник “Іванковецький” площею 1014,5. В заказнику переважає лісова рослинність. В деревостані переважають дуб звичайний, граб та бук. Місцями зберегдися вікові дерева бука. Вони є залишками тих давніх природних букових лісів, що знаходяться тут на східній межі свого ареалу. Їх, нажаль, обмаль, тому що люди своєчасно не подбали про

збереження цих красенів. Та зараз вже є досить значної площі лісові культури бука. В трав'яному ярусі лісових угруповань домінують зеленчук, яглиця, навесні - анемони дібровна і жовтецева, рясти, рівноплідник рутвицелистий. Із видів рослин, занесених до Червоної книги України, у цьому заказнику зустрічаються підсніжник звичайний, булатка великоквіткова, гніздівка звичайна, коручки пурпурова та чемерникова, любка зеленоквіткова, зозулині слъози яйцевидні, молочай волинський. Червонокнижні цибуля ведмежа та скополія карніолійська інколи домінують у трав'яному покриві лісів.

“Івахновецький”

Заказник розташований біля с. Івахнівці Чемеровецького району і має площу 155 га. До нього входять товтри “Коломийка” , “Рублиха”, “Середня” , “Панська”, “Неможна”, “Баба”, “Ян” , “Високі камені” (“Божа”) , “Соколиха”. На цих товтрах переважає степова рослинність, багато скель. Тут зростають степові та кальцепетрофітні види рослин, серед яких горицвіт весняний, цибуля подільська, молодило руське, гіацинтик блідий, мінуарція дністровська. Із видів, занесених до Червоної книги України, тут є лещиця дністровська, зіновать біла, ковила волосиста, сон чорніючий

“Кармалюкова гора”

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Кармалюкова гора" площею 765 га знаходиться в Кам'янець-Подільському районі. Назва пов'язана з ім'ям легендарного подільського героя – Кармелюка, який разом із своїми друзями мав схованку у печері на верхівці гори. Товтра вкрита типовим дубово-грабовим лісом подільського типу, в якому виявлені занесені до Червоної книги України підсніжник звичайний, лілія лісова, любка дволиста, булатка великоквіткова, коручка чемерникова, а також види, які охороняються у Хмельницькій області - аконіт строкатий, вовчі ягоди звичайні.

“Совий яр”

Ландшафтний заказник "Совий яр" площею 827 га знаходиться в Кам'янець-Подільському районі. Назва заказника походить від назви урочища в якому колись водилося багато сов. На крутосхилах Товтр вздовж р. Студениця розкинулися дубово-грабові ліси в комплексі з чагарниковим степом та кам'янистими відслоненнями. В лісах, крім граба і дуба звичайного, подекуди значна участь ясена, липи серцелистої, кленів гостролистого і польового. У “Совому яру” є невеличка популяція зозулиних черевичків звичайних, яка щорічно милує своїми неповторними квітами, що нагадують пантофлі міфічної богині Кіпріди. Із інших видів рослин, занесених до Червоної книги України, в лісі зростають аконіт Бессера, булатка

великоквіткова, коручка чемерникова, любка дволиста, підсніжник звичайний. Навесні степові пагорби вкриваються фіолетовими квітами соню великого та соню чорніючого, золотистими голівками горицвіту весняного. В квітні білопінним цвітом квітують терен та глоди. Влітку Совий яр манить прохолодою. Люди дуже люблять цю місцину, але, нажаль, вона страждає від самовільних рубок та знищення первоцвітів.

“Карабчіївський”

Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Карабчіївський" знаходиться в Городоцькому райліні неподалік с. Великий Карабчіїв. Його площа 111 га. Переважаюча у заказнику рослинність - широколистяний ліс з домінуванням дуба звичайного, граба звичайного і домішкою липи серцелистої, клена гостролистого. Із видів, занесених до Червоної книги України, у лісі заказника виявлені булатка великоквіткова, лілія лісова, коручка чемерникова, любка дволиста, любка зеленоквіткова, цибуля ведмежа, на відкритих місцях трапляється зіновать біла.

“Княжпільський”

Княжпільський ботанічний заказник загальнодержавного значення знаходиться у Кам'янець-Подільському районі неподалік с. Княжпіль на високій товтрі, підніжжя якої омивається р. Тернавою. Тут зростають угруповання дуба звичайного та дуба скельного за участю граба звичайного, липи серцелистої, ясена високого. В підліску значна кількість гордовини, ліщини, бруслин європейської та бородавчастої. В трав'яному покриві переважають зеленчук, яглиця, а навесні - анемони жовтецева та дібровна, ряст порожнистий. Тут збереглося кілька 120 річних дерев бука лісового, які є залишками бучини. Із видів, занесених до Червоної книги України, трапляються лілія лісова, коручка пурпурова. На каменях ростуть папороті - аспленії волосовидний та муровий, листовик сколопендровий, який є рідкісним у Хмельницькій області видом. Понад річкою росте вільха чорна, утворює зарості кремена гібридна. Заказник розташований поряд із рекреаційною зоною урочища Недобір, це має негативний вплив на природні комплекси заказника.

"Сатанівський".

Лісовий заказник загальнодержавного значення “Сатанівський” заказник отримав назву від селища Сатанів, яке розташоване неподалік. Площа заказника 1778 га. Він відомий насаперед найбільшим в області масивом букового лісу. Є у заказнику ділянки грабово-дубових та грабово-ясенових лісів. Із червонокнижних видів рослин тут є булатка великоквіткова, коручка чемерникова, любка зеленоквіткова, беладонна, лілія лісова, цибуля ведмежа. Заказник прилягає до рекреаційної зони сатанівських курортів, що негативно впливає на його природний стан.

“Чапля”

В ботанічному заказнику "Чапля" поєднуються лісові, степові та петрофітні угруповання. Розташований він над устям р. Тернава та на лівому березі р. Дністер біля с. Демшин у Кам'янець-Подільському районі. Площа - 177 га. Назва його обумовлена тим, що тут селиться багато сірих чапель. В лісі зростають дуб звичайний та дуб скельний, берека, у підліску - гордовина та клокичка периста. Весною квітують ефемероїди (підсніжник, проліска, рясти). Тут знайдено три види аконіта - строкатий, шерстистовустий та несправжньопротитруйний. Із видів з Червоної книги України в лісі трапляються булатка великоквіткова, коручка чемерникова, коручка пурпурова. На затінених відслоненнях вапняків зростає листовик сколопендровий. Тут одне із небагатьох місць зростання реліктового виду - осоки білої. Степові схили з ранньої весни вкриваються цвітом сону великого та сону чорніючого, горицвіту весняного, гіацинтка блілого. Збереглася тут популяція ефедри двоколоскової, утворюють куртини зіновать біла, зіновать Блоцького. На схилах срібляться ковили пірчаста, найкрасивіша і волосиста.

“Товтра Вербецька”

Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Товтра Вербецька" знаходиться в біля с.Гуменці в Кам'янець-Подільському районі. Площа його невелика - 9,3 га. Територія являє собою мальовничі гостроверхі горби, які витягнулися перпендикулярно до основної Товтрової гряди. Переважає у заказнику степова рослинність. Домінують реліктові осока низька, сеслерія Хейфлерова і занесена до Червоної книги ковила волосиста. Поміж ними зростають сон чорніючий, ендемічна рослина лещиця дністровська, горицвіт весняний, анемона лісова, волошка Маршалла, ломиніс цілолистий. Незначні ділянки зайняті кущами, такими як спіреї середня та піківська, кизильник цілокрайї. На вапнякових валунах ростуть цибулі подільська, гірська, жовтувата, вероніки сиза та гірська, очиток їдкий, молодило руське. Скелі вкриті лишайниками (гіпногімнія трубчаста, калоплака фліктіс, саркогіне правильна, білібія піщана) та мохами (псевдолескіелла жилкувата, хомалотеціум жовтий).

“Панівецька дача”

Цей ботанічний заказник площею 923 га знаходиться біля м.Кам'янець-Подільський, на південь від нього. Він розташований вздовж р. Смотрич, яка обмежує заказник зі сходу. Рослинність заказника - це в основному грабово-дубовий ліс. В деревостані наявні ясен звичайний, липа серцелиста, клени гостролистий, польовий і рідше - несправжньолатановий. В трав'яному ярусі влітку домінують зеленчук, яглиця. Серед чагарників часто трапляються бруслини європейська і бородавчаста, гордовина, свидина, ліщина. Серед весняних ефемероїдів найбільш численними є анемона жовтецева, рясти порожнистий і ущільнений. Звичайними є рівноплідник рутвицелистий, зірочки жовті, підсніжник. На південних схилах поширені грабово-дубові ліси конвалієві та волосистоосокові, в яких багато кизилу. На

цих ділянках концентруються й теплолюбні південні трав'яні види - осока парвська, перлівка ряба, шоломниця висока, а також маруна щиткова, чина чорна. Територію заказника перетинає дві долинки із струмками. На їх днищі поширені лісові угруповання з домінуванням яглиці, для яких характерні герань темна, аконіти строкатий та шерстистовустий. Є й більш зволожені місця з таким видами, як слабник водяний, жовтяниця черговолиста, калужниця болотна. Трапляються у заказнику лісові скелі, де є такі види, як пухирник ламкий, асплений волосовидний. Із видів, занесених до Червоної книги України, у заказнику зростають булатка великоквіткова, любки зеленоквіткова і дволиста, зозулині сльози яйцевидні, гніздівка звичайна, коручки чемерникова і пурпурова, скополія карніолійська. Мешканці м. Кам'янця-Подільського та навколишніх сіл люблять відпочити у цьому лісі, що, на жаль, призводить до порушення лісу, особливо його північної частини, яка знаходиться близько від міста.

“Китайгородське відслонення”

Ця геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення знаходиться біля с.Китайгород Кам'янець-Подільського району і має площу 60 га. Тут охороняється еталонне відслонення силурійських відкладів, де представлені всі геологічні яруси цього періоду. На його крутосхилах сформувалися угруповання ковили волосистої, сеслерії Хейфлерової, осоки низької. На кам'янистих осипах зростають шиверекія подільська, сон чорніючий, цибуля подільська, наперстянка великоквіткова, залізняк колючий, вероніка сиза. На верхній частині відслонення є **давній монастир**. З його аптекарського городу у природні угруповання "перекочував" гісоп лікарський. Мальовничість цієї пам'ятки вабить туристів.

“Смотрицький каньйон”

Пам'ятка природи "Смотрицький каньйон" площею 80 га знаходиться в долині р.Смотрич на ділянці між сс. Голосків і Цибулів Кам'янець-Подільського району. Схили долини вертикальні, скелясті. На карнизах і скелях оселилися сон великий, сон чорніючий, шиверекія подільська, ковили волосиста і пірчаста, сеслерія Хейфлерова, осока низька, зіноваті біла та Блоцького, леопольдія тонколиста, півники угорські. Ясенець білий. У залісеній частині - підсніжник звичайний, кизил справжній. Скелі вкриті різнобарвними лишайниками (лецідея каменярна, біатора чорно-зелена, кладонія кубкова, калоплака оранжева).

- .Ковальчук С.І.,Задорожний М.А. Пам'ятки природи Хмельниччини.Львів: Каменяр.-1985.-С.56.
- Круцкевич М.М. Доповнення до флори Кам'яниччини // Журн. Ін-ту ботан. АН УРСР . –1937.- 11 ,(N19). – С. 137.
- .Круцкевич М.М. Рослинність безлісних схилів Подільських Товтр. // Матер.наук.конф.по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля.-Львів:Вид-во Львів.ун-ту.-1967.-Вип.-2.-С.13-18.
- .Кузнецова Г.А. Флора и растительность Среднего Приднестровья и возможности использования их в народном хозяйстве.-Автореф.дисс. канд.биол.наук.-К.:1954.-С.18.
- Куковиця Г.С.Рідкісні та реліктові види Подільського Придністров'я.//Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів УРСР.-К.:Наук.думка.-1970.-С.31-32.
- .Любинская Л.Г. Аутофитосозология флоры Каменецкого Приднестровья и сохранение фитогенофонда путем первичной интродукции.-Автореф.дисс. канд.биол.наук.К.,1990.-С.-16.
- .Михальский А. О геологической природе холмистой гряды Толтр в Подолии.// Изв.Геол.Комитета.-1985.-14.
- .Мороз И.И. Флора Толтрового кряжа и возможности использования ее в народном хозяйстве и для интродукции.-Автореф.дисс.канд.биол.наук.-К.-1970.-С.24.

Література

Ботанічний сад 1930-200 . Буклет.- 2000. - 2 с.

Любінська Л.Г. Пономаренко Т.М. Особливості відтворення раритетних видів НПП “Подільські Товтри”. //Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття .Гримайлів, 2002. – С. 63-64. 2