



Leia com atenção

- Justifique todas as suas respostas, indicando os cálculos efetuados e/ou os conceitos teóricos utilizados.
- Não pode ter consigo telemóvel nem qualquer dispositivo eletrónico (ainda que desligado).
- Esta prova é constituída por **9 questões**.

1. **(35 pts)** Seja  $f$  a função dada por

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{2 \arcsen(1-x)}{3}$$

- Represente o domínio de  $f$  sob a forma de intervalo de números reais.
- Caracterize a função inversa de  $f$  (indique expressão analítica e domínio).
- Calcule  $\sin(f(2))$ .

2. **(20 pts)** Seja  $f$  a função real de variável real definida por

$$f(x) = e^{x^2-1} - 1.$$

- Mostre que no intervalo  $[-1, 1]$  se verificam as condições de aplicação do Teorema de Rolle.
- Calcule o único ponto  $c \in ]-1, 1[$  em que a derivada da função  $f$  se anula.

3. **(40 pts)** Considere a função  $f(x) = \frac{1}{x(x+2)}$ .

- Determine a família de primitivas  $\int f(x) dx$ .
- Determine a natureza do integral impróprio  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ .
- Mostre que o integral impróprio  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  e a série  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  com  $a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}$  têm a mesma natureza.
- Determine, caso exista, a soma da série dada na alínea anterior.

4. **(20 pts)** Determine a primitiva  $F$  da função definida por  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4x-x^2}}$ , que satisfaz a condição  $F(1) = \pi$ .

**Sugestão:** Use a mudança de variável  $x = 2 + 2 \sin t$ .

5. **(25 pts)** Estude a natureza das seguintes séries, indicando quais são absolutamente convergentes, quais são simplesmente convergentes e quais são divergentes:

(a)  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$ .      (b)  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ .

6. **(20 pts)** Considere a série numérica  $\sum_{n=1}^{+\infty} 3^{-5n+1}$ .

- (a) Indique o seu termo geral.
- (b) A série satisfaz a condição necessária de convergência? Justifique.
- (c) Determine a expressão do termo geral da sucessão das somas parciais.
- (d) A série converge? Em caso afirmativo determine a sua soma.

7. **(20 pts)** Considere a função  $F$  definida em  $\mathbb{R}$  por  $F(x) = \int_1^{e^{x^2}} \frac{(\ln t) \ln(1+t)}{t} dt$ .

- (a) Justifique que  $F$  é derivável em  $\mathbb{R}$  e mostre que

$$F'(x) = 2x^3 \ln(1 + e^{x^2}).$$

- (b) Estude  $F$  quanto à monotonia (indicando intervalos de monotonia, caso existam) e existência de extremos locais (indique os pontos extremantes, caso existam).

8. **(20 pts)** Calcule a área do domínio limitado pelas representações gráficas das funções

$$y = e^{2x} \quad \text{e} \quad y = e^{-(x+1)}$$

e pelo eixo dos  $yy$ .

9. **(20 pts)** Considere a função definida em  $\mathbb{R}$  por  $f(x) = e^{-3|x-1|}$ .

- (a) Determine  $\int_{-1}^2 f(x) dx$ .

- (b) Determine o valor de  $\beta \in \mathbb{R}$  de modo que  $\int_{-\infty}^{+\infty} \beta f(x) dx = 2$ .

**FIM**

## Uma ajuda

$x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$ND$

$$\sec u = \frac{1}{\cos u}; \quad \operatorname{cosec} u = \frac{1}{\sin u}; \quad \cotg u = \frac{\cos u}{\sin u}$$

$$\cos^2 u = \frac{1 + \cos(2u)}{2}; \quad \sin^2 u = \frac{1 - \cos(2u)}{2};$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 u = \sec^2 u; \quad 1 + \cotg^2 u = \operatorname{cosec}^2 u$$

$$\sin(u + v) = \sin u \cos v + \sin v \cos u$$

$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$$

$$\sin u \sin v = \frac{1}{2}(\cos(u - v) - \cos(u + v))$$

$$\cos u \cos v = \frac{1}{2}(\cos(u - v) + \cos(u + v))$$

$$\sin u \cos v = \frac{1}{2}(\sin(u - v) + \sin(u + v))$$

$(e^u)' = u' e^u$	$(\ln  u )' = \frac{u'}{u}$	$(u^r)' = r u^{r-1} u'$
$(a^u)' = a^u \ln a u' (a > 0 \text{ e } a \neq 1)$	$(\log_a  u )' = \frac{u'}{u \ln a} (a > 0 \text{ e } a \neq 1)$	$(\sin u)' = u' \cos u$
$(\cos u)' = -u' \sin u$	$(\operatorname{tg} u)' = u' \sec^2 u$	$(\cotg u)' = -u' \operatorname{cosec}^2 u$
$(\sec u)' = \sec u \operatorname{tg} u u'$	$(\operatorname{cosec} u)' = -\operatorname{cosec} u \cotg u u'$	$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}$
$(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}$	$(\operatorname{arctg} u)' = \frac{u'}{1 + u^2}$	$(\operatorname{arccotg} u)' = -\frac{u'}{1 + u^2}$

$$P(u' \sec u) = \ln |\sec u + \operatorname{tg} u| \quad P(u' \operatorname{cosec} u) = -\ln |\operatorname{cosec} u + \cotg u|$$

P - primitiva