

具有非线性梯度项的抛物型方程爆破问题研究笔记

——基于张正策教授专题报告的深度拓展与数学推导

讲座日期：2026 年 7 月 14 日

目录

1	导论：拟线性抛物型方程与爆破问题	2
1.1	研究背景与方程形式	2
1.2	非线性模型的生物与物理学渊源	2
2	核心概念：L^∞ 爆破与梯度爆破	3
2.1	L^∞ 爆破	3
2.2	梯度爆破 (Gradient Blowup)	3
2.2.1	黏性 Hamilton-Jacobi 方程与 KPZ 方程背景	3
2.3	非自相似爆破速率的物理直观与代数刻画	4
3	弱解的局部存在唯一性与正则化逼近	4
3.1	弱解的严格定义	4
3.2	局部存在性的证明：正则化逼近法 (Regularization)	5
4	全局存在性与 L^∞ 爆破分类理论	5
4.1	爆破与全局存在性的分类图示	5
4.2	全局存在性的证明：上解的构造方法	5
5	爆破时间下界的微分不等式证明	6
5.1	定理描述	6
5.2	严格推导过程	6
6	总结与学术启发	7

1 导论：拟线性抛物型方程与爆破问题

1.1 研究背景与方程形式

在超导理论、非牛顿流体动力学以及种群演化模型中，一类带有 p -Laplace 算子的非线性演化方程扮演着核心角色。本笔记探讨张正策教授报告中核心研究的抛物型初边值问题：

$$\begin{cases} u_t - \Delta_p u = u^q - \mu u^r |\nabla u|^\delta, & x \in \Omega, t > 0, \\ u(x, t) = 0, & x \in \partial\Omega, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x) \geq 0, & x \in \Omega, \end{cases} \quad (1.1)$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ ($N \geq 1$) 是具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界域。常数满足 $p > 2$, $q, r, \delta \geq 1$, 且捕食控制系数 $\mu > 0$ 。

算子 $\Delta_p u$ 为经典的 p -Laplacian 算子：

$$\Delta_p u = \operatorname{div} (|\nabla u|^{p-2} \nabla u) \quad (1.2)$$

该算子相比于经典的热传导算子 ($p = 2$ 时的 Laplacian Δ) 具有更复杂的非线性结构。

- **退化性**：当 $p > 2$ 时，在空间中 $\nabla u = 0$ 的点上，算子的等效扩散系数 $|\nabla u|^{p-2}$ 退化为 0。解在这些点附近的扩散速度极慢，会出现特征线交织或自由边界现象。
- **非线性梯度吸收项**：右端的 $-\mu u^r |\nabla u|^\delta$ 具有负号，在物理上代表阻尼或吸收项 (absorption term)，它与促进解增长的非线性源项 u^q (source term) 形成直接的竞争关系。

1.2 非线性模型的生物与物理学渊源

方程 (1.1) 的物理和生物动力学背景在讲座中得到了深刻的阐释，主要包括以下三个发展阶段：

1. **Chipot-Weissler 阻尼模型** ($p = 2, r = 0$)：Chipot 和 Weissler (1989) 引入了以下模型，旨在探索阻尼项 $|\nabla u|^\delta$ 对非线性热源项 u^q 的竞争机制：

$$u_t - \Delta u = u^q - \mu |\nabla u|^\delta$$

这奠定了非线性梯度项研究的数学框架。

2. **Souplet 种群动力学天敌捕食模型** ($p = 2, r = 0, q > 1$)：Philippe Souplet (1996) 提出了种群动力学模型，其中 $u(x, t)$ 刻画某种生物的种群密度。 u^q 代表物种的繁衍出生率，而天敌捕食导致的死亡通量与物种密度的梯度成正比（根据 Fick 定律）。当天敌遇到物种的频率与其运动扩散剧烈度（即 $|\nabla u|$ ）正相关时，种群的减员可表示为 $-\mu |\nabla u|^\delta$ 。
3. **Bartier 改进模型** ($r, \delta \geq 0$)：J. P. Bartier (2006) 进一步修正了上述模型。他认为当天敌进入一片区域，其捕食概率不仅取决于物种的活跃度 $|\nabla u|$ ，还取决于该物种在当地的富集浓度 u 。因此将相遇并捕食的概率修正为 $\mu u^r |\nabla u|^\delta$ 。这引入了浓度与梯度的耦合，显著增加了数学分析的难度。

2 核心概念： L^∞ 爆破与梯度爆破

在偏微分方程演化问题中，若解的存在寿命有限，则在有限时间 T^* 处必将产生数学奇点。根据奇点形成的几何特征，爆破主要分为两大类。

2.1 L^∞ 爆破

定义 2.1 (L^∞ 爆破). 设 $u(x, t)$ 是初边值问题在最大存在时间区间 $[0, T^*)$ 上的经典解。若 $T^* < \infty$ 且满足：

$$\lim_{t \rightarrow T^{*-}} \|u(\cdot, t)\|_{L^\infty(\Omega)} = \infty \quad (2.1)$$

则称解 $u(x, t)$ 在有限时间 T^* 处发生 L^∞ 爆破。

此类爆破源于非线性增长项 u^q 的主导作用。例如经典的无吸收项半线性热方程 $u_t = \Delta u + u^q$ ($q > 1$)，在初值足够大时必定发生 L^∞ 爆破。

2.2 梯度爆破 (Gradient Blowup)

对于某些包含梯度非线性项的方程，即使最大值原理能够约束解本身是有界的，其空间导数依然可能发生发散。

定义 2.2 (梯度爆破). 设 $u(x, t)$ 在 $[0, T^*)$ 上一致有界，即存在常数 $C > 0$ 使得对所有 $t \in [0, T^*)$ 有 $\|u(\cdot, t)\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C$ 。若 $T^* < \infty$ 且满足：

$$\lim_{t \rightarrow T^{*-}} \|\nabla u(\cdot, t)\|_{L^\infty(\Omega)} = \infty \quad (2.2)$$

则称解 $u(x, t)$ 在有限时间 T^* 发生梯度爆破。

2.2.1 黏性 Hamilton-Jacobi 方程与 KPZ 方程背景

梯度爆破最经典的物理模型是 Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) 方程（1986 年提出，用以刻画薄膜生长的物理涨落）的确定性版本——黏性 Hamilton-Jacobi 方程：

$$u_t = \Delta u + |\nabla u|^p \quad (p > 2) \quad (2.3)$$

在齐次 Dirichlet 边界条件下，由最大值原理容易得到：

$$\min_{\Omega} \phi(x) \leq u(x, t) \leq \max_{\Omega} \phi(x)$$

因此解 $u(x, t)$ 始终是有界的。然而，边界处的挤压效应和非线性梯度项的剧烈自激会导致斜率在边界迅速陡峭化。C. Grant (1989) 证明了在 1 维空间中，若边界两端势差足够大，所有解的梯度必将在有限时间在边界发生爆破。

2.3 非自相似爆破速率的物理直观与代数刻画

自相似分析是研究奇点渐近行为的强有力工具。若方程 (2.3) 在 $t \rightarrow T^*$ 时，梯度在零点爆破。若假设其遵循自相似剖面，通过尺度伸缩群：

$$u(x, t) = (T - t)^\alpha w(y, s), \quad y = \frac{x}{\sqrt{T - t}}, \quad s = -\ln(T - t)$$

由于方程在变换下形式不变，要求时间尺度与空间尺度协调，代数计算可得：

$$\alpha = \frac{p - 2}{2(p - 1)}$$

若假设自相似梯度 $|\nabla_y w|$ 有界，则物理梯度满足自相似速率 (Self-similar rate)：

$$|\nabla u(0, t)| \sim (T - t)^{-(\frac{1}{2} - \alpha)} = (T - t)^{-\frac{1}{2(p-1)}} \quad (2.4)$$

然而，大量的严格数学证明和数值模拟表明，真实的边界梯度爆破具有非自相似速率 (Non-self-similar rate)。真实的渐近行为由对流扩散方程的自由边界特征主导，其爆破速率为：

$$\|\nabla u(\cdot, t)\|_{L^\infty} \sim (T - t)^{-\frac{1}{p-2}} \quad (2.5)$$

因为对于 $p > 2$ 的情况，容易验证其代数指数：

$$\frac{1}{p-2} > \frac{1}{2(p-1)}$$

这说明非自相似爆破在接近爆破时刻时，奇点形成的速度远远快于自相似理论的预测，梯度曲线以极高的速率陡峭化。

—

3 弱解的局部存在唯一性与正则化逼近

对于算子 $\Delta_p u$ ，当 $p > 2$ 时，由于算子非线性且可能退化，在经典 C^2 意义下的解往往无法在爆破前一直存在。因此，我们必须在 Sobolev 空间中定义弱解。

3.1 弱解的严格定义

令 $Q_T = \Omega \times (0, T)$ ，并设 $\bar{s} = \max\{p, q, \delta + r\}$ 。

定义 3.1 (弱子/超解). 若函数 $u(x, t) \in C(\bar{\Omega} \times [0, T)) \cap L^{\bar{s}}(0, T; W_0^{1, \bar{s}}(\Omega))$ 满足 $u_t \in L^2(Q_T)$ ，且对任意非负测试函数 $\psi \in C(\bar{Q}_T) \cap L^p(0, T; W_0^{1, p}(\Omega))$ ，有以下不等式成立：

$$\iint_{Q_T} (u_t \psi + |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla \psi) dx dt \leq (\geq) \iint_{Q_T} (u^q - \mu u^r |\nabla u|^\delta) \psi dx dt \quad (3.1)$$

则称 $u(x, t)$ 为方程 (1.1) 的弱子解 (弱超解)。若既是弱子解又是弱超解，则称其为弱解。

3.2 局部存在性的证明：正则化逼近法 (Regularization)

由于算子在 $\nabla u = 0$ 处退化，无法直接套用强抛物方程的经典正则性理论。因此，在分析中构造如下非退化的近似问题（引入小参数 $1/n$ ）：

$$\begin{cases} \partial_t u_n - \operatorname{div} \left((|\nabla u_n|^2 + \frac{1}{n})^{\frac{p-2}{2}} \nabla u_n \right) = u_n^q - \mu \left[(|\nabla u_n|^2 + \frac{1}{n})^{\frac{\delta}{2}} - \frac{1}{n^{\delta/2}} \right] u_n^r, \\ u_n(x, t) = 0, \quad x \in \partial\Omega, \\ u_n(x, 0) = \phi(x) \geq 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

对于每个固定的 $n \in \mathbb{N}$ ，方程 (3.2) 是非退化的拟线性抛物型方程，其等效椭圆型系数矩阵特征值严格大于 0。根据经典拟线性抛物方程的 Schauder 估计和 L-P 理论，光滑局部解 u_n 存在。

接着，通过对逼近解 u_n 建立与 n 无关的先验估计：

- 利用 L^2 能量估计证明 $\|u_n\|_{L^\infty(0,T;L^2(\Omega))}$ 和 $\|\nabla u_n\|_{L^p(Q_T)}$ 的一致有界性。
- 结合极值原理建立经典 Bernstein 型梯度估计。
- 利用 Aubin-Lions 紧致性定理，在限时 T_0 内，取极限 $n \rightarrow \infty$ 证明逼近解收敛到原方程 (1.1) 的弱解。

—

4 全局存在性与 L^∞ 爆破分类理论

方程中增长项 u^q 与阻尼吸收项 $-\mu u^r |\nabla u|^\delta$ 在不同参数组合下展现出极其丰富的动力学相图。以下对三种典型情况进行数学分类：

4.1 爆破与全局存在性的分类图示

通过理论证明与数值模拟，对于模型 $u_t - \Delta_p u = \lambda u^m + \mu |\nabla u|^q$ ，解的生存相图可以分类如下：

表 1: 不同符号与参数组合下的解行为分类表

参数条件与系数符号	数学渐近行为	物理与几何解释
(a) $\lambda > 0, \mu < 0$	只要 $q > m$ 且初值大，梯度爆破	阻尼项转为源项，激发强梯度奇点
(b) $\lambda < 0, \mu > 0$	$m > p - 1$ 且 q 适中时发生 L^∞ 爆破	吸收项压制失效，最大值失控
(c) $\lambda > 0, \mu > 0$	复杂的竞争状态，大初值导致 L^∞ 爆破	经典的增长与吸收竞争

4.2 全局存在性的证明：上解的构造方法

在偏微分方程中，若能构造一个有界的时间无关上解（Super-solution），则由比较原理，真实的演化解将永远被该上解压制，从而实现全局存在。

我们选择构造如下形式的球对称空间函数作为上解：

$$V(x) = \frac{K}{\sigma} |x - x_a|^\sigma \quad \text{其中} \quad \sigma = \frac{p}{p-1} \quad (4.1)$$




图 1: 由理论分析与数值计算勾勒出的参数相图。

通过精细调节常数 $K > 0$ 的大小，使其在整个定义域内满足椭圆不等式：

$$-\Delta_p V \geq V^q - \mu V^r |\nabla V|^\delta$$

由于边界上 $V(x)|_{\partial\Omega} \geq 0 = u(x, t)|_{\partial\Omega}$ ，并且当下限初值 $\phi(x) \leq V(x)$ 时，由弱比较原理 (Lemma 1) 即得对一切 $t > 0$ 有：

$$u(x, t) \leq V(x) \leq C$$

这从理论上严格确保了解的一致有界性与全局存在性。

—

5 爆破时间下界的微分不等式证明

本节针对讲座 PPT 第 43–47 页的定理 8 进行详细的数学还原与推导。在应用偏微分方程时，仅仅知道解会爆破是不够的，我们非常关心爆破发生的最小安全时间 T^* 。通过微分不等式技术 (Differential Inequality Technique)，我们可以给出 T^* 的一个严格下界估计。

5.1 定理描述

定理 5.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 为光滑有界域。设 $p > \max\{2, N/2\}$ ，且非线性参数满足 $q > \max\{p-1, \delta+r\}$ 。定义能量泛函：

$$\chi(t) = \int_{\Omega} u^{\tau b}(x, t) dx \quad \text{其中} \quad b = q - 1 > 0 \quad (5.1)$$

且参数 τ 足够大。则在足够大的初值下，解 $u(x, t)$ 将在有限时间爆破，且爆破时间 T^* 具有如下下界估计：

$$T^* \geq \frac{1}{K} \chi(0)^{-\gamma} \quad (5.2)$$

其中 $\gamma = \frac{p(N\omega+\tau)}{(\rho^2-N)\tau-(N-p)\omega N} > 0$ ，常数 $K > 0$ 仅取决于系统几何与物理参数。

5.2 严格推导过程

为了利用能量方法，我们对方程 (1.1) 两端同乘 $u^{\tau b-1}$ 并进行全域积分：

$$\frac{1}{\tau b} \chi'(t) = \int_{\Omega} u_t u^{\tau b-1} dx = \int_{\Omega} \left(\Delta_p u + u^q - \mu u^r |\nabla u|^\delta \right) u^{\tau b-1} dx \quad (5.3)$$

利用分部积分法（Green 第一公式）处理扩散项，由于零边界条件，边界项消失：

$$\int_{\Omega} (\Delta_p u) u^{\tau b-1} dx = -(\tau b - 1) \int_{\Omega} u^{\tau b-2} |\nabla u|^p dx \quad (5.4)$$

将其代入 (5.3)，并忽略非正的吸收项 $-\mu \int_{\Omega} u^{r+\tau b-1} |\nabla u|^{\delta} dx \leq 0$ ，我们得到基本不等式：

$$\frac{1}{\tau b} \chi'(t) \leq -(\tau b - 1) \int_{\Omega} u^{\tau b-2} |\nabla u|^p dx + \int_{\Omega} u^{q+\tau b-1} dx \quad (5.5)$$

为了将右端的源项转化为扩散项和低阶能量项的代数乘积，我们引入变量代换。令 $v = u^{\frac{\tau b+p-2}{p}}$ ，从而有：

$$|\nabla v|^p = \left(\frac{\tau b + p - 2}{p} \right)^p u^{\tau b-2} |\nabla u|^p \quad (5.6)$$

代入 (5.5) 的第一项，得到：

$$\frac{1}{\tau b} \chi'(t) \leq -C_1 \int_{\Omega} |\nabla v|^p dx + \int_{\Omega} v^{\frac{p(q+\tau b-1)}{\tau b+p-2}} dx \quad (5.7)$$

根据 Sobolev 嵌入定理，由于 $p > N$ ，Sobolev 空间 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 连续嵌入到 $L^s(\Omega)$ 。结合 Nirenberg-Gagliardo 不等式，对于右端的超线性积分项，存在常数 $\theta \in (0, 1)$ ，使得：

$$\|v\|_{L^s} \leq C_2 \|\nabla v\|_{L^p}^{\theta} \|v\|_{L^{\sigma}}^{1-\theta} \quad (5.8)$$

其中 L^{σ} 对应于我们的低阶已知能量范数 $\chi(t)$ 。通过选择合适的代数指数，并利用 Young 不等式消去高阶的梯度项 $C_1 \int_{\Omega} |\nabla v|^p dx$ ，我们可以将 (5.7) 整理为关于 $\chi(t)$ 的闭合—一阶微分不等式：

$$\chi'(t) \leq \tau b \overline{M}_2 \chi(t)^{1+\theta_0} \quad \text{其中} \quad \theta_0 = \frac{p(N\omega + \tau)}{(\rho^2 - N)\tau - (N-p)\omega N} > 0 \quad (5.9)$$

对不等式 (5.9) 采用分离变量法，并在时间区间 $[0, t]$ 上进行积分：

$$\int_{\chi(0)}^{\chi(t)} \chi^{-(1+\theta_0)} d\chi \leq \tau b \overline{M}_2 t \quad (5.10)$$

计算左端积分可得：

$$\frac{1}{\theta_0} \left[\chi(0)^{-\theta_0} - \chi(t)^{-\theta_0} \right] \leq \tau b \overline{M}_2 t \quad (5.11)$$

当解在有限时间 T^* 爆破时，有 $\lim_{t \rightarrow T^*-} \chi(t) = \infty$ ，此时 $\chi(t)^{-\theta_0} \rightarrow 0$ 。令 $t \rightarrow T^*$ ，即得到爆破时间的严格下界：

$$T^* \geq \frac{1}{\theta_0 \tau b \overline{M}_2} \chi(0)^{-\theta_0} \quad (5.12)$$

这完成了定理的严格数学证明。

—

6 总结与学术启发

本笔记深入剖析了拟线性抛物型方程中非线性源项（促进爆破）与非线性梯度吸收项（抑制爆破）之间的深层竞争。通过本次讲座的学习，可以得到以下几点重要的学术启示：

- **数学分析与数值计算的辩证结合：**数值计算不仅能提供直观的图像（如奇点在边界处的演化行为），还能帮助我们猜测正确的渐近速率（例如非自相似速率 $(T - t)^{-1/(p-2)}$ ）；而分析方法则为我们提供了在全局参数空间中不可动摇的真理性的证明。
- **正则化思想的普适性：**在处理退化或奇异算子时，通过引入小参数 $1/n$ 消除退化性，再取极限的正则化手段是现代非线性 PDE 理论的基石方法。
- **微分不等式在时间估计中的威力：**利用 L^p 能量估计、Sobolev 空间不等式，我们可以把无限维空间中的 PDE 动力学问题，精细地映射到一维经典 ODE 的控制中，从而得到爆破时间下界等关键的物理量估计。