

第四章内容梳理

一 基本概念

(一) 原函数的概念

1. 原函数的定义

若对于 $\forall x \in I$, 均有 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 中的一个原函数.

2. 原函数存在的条件: 连续函数一定有原函数.

(二) 不定积分的概念

1. 不定积分的定义

函数 $f(x)$ 在区间 I 中的原函数的全体, 称为 $f(x)$ 在区间 I 中的不定积分, 记为

$\int f(x)dx$. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 中的一个原函数, 则

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

其中 $f(x)$ ——被积函数, $f(x)dx$ ——被积式, x ——积分变量, C ——积分常数

2. 不定积分的性质

$$(1) \int kf(x)dx = k \int f(x)dx \quad (k \neq 0 \text{ 为常数})$$

$$(2) \int [f_1(x) \pm f_2(x)]dx = \int f_1(x)dx \pm \int f_2(x)dx$$

$$(3) \left[\int f(x)dx \right]' = f(x) \text{ 或 } d \int f(x)dx = f(x)dx$$

$$(4) \int F'(x)dx = F(x) + C \text{ 或 } \int dF(x) = F(x) + C$$

二 不定积分的计算方法

(一) 基本积分公式

$\int 0dx = C$	$\int 1dx = x + C$
$\int x^k dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C, (k \neq -1)$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$
$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$	$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$
$\int \tan x dx = -\ln \cos x + C$	$\int \cot x dx = \ln \sin x + C$
$\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x + C$	$\int \csc x dx = \ln \csc x - \cot x + C$
$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$	$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$	

(二) 常用积分方法

1 第一换元积分法 (“凑” 微分法)

设 $\int f(u)du = F(u) + C$, 则 $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x) \xrightarrow{\text{令 } u = \varphi(x)} \int f(u)du$
 $= F(u) + C \xrightarrow{\text{回代 } u = \varphi(x)} F[\varphi(x)] + C$

2 第二换元积分法

$$\int f(x)dx \xrightarrow{\text{令 } x = \varphi(t)} \int f[\varphi(t)]d\varphi(t) = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

$$= F(t) + C \xrightarrow{\text{反代换 } t = \varphi^{-1}(x)} F[\varphi^{-1}(x)] + C$$

(1) . 利用三角函数代换, 变根式积分为三角有理式积分

被积函数 $f(x)$ 含根式	所作代换
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$

(2). 根代换

(3). 其他形式的代换 如倒代换, 指数代换等。

3 不定积分的分部积分法

设 $u(x)$ 、 $v(x)$ 可导, 若 $\int u'(x)v(x)dx$ 存在, 则

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx .$$

关键是把被积函数分成两部分, 即在公式 $\int u dv = uv - \int v du$ 中, 如何选取 u 和 dv 。一般来讲, 选取的原则是: (1) 积分容易者选为 dv ; (2) 求导简单者选为 u 。

常见的几种分部积分类型:

- (1) $\int x^n e^{ax} dx$ 型, $\int x^n \cos wx dx$ 、 $\int x^n \sin wx dx$ 型; 如, $\int x \cos x dx$, $\int x^2 e^x dx$ 。
- (2) $\int f(x) \cdot \text{对数函数} dx$ 型, $\int f(x) \cdot \text{反三角函数} dx$ 型; 如 $\int x \ln^2 x dx$, $\int x^2 \arctan x dx$
- (3) $\int e^{ax} \sin wx dx$ 、 $\int e^{ax} \cos wx dx$ 型; 如 $\int e^{2x} \cos x dx$
- (4) 有时会将换元积分法与分部积分法相结合。如 $\int \sin(\ln x) dx$, $\int \arctan \sqrt{x} dx$

4 有理函数的积分.

任何有理函数, 均可化为一个多项式与一个真分式 (分子的幂次数低于分母的幂次数) 的和.

真分式 $\frac{p(x)}{Q(x)}$ 均可表示为有限个部分分式 (或称简单分式) 之和.

5 简单无理函数的积分

无理函数积分, 一般通过选择变量替换, 去掉根号, 化为有理函数的积分来进行

6 三角函数有理式的积分

$\int R(\sin x, \cos x) dx$ 型积分均可通过变换 $u = \tan \frac{x}{2}$ 化为有理函数的积分, 此时

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2} \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2} \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

注: 当然三角有理式的积分可以通过三角变换, 应用各种三角公式如积化和差, 和差化积, 倍角公式, 半角公式等去凑微分。建议同学们多试试各种方法, 或许有意想不到的收获。

附: 三角函数公式:

(1) 切与割, 弦与割的关系

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x, \quad \cot^2 x + 1 = \csc^2 x; \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}.$$

(2) 二倍角公式

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}; \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2};$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x; \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

(3) 积化和差公式

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$