Baby-Led weaning

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE



Guida completa allo svezzamento guidato dal bambino.

Cos'è il Baby-Led Weaning e da dove nasce
Le basi scientifiche e i benefici reali
Differenza tra BLW e autosvezzamento
Come iniziare in sicurezza
I tagli giusti per ogni alimento

Baby-Led weaning

Ciao! Benvenuta/o nel gruppo Facebook AutosvezzamentoBLW(6+)

In questo ebook, ti guiderò passo passo nel meraviglioso mondo del Baby-Led Weaning, con consigli chiari e pratici per uno svezzamento rispettoso, sereno e felice.

Parleremo del metodo originale BLW, ancora poco conosciuto in Italia, e ti spiegherò perché lo considero uno dei regali più grandi che possiamo fare ai nostri figli.



Cos'è il Baby-Led Weaning e da dove nasce

Il Baby-Led Weaning (BLW), letteralmente “svezzamento guidato dal bambino”, è un metodo che permette ai bambini di iniziare lo svezzamento in modo autonomo, scegliendo cosa prendere e portare alla bocca. Diversamente dal classico svezzamento con pappe e puree, il BLW lascia al bambino il controllo, rispettando i suoi tempi e i suoi segnali di fame e sazietà.

Il metodo è stato presentato negli anni ’90 nel Regno Unito da Gill Rapley, infermiera, ostetrica e consulente per l’allattamento del Servizio Sanitario Nazionale britannico, che ha osservato come i bambini siano in grado di gestire da soli il cibo solido fin dai primi mesi. L’obiettivo principale del BLW è favorire l’autonomia, la curiosità e lo sviluppo delle capacità motorie e sensoriali, oltre a promuovere un rapporto sano e positivo con il cibo.



Gill Rapley

Le radici profonde del Baby-Led Weaning

Molti conoscono il BLW moderno grazie a Gill Rapley, che negli anni ’90 in Gran Bretagna ha formalizzato il metodo. Ma le radici di questo approccio sono ancora più antiche.

Già nel 1939, la pediatra americana Clara M. Davis condusse uno studio rivoluzionario a Montréal. Osservò bambini tra i 6 e gli 11 mesi che potevano mangiare liberamente da un buffet ospedaliero, senza restrizioni imposte dagli adulti. Sorprendentemente, questi bambini riuscirono a scegliere autonomamente una dieta equilibrata, con risultati di crescita positivi e senza carenze nutrizionali.

Questo studio confermò che i bambini sono in grado di autoregolarsi nell’alimentazione, contraddicendo l’idea che debbano essere forzati a mangiare certi cibi sotto il controllo degli adulti. In questo senso, Clara M. Davis può essere vista come una pioniera del concetto che più tardi sarebbe diventato il BLW.

Oggi il BLW moderno, formalizzato da Gill Rapley, riprende questi principi, permettendo ai bambini di sviluppare autonomia, curiosità e un rapporto sano con il cibo.



ANALYSIS

Clara M. Davis and the wisdom of letting children choose their own diets

In June of 1939, a petite Chicago pediatrician strode to the dais of Montréal's Windsor hotel and recounted to those attending the CMA's 70th annual meeting the results of what is likely the world's longest, most detailed and most ambitious dietary experiment.

Clara Marie Davis's Montréal descriptions of what she titled "The self-selection of diets by young children" was destined to become both a *CMAJ* citation classic and a fountainhead of argument, discussion and misinterpretation for everyone hoping to untangle the modern gnarl where children's appetites, food choices and health collide. What Davis claimed to have found changed the world of child feeding — but her research seems now to have come to an ever-more-confused state.

Composed in the direct and muscular literary style characteristic of her writing, the CMA speech, and a subsequent paper published in *CMAJ*, laid out to the world medical community what happens when you, as she would characterize her efforts elsewhere, let "children do for themselves."

Doing for themselves specifically meant permitting newly weaned infants to choose how much or how little to eat of 33 available foodstuffs. As she emphasized to her Quebec audience, no adult was allowed even to hint to the children what might be a proper choice or portion amount. "The menus' orders were to sit quietly by, spoon in hand, and make no motion," she said.

What was breathtaking about the experiment was not simply this conceit (so innocent were these young subjects of what constituted food that initially some hungry infants would chew on "a clean spoon, dishes, the edge of the tray, or a piece of paper on it"), but its duration and its execution.

Davis convinced unmarried teenage mothers and widows who could no longer support their families to place their infants in what amounted to an eating-experiment orphanage set up in Chicago. An eventual total of 15 children participated; the 2 boys who were studied the longest were followed over a 4.5-year period: that is to say, the amount of every single thing eaten or spilled at every single meal over the first 4½ years of their eating life was assiduously recorded. To this was added records of changes in height and weight, the nature of bowel movements, and regular bone radiographs and blood tests. Davis reported that the experiment had generated somewhere between 36 000 and 37 500 (she was inconsistent on the figure) daily food records.

Why do such an extraordinary thing? The *CMAJ* article — only hints at what Davis more explicitly expresses elsewhere. In the early part of the 20th century, a nutritional battleground had opened up between science-infatuated pediatricians and remarkably nonchalant and apparently unscientific children. Armed with growing evidence from the newly emerging field of nutrition, doctors began prescribing with bank teller–like precision what and when and how much a child should eat in order to be healthy.

Children quite often responded to doctor-ordered proper diets by shutting down and refusing to eat anything. One physician of the period[1] (p. 6) estimated that 50%–90% of visits to pediatricians' offices involved mothers who were frantic about their children's refusals to eat — a condition then called anorexia.

On their part, at least some doctors responded to the children's hunger strikes by declaring war on children's aberrant appetites and eating patterns. For instance, Alan Brown, co-master of Pablum and head of pediatrics at Toronto's The Hospital for Sick Children (popularly known as Sick Kids), advised mothers in the 1926 edition of his best-selling book on child-rearing, *The Normal Child: Its Care and Feeding* (p. 82),[2] to put children on what was literally a starvation diet until they submitted to eat doctor-sanctioned meals.



Clara M. Davis

Il Baby-Led Weaning e in cosa si differenzia dall'autosvezzamento

Il Baby-Led Weaning (BLW), in italiano svezzamento guidato dal bambino, è un approccio in cui il protagonista assoluto è il bambino.
Fin dai sei mesi, è lui a decidere se, quando, cosa e quanto mangiare.
Il genitore offre un pasto sano ed equilibrato, e il piccolo sceglie in base ai propri bisogni e curiosità.

I bambini nascono con una naturale capacità di ascoltare il proprio corpo: sanno autoregolarsi, capire quando hanno fame o quando sono sazi.
Le ricerche dimostrano che i piccoli che seguono questo approccio hanno minor rischio di obesità, sono meno selettivi nei gusti e sviluppano un rapporto più sereno e rispettoso con il cibo.

> Non è solo un modo di mangiare, ma un modo di crescere, basato sulla fiducia, sull'ascolto e sull'autonomia.

Questo metodo non consiste semplicemente nel "mangiare cibo a pezzi", né nel "passare ai pezzi" dopo le pappe.
Il bambino ha fin da subito l'opportunità di esplorare il cibo nella sua forma naturale, senza essere imboccato o guidato eccessivamente.
Se non porta il cibo alla bocca, significa soltanto che non è ancora pronto — e va bene così.

Con pazienza e fiducia, si attende che sia lui a mostrare interesse e capacità, anche se questo accade a sette, otto o nove mesi.
I pezzi, in questo percorso, non sono il fine ma il mezzo: servono a favorire autonomia, fiducia e scoperta.
È un approccio fondato su rispetto, osservazione e poca interferenza.

In Italia si parla spesso di autosvezzamento, ma questo termine è stato interpretato in molti modi diversi.
Nella pratica comune, si intende spesso un approccio “morbido”, dove il genitore continua a imboccare in modo responsivo, oppure propone pappe, puree, minestrine o pastina come passaggio intermedio tra la pappa e i cibi solidi.

Questo però non corrisponde al metodo Baby-Led Weaning.
Nel BLW il bambino non viene imboccato, perché è lui a gestire completamente il gesto del mangiare.
Il genitore non introduce puree o alimenti troppo morbidi che non può afferrare, ma offre solo cibi che il bambino può manipolare facilmente e portare alla bocca da solo, tagliati in modo sicuro.

Il focus non è sul “cibo a pezzi”, ma sulla fiducia: nel rispetto dei tempi del bambino, della sua curiosità e delle sue capacità.
Mangiare insieme diventa un’esperienza condivisa, fatta di autonomia, scoperta e connessione.

Ogni bambino è diverso: alcuni si avvicinano subito al cibo, altri osservano più a lungo.
C’è chi mangia tanto e chi quasi nulla per settimane.
C’è chi preferisce alcuni sapori e chi prova di tutto.

E tutto questo è normale.
Perché nel BLW non esiste un modo giusto o sbagliato di imparare a mangiare — esiste il proprio modo.

Perché non imboccare il bambino

Nel Baby-Led Weaning (BLW), o svezzamento guidato dal bambino, il piccolo è protagonista fin dai primi assaggi, intorno ai 6 mesi.
Una delle regole fondamentali è non imboccare il bambino, lasciandolo esplorare il cibo con le proprie mani e portarlo autonomamente alla bocca.

Già prima che il cibo entri in bocca, il cervello mette in moto una complessa rete di processi: vedere e annusare il cibo stimola le ghiandole salivari, preparando lo stomaco alla digestione.
Quando il bambino tocca, raccoglie e manipola il cibo, riceve informazioni sensoriali cruciali su consistenza, peso e movimento. Queste percezioni aiutano il cervello a prevedere come il cibo si sentirà in bocca, migliorando attenzione, prontezza alla masticazione e capacità di gestirlo in sicurezza.

Riferimenti scientifici:

Fangupo, L. J., Heath, A. L., Williams, S. M., et al. (2016). A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk of Choking. Pediatrics, 138(4), e20160772. doi:10.1542/peds.2016-0772

Autonomia, fiducia e sicurezza

Portare il cibo alla bocca attiva una coordinazione complessa: apertura delle labbra, movimento della lingua e riflesso della deglutizione lavorano insieme per garantire un gesto sicuro ed efficiente.
Rispettare questo processo, senza imboccare, permette al bambino di sviluppare competenze motorie orali solide, riducendo il rischio di soffocamento.

Il BLW promuove:

Autonomia: il bambino impara a gestire il cibo e a decidere quando e quanto mangiare.

Rispetto dei segnali di fame e sazietà: ascolta il proprio corpo senza interferenze.

Sviluppo motorio e sensoriale: manipolare il cibo stimola motricità fine, coordinazione occhio-mano e percezioni sensoriali.

Esperienza positiva e senza pressioni: il pasto diventa momento piacevole di scoperta e condivisione.

Fiducia genitore-bambino: osservare e sostenere senza imboccare rafforza la relazione e la serenità a tavola.

Riferimenti scientifici:

Hemsley, B., Steel, J., Sheppard, J., Malandraki, G., Bryant, L., & Balandin, S. (2020). Dying for a Meal: An Integrative Review of Characteristics of Choking Incidents and Recommendations to Prevent Fatal and Nonfatal Choking Across Populations. American Journal of Speech-Language Pathology, 28(3), 1283–1297.

Fangupo, L. J., Heath, A. L., Williams, S. M., et al. (2016). A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk of Choking. Pediatrics, 138(4), e20160772.



Perché non usare alimenti inadatti come le stelline

Alcuni approcci definiti “autosvezzamento” propongono stelline, pastina o puree nei primi mesi.
Questa pratica non rispetta i principi del BLW: il bambino non è ancora pronto a gestire cibi così piccoli in autonomia, e per poterli mangiare dovrebbe essere imboccato, vanificando lo scopo del metodo.

Offrire cibi che non può afferrare da solo:

riduce l’apprendimento della coordinazione,

interferisce con la consapevolezza dei segnali di fame e sazietà,

non stimola correttamente i muscoli della masticazione,

aumenta il rischio di soffocamento.

Nel BLW, invece, si propone solo cibo che il bambino può manipolare e portare alla bocca da solo, rispettando i suoi tempi e capacità.
L’obiettivo non è farlo mangiare a tutti i costi: il latte continua a soddisfare i bisogni nutrizionali iniziali.
Il focus è apprendere attraverso l’esperienza, sviluppando sicurezza, autonomia e competenze alimentari solide.

Riferimenti scientifici:

Fangupo, L. J., Heath, A. L., Williams, S. M., et al. (2016). A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk of Choking. Pediatrics, 138(4), e20160772.

Cameron, S. L., Heath, A. L., & Taylor, R. W. (2012). How feasible is Baby-Led Weaning as an approach to infant feeding? Maternal & Child Nutrition, 8(1), 44–56. doi:10.1111/j.1740-8709.2011.00361.x

Benefici del BLW: autonomia e rispetto dei tempi

Il Baby-Led Weaning non è solo un modo di mangiare: è un percorso che mette il bambino al centro, rispettando i suoi ritmi e stimolando la sua autonomia.

I principali benefici osservati sono:

Autonomia e indipendenza: il bambino impara a gestire il cibo, a decidere quando e quanto mangiare, e sviluppa fiducia nelle proprie capacità.

Rispetto dei segnali di fame e sazietà: ascoltando il proprio corpo, impara a autoregolarsi e a sviluppare un rapporto sano con il cibo.

Esperienza positiva del pasto: i pasti diventano momenti di scoperta e condivisione, senza pressioni o forzature.

Riferimenti scientifici:

Cameron, S. L., Heath, A. L., & Taylor, R. W. (2012). How feasible is Baby-Led Weaning as an approach to infant feeding? Maternal & Child Nutrition, 8(1), 44–56. doi:10.1111/j.1740-8709.2011.00361.x

Sviluppo motorio e sensoriale

Manipolare il cibo stimola:

Motricità fine e coordinazione occhio-mano

Percezioni sensoriali (texture, sapori, odori, colori)

Capacità orali necessarie per masticare e deglutire correttamente

Stimolazione del linguaggio: afferrare, mordere, masticare e manipolare cibi diversi allena i muscoli della mascella, della lingua e delle labbra, che sono fondamentali per la produzione dei suoni e lo sviluppo del linguaggio. Esplorare consistenze e forme diverse aiuta il bambino a controllare meglio la bocca e a coordinare i movimenti necessari per parlare.

Questi stimoli contribuiscono allo sviluppo fisico e cognitivo, migliorando attenzione, concentrazione, curiosità e competenze comunicative.

Riferimenti scientifici:

Fangupo, L. J., Heath, A. L., Williams, S. M., et al. (2016). A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk of Choking. Pediatrics, 138(4), e20160772.

Hemsley, B., Steel, J., Sheppard, J., Malandraki, G., Bryant, L., & Balandin, S. (2020). Dying for a Meal: An Integrative Review of Characteristics of Choking Incidents and Recommendations to Prevent Fatal and Nonfatal Choking Across Populations. American Journal of Speech-Language Pathology, 28(3), 1283–1297.





Salute e relazione con il cibo

I bambini che seguono il BLW tendono a:

essere meno selettivi nei gusti

avere minor rischio di sovrappeso e obesità

mantenere una relazione serena con il cibo anche negli anni successivi

Il metodo rafforza anche il legame con i genitori: osservare, supportare senza imboccare e rispettare i tempi del bambino favorisce fiducia reciproca e serenità a tavola.

> In sintesi, il BLW non insegna solo a mangiare: insegna autonomia, consapevolezza e gioia nel rapporto con il cibo.

Riferimenti scientifici:

Brown, A., & Lee, M. (2015). Early influences on child satiety-responsiveness: the role of weaning style. Pediatrics, 135(2), e380–e388. doi:10.1542/peds.2014-0923

Cameron, S. L., Heath, A. L., & Taylor, R. W. (2015). How feasible is Baby-Led Weaning as an approach to infant feeding? Maternal & Child Nutrition, 11(2), 121–134.

Come si inizia

Una volta che il bambino ha compiuto sei mesi ed ha raggiunto i requisiti fondamentali per l'inizio dell'alimentazione complementare — stare seduto dritto e senza pendere (anche con un piccolo supporto), perdita del riflesso di estrusione, coordinazione occhio-mano-bocca e interesse per il cibo — si può iniziare.

Cosa serve?
La prima cosa necessaria, e che tutte le persone che si occupano del bambino dovrebbero fare, è un corso di disostruzione pediatrica.
A prescindere dal tipo di svezzamento scelto, il corso è indispensabile: un bambino può soffocare con qualsiasi cosa, anche oltre il cibo, ed essere preparati, nonché conoscere la differenza tra il gag reflex e un soffocamento reale, è fondamentale, così come saper agire tempestivamente.

Una precisazione necessaria e importante è che il Baby-Led Weaning non presenta un rischio maggiore di soffocamento rispetto allo svezzamento tradizionale con pappe.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che il rischio è sovrapponibile tra i due approcci.

Una volta fatto il corso, e una volta che il bambino è pronto, si può iniziare.



Siamo pronti!
Si inizia!

Una cosa fondamentale che deve essere ben chiara è che, in questa fase, bisogna liberarsi da ogni aspettativa e da qualsiasi forma di preconcetto del passato, in cui “il bambino doveva mangiare”.
No: con il baby-led weaning il bambino non deve mangiare, deve imparare a farlo.

Imparerà con i suoi tempi e i suoi modi.
In questa fase la cosa più importante è la sperimentazione, la manipolazione e la scoperta del cibo a livello sensoriale e visivo.

È importante che il bambino manipoli, stritoli, tiri anche a terra: è esattamente quello che deve fare.
Successivamente porterà il cibo alla bocca. C’è chi lo fa subito e chi dopo un po’ di tempo: non importa, si rispettano sempre i suoi tempi.

Detto questo, possiamo iniziare.

Cosa fare?
Prima di metterlo a tavola, offri sempre il latte.
Il bambino deve essere sazio, sereno e rilassato per poter vivere questa esperienza nella totale tranquillità e assenza di frustrazione.

Non ascoltare chi ti dice: “Se gli dai il latte, poi non mangia.”
È esattamente il contrario: un bambino affamato non manipolerà il cibo, andrà in frustrazione, piangerà e avrà più episodi di gag reflex, perché cercherà di colmare il fastidio della fame con il cibo, senza avere ancora le capacità per gestirlo.

Il nostro intento, ora, è che lui sia sereno.

Puoi iniziare dal pranzo, dalla cena o dalla merenda: qualsiasi occasione in cui la famiglia si raduna a tavola diventa un momento di apprendimento per il bambino.

Quando è sveglio, dopo aver preso il latte e seguendo i suoi orari, puoi sederlo con voi e offrirgli ciò che la famiglia sta mangiando, in tagli sicuri e purché sia cibo sano.

Puoi iniziare con qualche assaggio messo a disposizione sul vassoio del seggiolone.
Non usare il piatto all’inizio: per il bambino può diventare una distrazione e, inoltre, per lui è più complicato prendere il cibo da lì. È più facile se i pezzi sono ben distanziati sul vassoio.
Successivamente, quando il piatto non sarà più motivo di gioco e il bambino avrà fatto pratica, potrai introdurlo gradualmente.



“Da quale pasto iniziare con il BLW?”

Non esiste un solo pasto da cui iniziare.

Nel Baby-Led Weaning non si segue uno schema rigido tipo “prima pranzo, poi merenda, poi cena…”.Non si aspetta che il bambino “impari a mangiare” con un pasto per passare al successivo.

Si inizia… con tutti.

Ogni occasione a tavola è un’opportunità di apprendimento, nuovi sapori, nuove consistenze, nuove abilità, osservazione e imitazione.
Più esperienze ha il bambino, più impara. Non ha senso “limitare” le occasioni aspettando che mangi di più o meglio.

Ma attenzione, non significa forzare o proporre sempre attivamente cibo.

Il punto non è “farlo mangiare”, ma farlo partecipare.

Se il bambino è sereno, è interessato, non è nella fase riposino, è quindi predisposto e vuole stare a tavola, allora si offre il latte (che resta il nutrimento principale) e lo si coinvolge nel momento del pasto familiare.

Magari toccherà soltanto il cibo.
Magari lo porterà alla bocca.
Magari lo lancerà a terra.

Tutto questo è apprendimento.

Il vero valore del BLW è proprio qui, non nel quanto mangia, ma nel quanto vive il momento del pasto.

Quindi no, non aspettare, non rimandare, non “testare” un pasto alla volta.

Siediti a tavola insieme al tuo bambino… e lascia che inizi a scoprire il cibo, un pasto dopo l’altro.
Perché ogni pasto è esperienza ed ogni esperienza è crescita.

Con quali cibi iniziare

Come abbiamo detto, senza cimentarsi in “baby ricette” complicate, la cosa migliore è offrire ciò che la famiglia sta mangiando.

E il sale?
Il sale può essere semplicemente omesso e aggiunto solo ai piatti degli adulti, oppure moderato per tutti. È un’ottima occasione per migliorare l’alimentazione familiare, imparando a mangiare più sano e meno sapido.

Non esistono più i “cronoinserimenti”:
dai 6 mesi si può offrire quasi tutto, ad eccezione degli alimenti vietati in svezzamento, come:

zucchero,

miele,

alcol (anche quello usato per sfumare, perché non evapora completamente ed è dannoso),

cibi crudi o poco cotti.



Possono essere inseriti già dai 6 mesi, insieme a tutti gli altri alimenti.
Non è più consigliato ritardare l'introduzione, anzi, introdurli precocemente può aiutare a ridurre il rischio di allergie.

Quali sono gli alimenti allergizzanti principali?

I principali, che causano la maggior parte delle reazioni, sono:
Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro).
Crostacei e Molluschi (cozze, vongole, ecc.).
Uova (sempre ben cotte).
Pesce.
Arachidi (come creme, mai intere per rischio soffocamento).
Soia.
Latte vaccino (evitare come bevanda prima dei 12 mesi, ma si può usare nei cibi).
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi,usare solo in creme 100% frutta secca).
Sedano.
Senape.
Sesamo.

Quando e come proporli?

Offrili al mattino o a pranzo, mai la sera.
In questo modo hai il tempo di osservare eventuali reazioni e, se necessario, contattare il medico.
La sera è meglio evitare perché durante la notte non puoi monitorare bene il bambino.
Introduci UN solo alimento allergizzante al giorno
Esempio:
Oggi provi l'uovo, NON aggiungere nello stesso giorno frutta secca o altri allergeni
Questo ti permette di capire chiaramente eventuali reazioni.

Cosa osservare dopo l'introduzione?

Orticaria o macchie sulla pelle
Gonfiore (labbra, occhi)
Vomito o diarrea
Difficoltà respiratoria (raro, ma urgente)
In caso di sintomi importanti, contatta subito il medico

Attenzione, non tutte le reazioni sono allergie

Molto spesso, soprattutto all'inizio dello svezzamento, si osservano " Rossori da contatto"
ad esempio intorno alla bocca dopo aver mangiato.
Reazioni a cibi naturalmente ricchi di istamina o più "irritanti" come per esempio
melanzane (soprattutto se con molti semi), pomodoro (soprattutto se molto acido), fragole ecc.
Questi alimenti possono causare rossori temporanei sulla pelle, ma non si tratta di una vera allergia.
Se il rossore compare localmente e scompare entro circa 30 minuti, il bambino sta bene, generalmente non c'è da preoccuparsi.



L'idea dei "100 alimenti entro l'anno" nasce come gioco simbolico nei gruppi americani che seguono il BLW (Baby-Led Weaning): l'obiettivo è proporre una grande varietà di cibi nel primo anno di vita, e quando si raggiungono i 100 si festeggia con una foto, una tortina o un palloncino un modo divertente per lasciare andare l'ansia da cronoinserimento e vivere lo svezzamento con più serenità.

✨ BLW e autoregolazione: fino a quando dura davvero?

Una delle basi del baby-led weaning è che i bambini sanno 👋 **regolarsi da soli:** mangiano quando hanno fame e si fermano quando sono sazi. Ma fino a che età succede?



0-2 anni → autoregolazione fortissima, i piccoli si fermano da soli senza farsi influenzare



2-3 anni → la regolazione c'è ancora, ma iniziano curiosità e imitazione degli adulti



3-5 anni → oltre alla fame compaiono fattori emotivi e sociali (voglia, festa, premi)



Dai 5 anni → l'autoregolazione istintiva lascia spazio all'educazione alimentare e alle buone abitudini di famiglia

👉 **Ricorda:** all'inizio segui il loro ritmo, più avanti guidali con esempi e proposte sane!

La divisione delle responsabilità a tavola

Modello di Ellyn Satter — svezzamento e oltre



Responsabilità del genitore

— COSA —



Sceglie quali alimenti offrire
Varietà equilibrata di cibi

— QUANDO —



Stabilisce orari e routine
Pasti e spuntini regolari

— COME —



Prepara e presenta il cibo
Consistenza adatta all'età

— AMBIENTE —



Crea un clima sereno
No pressioni, no distrazioni



Responsabilità del bambino

— COSA —



Decide cosa mangiare
Tra ciò che è stato offerto

— QUANDO —



Sente fame e sazietà
Mangia quando ha appetito

— COME —



Decide quanto mangiare
Auto-regola le porzioni

— AMBIENTE —



Esplora liberamente
Tocca, annusa, assaggia

Cosa non spetta a chi

Il genitore non decide:
- × Quanto mangia il bambino
- × Se accetta un nuovo alimento
- × La velocità dell'appetito

Il bambino non decide:
- × Quali alimenti vengono offerti
- × Gli orari dei pasti
- × L'ambiente e la routine

Principi guida

Fiducia
nel ritmo del bambino

Esposizione
ripetuta senza forzare

Responsività
ai segnali di fame/sazietà

Basato sul modello Division of Responsibility (DOR) di Ellyn Satter



Quando si pratica il Baby-Led Weaning, la sicurezza e la postura del bambino a tavola sono fondamentali. Per questo motivo è importante scegliere il seggiolone giusto!

Da evitare:
I modelli reclinabili, come quelli stile Chicco, non sono ideali.
Sono stati sviluppati pensando ad uno svezzamento classico dove il bambino viene imboccato.

Non permettono al bambino di stare ben eretto.
Il vassoio è troppo alto e spesso non allineato al busto.
Il bambino finisce con le ascelle sul vassoio, assumendo una posizione scomoda e non fisiologica.
Questa postura può rendere più difficile mangiare in autonomia e aumentare i rischi legati alla sicurezza a tavola.

Da preferire:

I seggioloni che garantiscono una postura dritta, stabile e confortevole.

Come l'Ikea Antilop: semplice, economico e con postura corretta.

i seggioloni evolutivi in legno, che crescono con il bambino e lo aiutano a stare seduto in modo sicuro e naturale.

Qualsiasi altro modello che non sia reclinabile e abbia le caratteristiche del primo sbarrato .

Ricorda: un buon seggiolone è un alleato fondamentale per un'esperienza BLW serena, sicura e positiva!

Il poggia piedi per ikea lo trovate su amazon, temu, shein a poco meno di qualche euro.

Come offrire l'acqua



il miglior modo per offeire l'acqua al bambino durante i pasti è con un classico bicchiere. in questo modo imparerà a sorseggiare immediatamente.

Inizialmente lo offrirete voi aiutandolo. Durante la giornata invece, per comodità potete usare anche cannucce, beccucci, borracce. Mai biberon, rimane esclusivo per il latte.

Il bicchiere può essere classico o con manici.

AutosvezzamentoBlw&+





Come comporre un piatto nel Baby-Led Weaning

Uno dei principi fondamentali del Baby-Led Weaning (BLW) è la fiducia nella naturale capacità del bambino di autoregolarsi.
I bambini, infatti, nascono con la capacità di ascoltare il proprio corpo e di scegliere, se ne hanno la possibilità, ciò di cui hanno bisogno.

Quando vengono offerti alimenti sani e vari — come carboidrati, proteine, verdure, grassi buoni e frutta — il bambino impara ad ascoltarsi e a bilanciare la propria alimentazione nel tempo.

Un giorno potrà preferire la carne o i legumi, perché il suo corpo ha bisogno di più ferro o proteine; un altro giorno sceglierà pane o frutta, per la ricerca di zuccheri naturali e carboidrati.
E a volte, semplicemente, non toccherà nulla: anche questo fa parte del suo percorso di apprendimento e ascolto.
Non è un segnale negativo, ma una tappa naturale.

Come presentare i cibi nel piatto
Offri gli alimenti nella loro forma naturale, riconoscibile. In questo modo il bambino imparerà a conoscere gli alimenti per come sono, potrà osservarli, manipolarli e sceglierli.

Ogni pasto può includere, se possibile:

una fonte di carboidrati (es. pane, patate, riso, pasta),

una fonte di proteine (es. carne, pesce, uova, legumi),

verdure,

frutta fresca,

e grassi buoni, come olio extravergine d'oliva o avocado.

Piatto unico sì o no?.
Ogni tanto sì, ma non sempre.
Il piatto unico, infatti, può limitare le possibilità di scelta del bambino e alterare i sapori dei singoli alimenti.
Meglio offrire gli alimenti separati, in modo che il bambino possa esplorare gusti, consistenze e colori diversi.

Ricorda: la varietà è la chiave.
Offrire cibi diversi e in modo naturale non solo stimola il palato, ma aiuta anche a costruire un rapporto sano e sereno con il cibo.





Come offrire lo yogurt o alimenti di simile consistenza?



Lo yogurt può essere offerto: sopra pancakes, fette biscottate, sotto forma di porridge con aggiunta di avena o cereali per aiutare la presa, o semplicemente in una ciotolina, anche precaricando il cucchiano (senza abusarne agli inizi). In ogni caso è bene che il bambino faccia da solo. Non importa se si sporca, fa parte del processo di apprendimento.





Per quanto riguarda le vellutate, sarebbe meglio evitarle nelle prime fasi dello svezzamento, privilegiando le verdure nella loro forma naturale. In questo modo il bambino può esplorarle con le mani, conoscerne consistenza, forma e sapore.
Se però vi capita di prepararle, potete comunque proporle in modo funzionale all'autonomia: ad esempio accompagnandole con crostini di pane oppure utilizzandole per condire della pasta corta, come i fusilli, così che il bambino possa mangiare da solo.
È inoltre consigliabile offrire sempre, accanto alla vellutata, una verdura intera tra quelle utilizzate, in modo che il bambino possa riconoscere cosa sta mangiando e creare una connessione tra l'alimento e la sua forma originale.

TAGLI SICURI



Tagli sicuri

Siccome spesso c'è un po' di confusione tra stick e pezzettini, facciamo chiarezza.

Lo stick è indicato per i bambini che non hanno ancora sviluppato la presa a pinza: è più facile da afferrare e portare alla bocca. È importante sapere che la sicurezza non dipende dal fatto che il cibo sia a stick o a pezzetti, ma dallo spessore. Uno stick, infatti, viene morso e rotto in bocca, non ingerito intero. Di conseguenza, un pezzettino è semplicemente uno stick tagliato più piccolo.

Sono sicuri entrambi? Sì.

C'è differenza? Anche.

All'inizio dello svezzamento, lo stick è preferibile perché, oltre a facilitare la manipolazione, aiuta il bambino a imparare a rompere e masticare il cibo, a gestire le quantità e a prendere confidenza con consistenze e dimensioni. Il pezzettino piccolo, invece, tende a essere ingerito automaticamente: per questo motivo è meglio evitarlo nelle fasi iniziali. Un bambino di circa 9 mesi, però, con presa a pinza e qualche mese di esperienza, ha già sviluppato la masticazione e non deglutisce più in modo riflesso. In questo caso, il pezzettino non rappresenta un problema: anche se lo ingoia intero, rimane un formato sicuro.

Ricordiamoci sempre che la sicurezza è relativa: anche con i tagli corretti il rischio si riduce moltissimo, ma non si azzera mai. Per questo, un corso di disostruzione pediatrica resta fondamentale.

Spesso sorgono domande come: "Questo è sicuro?" "Quest'altro lo è?"

Oltre a seguire le linee guida, è importante imparare a ragionare.

Le liste dei tagli sicuri sono utili, ma vanno interpretate.

Esempi pratici:

Pera matura → va bene a fettine, stick o pezzetti.

Se però è dura, il taglio cambia: meglio grattata, perché diventa rischiosa quanto una mela.

Cetriolo → la parte centrale con i semi (più acquosa) può essere offerta a stick.

Se non è maturo ed è duro, meglio grattato o a listarelle sottili con il pelapatate.

Cocomero → sì a fettine o stick, ma se è troppo fibroso non è adatto: risulta duro e difficile da gestire.

Pasta

Tutta la pasta può essere proposta, ma va adattata per essere sicura.

Formati generalmente sicuri così come sono: fusilli, spaghetti, farfalle, trofie, ruote, tagliolini, tagliatelle sottili.

Altri formati? Dipende.

I formati forati possono sembrare sicuri perché lasciano passare l'aria, ma possono riempirsi di sugo, o essere usati come "cannucce", creando difficoltà. Meglio tagliarli per lungo. Interi? Solo senza condimenti che possano ostruire i fori.

Altri formati: Chiediamoci sempre: si piegano su sé stessi? Sono troppo grandi? Cosa succede se vengono ingeriti interi?

Se serve, tagliamoli.

Pane, crackers e grissini

Alcuni manuali li considerano sicuri, altri no.

Cosa fare?

Se volete ridurre i rischi: bagnateli o offriteli sbriciolati.

Valutate sempre la friabilità: si sciolgono facilmente? Come si comportano in bocca?

Frutta

Va sempre offerta matura e morbida.

Se è dura, non è adatta: come tutti gli alimenti crudi rigidi, è difficile da gestire.

Carne

Pollo → può essere offerto sfilacciato o a piccoli pezzi se morbido, perché si sfalda facilmente.

Manzo → non si sfalda: meglio tritato, hamburger o polpette.

Eccezioni:

Bollito che si sfilaccia → ok

Arrosto morbido → ok

Bistecca o fettina → no a pezzetti, perché non gestibile con le gengive

In conclusione

Non basiamoci solo sulle immagini: sono utili, ma non sufficienti.

Facciamoci sempre delle domande:

Il bambino lo sa gestire?

Che consistenza ha?

Cosa succede se lo ingoia intero?

Nel dubbio, adattiamo il formato per renderlo sicuro.


Formati sicuri 6+
Fusilli
Farfalle
Trofie
Ruote
Spaghetti
Tagliatelle
Tagliolini


Formati di pasta forata
PUÒ ESSERE OFFERTA TAGLIATA PER LUNGO. AD INIZIO SVEZZAMENTO OFFERTA INTERA PUÒ ESSERE DIFFICILE DA GESTIRE E PROVOCARE FORTI GAG REFLEX. PUÒ ESSERE OFFERTA INTERA APPENA IL BAMBINO PRENDE DIMESTICHEZZA CON IL CIBO, CONDITA CON SUGHI LISCI CHE NON TAPPINO I FORI.
I DITALINI SONO UN FORMATO PICCOLO, NON ADATTO AI PRIMI MESI DI AUTOSVEZZAMENTO, POSSONO ESSERE OFFERTI PIÙ AVANTI A CAPACITÀ ED AUTONOMIA ACQUISITE.
AutosvezzamentoBlw6+





Gli stick devono essere lunghi circa un dito e larghi max 1cm e mezzo.






Cetriolo
6+
9+
Del cetriolo maturo può essere offerta la parte interna a stick o pezzettini. La parte esterna più dura, grattata o in fettine sottili con pelapatate.
AutosvezzamentoBlw6+


Zucca
9+
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Broccolo
6+
AutosvezzamentoBlw6+



Ravanello
AutosvezzamentoBlw6+


Patata
6+
9+
La patata può essere offerta cotta in tutti i modi a stick o pezzettini.
AutosvezzamentoBlw6+


Mais
Il mais può essere offerto a rondelle da rosicchiare con i primi incisivi
AutosvezzamentoBlw6+


Finocchio
Il finocchio può essere offerto cotto, tagliato a listarelle, dai 6 mesi.
Sconsigliamo crudo, in quanto difficile da gestire.
Si può provare crudo dai 18+, con taglio a fiammifero, tagliando nel verso dei filamenti.
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Pomodoro
La buccia può essere lasciata, ma se preferite in questi grandi rimuovetela.
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Pomodorini
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Castagne
Le castagne, possono essere offerte: a pezzettini o sbriciolate, nelle preparazioni. Qualsiasi sia il metodo di cottura, assicurati siano morbide. Dai 6+
AutosvezzamentoBlw6+


Barbabietola
9+
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Asparagi
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Avocado
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Insalata Iceberg
9+
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Peperone
9+
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Ravioli
9+
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Tortellini bolognesi
Attenzione che il ripieno sia sempre morbido
12+
Dai 12+ possiamo offrirlo intero, valutando le capacità masticatorie del bambino.
6+
TAGLIAMO IN 2, O PIÙ PARTI, CONSIDERANDO LA GRANDEZZA.
AutosvezzamentoBlw6+


Polpette di carne
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Pollo
9+
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Pesce
Attenzione a rimuovere tutte le spine.
AutosvezzamentoBlw6+


Gamberi
No
6+
I gamberi possono essere offerti sminuzzati o in striscioline sottili.
AutosvezzamentoBlw6+


Vongole
Le vongole sono filtri del mare e non sono consigliate in svezzamento. Si può offrire nel caso di una pasta, la stessa con il sughetto, eliminando le vongole. Possono essere offerte con la piena sicurezza che siano fresche ed in quel caso sminuzzate.
AutosvezzamentoBlw6+






PER TAGLIO A FIAMMIFERO: Si INTENDE LO SPESSORE DI UN CLASSICO FIAMMIFERO. QUINDI NON UNO STICK.




Baby torte
9+
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Muffin
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Tofu
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Uovo
6+
9+
6+
AutosvezzamentoBlw6+


Piselli
Secondo i dati del database SUSY SAFE, i piselli rientrano tra gli alimenti a rischio moderato di soffocamento, soprattutto nei bambini sotto i 3 anni, anche se meno pericolosi rispetto a cibi come uva, caramelle o noccioline.
Perché i piselli possono essere un rischio:
Forma rotonda e piccola.
Possono essere scivolosi e facilmente inalabili.
Sconsigliamo di offrirli interi dai 12 mesi, si può provare a farlo verso i 18+ con una buona masticazione.
I piselli possono essere offerti schiacciati o in crema. Nel blw al di fuori dell'Italia, non si decorticano.
In Italia si consiglia di farlo fino ai 12 mesi.
AutosvezzamentoBlw6+


Fave
No
Le fave possono essere offerte schiacciate o in crema. Facendo attenzione se si hanno casi di Favismo in famiglia.
AutosvezzamentoBlw6+



LE LENTICCHIE POSSONO ESSERE OFFERTE COSI COME SONO.




Avocado
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Olive
No
Le olive possono essere offerte a striscioline sottili o piccoli pezzettini
AutosvezzamentoBlw6+


Lamponi
AutosvezzamentoBlw&+



More
AutosvezzamentoBlw&+


Prugna o Susina
6+
9+
AutosvezzamentoBlw&+



Fico
6+
9+
AutosvezzamentoBlw&+


Ananas
6+
9+
L'ananas può essere offerta se morbida a stick o pezzettini. Sempre matura, ma se troppo fibrosa si consiglia di sminuzzarla ulteriormente
AutosvezzamentoBlw&+


Ciliegie
No
AutosvezzamentoBlw&+


Nespola
9+
6+
AutosvezzamentoBlw&+


Albicocca
Rimuovere la buccia
9+
6+
AutosvezzamentoBlw&+


Pesca
9+
6+
AutosvezzamentoBlw&+


Melone
6+
9+
AutosvezzamentoBLW


Anguria
Eliminare
i semi
9+
6+
AutosvezzamentoBLW


Melone verde/giallo
6+
9+
AutosvezzamentoBLW


La papaya
9+
6+
AutosvezzamentoBLW


Kiwi
6+
9+
AutosvezzamentoBlw&+


Pera
6+
9+
AutosvezzamentoBlw&+
attenzione la pera deve essere matura, altrimenti va offerta grattata o con pelapatate.


Mirtilli
9+
6+
Schiacciare i mirtilli è una modalità usata nel blw estero. In Italia continuano ad essere tagliati in 4 per maggiore sicurezza.
AutosvezzamentoBlw&+


La fragola
6+
No
9+
AutosvezzamentoBlw&+

Melagrana

La melagrana può essere offerta schiacciata, in succo, o direttamente i semini quando il bambino ha sviluppato una presa a pinza.



AutosvezzamentoBlw6+

Mango

il mango puo essere offerto in fettine sottili o pezzettini bello maturo.
si puo offrire anche l'osso del frutto, che verrà rosicchiato della polpa rimasta, magari panato nel cocco rape' per renderlo meno scivoloso.




AutosvezzamentoBlw6+


Banana
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+


Mela
18+
6+
No
AutosvezzamentoBlw6+


Cachi mela
Il cachi mela: può essere offerto a Stick o pezzettini. Attenzione, deve essere morbido. Il cachi normale invece, ha una consistenza molto morbida, potete offrirlo al cucchiaio, ma anche, per guarnire pancakes o yogurt.
Fai la prova tra pollice ed indice, deve spappolarsi. Se duro, non va offerto.
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+

Mandarino & Arancia



Rimuovi le pellicine, totalmente.

Puoi offrire anche la rondella dai 6+.

A 9+ con la presa a pinza, si possono offrire in pezzetti

Se la fetta è troppo spessa, dividila a metà per la lunghezza.


Dai 18+ puoi iniziare ad offrire l'intero spicchio.

Dragon Fruit /Pitaya



Il dragon fruit, o pitaya, è ricco di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti che apportano diversi benefici, tra cui la regolarizzazione del transito intestinale, il supporto al sistema immunitario e la protezione della salute cardiovascolare. Le sue proprietà aiutano anche a combattere l'invecchiamento cellulare e contribuiscono alla sazietà e all'idratazione.


Uva
No
6+
AutosvezzamentoBlw6+
Rimuovere
eventuali semi.


Polpette di verdure varie
6+
9+
AutosvezzamentoBlw6+

Domande ricorrenti



Parliamo dello “spreco” di cibo nel BLW, soprattutto nelle prime fasi in cui il bambino esplora, manipola, fa cadere e magari assaggia poco o nulla. Capisco che nessuno ami buttare via cibo, ma ricordiamoci una cosa fondamentale:

Nel BLW il cibo non è solo nutrimento: è strumento di apprendimento.

Il bambino sta sviluppando:

la coordinazione occhio-mano

la motricità fine

la percezione sensoriale (texture, colori, odori)

l’autonomia decisionale

la relazione positiva con il cibo

Tutto questo ha valore, anche se il piatto rimane mezzo pieno.

“Ma spreca!”
Sì, all'inizio è normale. Non sta “sprecando”, sta imparando. Esattamente come quando impara a camminare e cade cento volte: nessuno direbbe che “ha sprecato dei passi”.

“Io gli ripropongo lo stesso piatto per tre giorni”
Capisco il desiderio di evitare sprechi, ma attenzione: riciclare lo stesso piatto troppe volte non è sempre sicuro né utile. Meglio offrire piccole quantità alla volta, osservare cosa gradisce, e variare il più possibile. Il cibo deve restare una scoperta, non un’ansia.

Educare alla consapevolezza non passa solo dal “non sprecare”, ma anche dal valorizzare i processi di crescita. Il rispetto per il cibo include anche il rispetto per chi lo sta conoscendo per la prima volta.

Facciamoci una domanda: se un bambino “spreca” una manciata di piselli mentre scopre come si prendono tra le dita, è davvero spreco? O è un investimento nel suo sviluppo?

DOMANDE RICORRENTI



Crackers e grissini nello svezzamento: sicuri o no?

Quando si parla di alimenti ad alto rischio di soffocamento nei bambini piccoli, spesso ci sono opinioni contrastanti.

Il problema dei grissini: hanno una forma cilindrica, perfetta per occludere completamente le vie respiratorie se ingeriti interi o i pezzi grossi.

Il problema dei crackers: si spezzano in modo imprevedibile, con spigoli duri che possono graffiare il palato e risultare difficili d gestire per bambini inesperti. Un piccolo può trovarsi preso alla sprovvista senza avere ancora le competenze motorie e di deglutizione necessarie, con conseguente rischio di soffocamento.

Cosa dicono le fonti aggiornate? Vediamo alcuni esperti a confronto.

Missione Crescere (Polina, esperta di autosvezzamento e operatrice BLSD) e Arianna Nutrimini, nutrizionista pediatrica, inserisco crackers e grissini tra i primissimi alimenti ad alto rischio di soffocamento.

Anche il Ministero della Salute nelle sue linee guida raccomanda cautela, consigliando di offrirli solo sbriciolati o bagnati fino a quando i bambini non hanno acquisito adeguata competenza masticatoria e deglutitoria.

Le stesse raccomandazioni emergono anche nelle linee guida internazionali su svezzamento sicuro e prevenzione del soffocamen (ad es. AAP – American Academy of Pediatrics).

Ma non tutti concordano:

La pediatra Carla nel suo libro classifica crackers e grissini come "sicuri dai 6 mesi". Una posizio.ne che lascia perplessi, perché n in linea con quanto affermato da altri esperti né con le raccomandazioni istituzionali.

Cosa possiamo fare come genitori?

Ricordarci che le fonti non sono tutte uguali e non sempre aggiornate.

Valutare con spirito critico le indicazioni ricevute.

Mettere al primo posto sicurezza e buon senso: se un alimento ha caratteristiche fisiche a rischio, come in questo caso per forma consistenza, meglio rimandarlo o proporlo in forma modificata (sbriciolato, ammorbidito, spezzettato).

I nostri consigli: non offrirli ad inizio svezzamento, ma quando il bambino ha raggiunto capacità masticatorie buone ed esperienza. Non c'è un età, valutate il bambino, l'alimento, la friabilità.

Ma NON ad inizio svezzamento.

Alla fine, sta a noi genitori ragionare autonomamente, informarci e trarre le nostre conclusioni, sempre con l'obiettivo di offrir esperienze alimentari sicure e serene ai nostri bambini.

DOMANDE RICORRENTI



Perché i tagli sicuri nel BLW all'estero sono diversi da quelli italiani?
Se segui profili stranieri che parlano di Baby-Led Weaning, probabilmente ti sarai accorta che i tagli di cibo proposti sono molto più grandi rispetto a quelli consigliati in Italia.
Ma perché questa differenza?
All'estero (es. Regno Unito, Canada, Australia, USA):
l'obiettivo principale è favorire la presa autonoma del bambino, anche se il pezzo risulta "grande" rispetto agli standard italiani.
il cibo viene spesso offerto in formato finger food lungo e spesso, fette intere, cosce di pollo o tagli che il bambino possa rosicchiare.
non si segue una misura precisa in centimetri, ma si valuta in base alla motricità del bambino.
In Italia, invece:
si tende ad applicare regole molto rigide, come la larghezza massima di 1–1,5 cm per gli stick, per prevenire il soffocamento.
in molti casi, si propone direttamente carne sfilacciata o in pezzettini, anche quando il bambino non ha ancora sviluppato la presa a pinza per gestirli.
questo approccio, seppur ben intenzionato, secondo il BLW può ostacolare l'autonomia e rendere più difficile la gestione del cibo.

Cosa tenere davvero in considerazione per la sicurezza?

Il pezzo deve essere facile da afferrare a pugno (presa palmare),
Deve essere abbastanza lungo da sporgere dalla mano (5–6 cm circa),
La consistenza è fondamentale: deve potersi schiacciare tra le dita o con le gengive.

In conclusione:
All'estero si punta sull'obiettivo: rendere il bambino capace di gestire il cibo da solo in modo sicuro, anche se il pezzo può sembrare grande.
In Italia, invece, ci si concentra spesso sulla misura esatta... ma a volte si perde di vista l'intento del BLW, che è proprio l'autonomia guidata e sicura.

Ricorda: il pezzo "giusto" non è quello più piccolo, ma quello più adatto alle mani e alle capacità del tuo bambino.

Questa pagina diretta ad un pubblico italiano segue le regole di sicurezza alimentari italiane.
Nessuno dei due metodi è errato. Il primo punta ad agevolare la manipolazione, il secondo a ridurre maggiormente il rischio soffocamento.

Per i tagli esteri, leggi sempre la descrizione. Troverai livelli di rischio indicati con basso, medio, alto. Segui le indicazioni che riportano. Alcuni tagli sono pericolosi, loro lo sanno e lo scrivono.

DOMANDE RICORRENTI

SERVONO I DENTINI? MIO FIGLIO NON HA NESSUN DENTE.

I primi dentini utili alla masticazione escono tra i 10 e i 16 mesi, a volte anche più tardi. Gli ultimi spuntano tra i 20 e i 30 mesi.
Va da sé che, se servissero i denti, nessun bambino potrebbe essere svezzato prima dell'anno o oltre.
La risposta quindi è: no, non servono i dentini per iniziare.
I bambini masticano perfettamente con le gengive, che sono anche molto forti.

MIO FIGLIO NON MANIPOLA E NON TOCCA IL CIBO.

Se tuo figlio non manipola, non tocca il cibo e non mostra interesse, vuol dire che non è ancora pronto.
Cosa fare? Assolutamente nulla: aspetta pazientemente che lo sia :)

MIO FIGLIO NON PORTA LE COSE ALLA BOCCA, LE STRITOLA E LE LANCIA A TERRA.

Tuo figlio sta imparando: sta studiando il cibo, le consistenze.
Attraverso il gioco, incamera tante informazioni.
Va benissimo, non importa. Non preoccuparti se ancora non porta il cibo alla bocca.
Questa fase precede quella dell'assaggio: lascialo fare, non interferire.
Dopo prenderà il latte, non resterà a stomaco vuoto.

MIO FIGLIO MANGIA SOLO DUE O TRE FUSILLI E POI SI STUFA.

Va benissimo anche questo: è una sua scelta mangiare tanto, poco o nulla.
Ha i suoi tempi, e vanno rispettati.
Non andare in ansia per un "ha mangiato poco":
il latte rimane l'alimento principale, e l'alimentazione è solo complementare.
Col tempo, quei fusilli aumenteranno. Già ora è un grande traguardo.

MIO FIGLIO SI INARCA SUL SEGGIOLONE, DOPO POCO SI INNERVOSISCE E VUOLE SCENDERE.

Offri sempre il latte prima di metterlo a tavola con te.
Il bambino non deve arrivare affamato a tavola: deve essere sereno per sperimentare.
Un bambino affamato avrà:

più gag reflex,

sarà nervoso,

non vorrà manipolare gli alimenti,

e soprattutto, non mangerà.

Se si inarca con la schiena, può dipendere da questo, oppure dal fatto che non ha ancora raggiunto una posizione seduta autonoma.
In quel caso, dopo poco prova fastidio e si inarca.

Il bambino che non si siede ancora da solo, ma che riesce a stare dritto con un supporto, può comunque restare sul seggiolone... ma solo per il tempo necessario al pasto.

HO PAURA CHE SOFFOCA

Il rischio di soffocamento nel Baby-Led Weaning non è maggiore, che nello svezzamento classico. Lo dice la scienza. Segui i tagli e formati sicuri.

I MIEI PARENTI HANNO DETTO CHE SIAMO MATTI. NESSUNO CI SOSTIENE, NEANCHE LA PEDIATRA, CHE CI CONSIGLIA UNO SVEZZAMENTO CLASSICO.

I tuoi parenti hanno già svezzato i loro figli. Ora è il tuo turno: quello di scegliere lo svezzamento che tu ritieni giusto per il tuo bambino.
Se la tua pediatra non ti sostiene ed è favorevole solo allo svezzamento classico, ti consigliamo di sceglierne un'altra che appoggi questo metodo.

Ricorda: puoi anche fare da sola, perché lo svezzamento NON È UN ATTO MEDICO


Proteine in svezzamento
FREQUENZE SETTIMANALI
01
LEGUMI
almeno 4-5
porzioni
02
CARNE
max 2 porzioni
03
PESCE
4 porzioni
04
FORMAGGI
2 porzioni
05
UOVO
1-2 porzioni
06
CARNE
max 1 porzione
@nutri_kids_simo

Gag Reflex

I gag reflex non devono essere una limitazione nel momento in cui si inizia con il BLW. Di fatto sono una parte naturale e necessaria per il processo di apprendimento del tuo bambino.
Quando dai l'opportunità al bambino, di sperimentare e superare i gag reflex, in realtà lo stai aiutando a sviluppare le sue abilità e diventare autonomo e sicuro di se stesso.

I bambini sono incredibilmente capaci, di gestire questo momento da soli.
Andare incontro al soffocamento è molto raro, tutto quello che ti fa paura, fa parte del processo di apprendimento.

I gag reflex sono un riflesso naturale del bambino, che lo protegge dal soffocamento.

È una parte normale del processo di apprendimento ed è una cosa buona.

Quando succede, dagli la possibilità di gestire il momento da solo.

Mantieni la calma.
Supervisiona la situazione e la sua sicurezza.
Incoraggialo ad apprendere.
Non trasmettere la tua ansia.

Il soffocamento può capitare con qualsiasi metodo di alimentazione complementare, siano pappe (metodo tradizionale) che solidi (BLW).
Offriamo sempre cibo in maniera sicura, seguendo le guide ed i tagli che ogni alimento ha.



Gag reflex
Fa rumore (tossisce, conati)
Respira
Sta gestendo da solo
Normale nel BLW

Soffocamento
Silenzio
Non respira / fatica a respirare
Può diventare blu
Emergenza → intervenire subito