96年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員(不含牙醫師、助產師、職能治療師)、中醫師、心理師、營養師、獸醫佐考試暨醫師考試分試考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：醫師、醫師㈠
科　　目：醫學㈠(包括解剖學、胚胎學、組織學、微生物免疫學、寄生蟲學、公共衛生學等科目及其臨床相關知識)
考試時間：2小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共100題，每題1分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 大拇指的內收動作（adduction），可作爲檢查那一條神經的功能是否完整？
㈠橈神經　㈡正中神經　㈢尺神經　㈣前臂橈神經

2 精索靜脈曲張（varicocele）的現象：
㈠好發於左側　㈡好發於右側　㈢發生率兩側差不多　㈣很少發生

3 一中年女性主訴手指會麻，下列那一部位的感覺缺失可使醫師確認受傷的神經是尺神經（ulnar nerve）？
㈠大拇指的掌面（palmar surface of thumb）
㈡前臂掌面的尺側（ulnar side of the volar surface of forearm）
㈢小指的掌面（palmar surface of the 5th finger）
㈣手背近虎口處（dorsum of hand between the thumb and the 2nd finger）

4 臨床檢查發現病人肋間動脈（intercostal arteries）變大，甚至可摸到脈搏跳動，且X光片顯示肋骨下緣有動脈增大的切跡，這些現象顯示病人最可能患有：
㈠先天性橫膈缺損　㈡主動脈狹窄（coarctation of aorta）
㈢開放性卵圓孔（oval foramen）　㈣臍動脈（umbilical artery）閉鎖不全

5 下列何者與橈神經（radial nerve）伴行並通行於橈神經溝？
㈠旋肱後動脈（posterior circumflex humeral artery）
㈡旋肱前動脈（anterior circumflex humeral artery）
㈢肱深動脈（profunda brachii artery）
㈣橈側返動脈（radial recurrent artery）

6 下列何者的起始點（origin）不在肱骨？
㈠喙肱肌（coracobrachialis）　㈡肱肌（brachialis）
㈢肱橈肌（brachioradialis）　㈣掌長肌（palmaris longus）

7 若病人同時出現動眼（oculomotor）神經、外旋（abducent）神經、滑車（trochlear）神經與三叉神經之眼神經（ophthalmic nerve）與上頷神經（maxillary nerve）的缺損，其病灶部位最可能是在下列何處？
㈠眼窩（orbital fossa ）　㈡框上裂（superior orbital fissure）
㈢海綿竇（cavernous sinus）　㈣橋腦（pons）

8 足底長韌帶（long plantar ligament）前端附著於下列何骨？
㈠楔狀骨（cuneiform）　㈡距骨（talus）　㈢舟狀骨（navicular）　㈣骰骨（cuboid）

9 下列有關喉部（larynx）之敘述，何者錯誤？
㈠喉室（ventricle）位於前庭襞（vestibular fold）及聲襞（vocal fold）之間
㈡聲帶肌（vocalis muscle）位於聲襞之內
㈢環杓側肌與環杓後肌（lateral and posterior cricoarytenoid muscles）相互拮抗，控制前庭裂（rima vestibuli）之開關
㈣橫杓肌（transverse arytenoid muscle）收攏左右的杓狀軟骨（arytenoid cartilages）

10 下列何者構成股三角（femoral triangle）的內側緣？
㈠內收長肌（adductor longus）　㈡恥骨肌（pectineus）
㈢縫匠肌（sartorius）　㈣股薄肌（gracilis）

11 臀肌粗隆（gluteal tuberosity）位於何處？
㈠髂骨（ilium） ㈡坐骨（ischium） ㈢恥骨（pubis） ㈣股骨（femur）

12 臀上神經受到壓迫損傷，下列何者的功能最不受影響？
㈠臀大肌 ㈡臀中肌 ㈢臀小肌 ㈣闊筋膜張肌

13 下列何者會通過坐骨小孔？
㈠臀小肌 ㈡梨狀肌 ㈢上孖肌 ㈣閉孔內肌

14 負責傳遞舌前三分之二段味覺之神經纖維，其細胞體位於：
㈠翼腭神經節（pterygopalatine ganglion） ㈡膝狀神經節（geniculate ganglion）
㈢下頜下神經節（submandibular ganglion） ㈣三叉神經節（trigeminal ganglion）

15 下列有關腰、薦部位（lumbar and sacral regions）的敘述何者錯誤？
㈠腸骨嵴間線（intercrestic line）的中點是腰椎穿刺的指標點
㈡薦三角（sacral triangle）的底是腸骨後上棘（posterosuperior iliac spine）的連線
㈢薦三角爲薦椎在體表的投射位置
㈣薦孔（sacral hiatus）的位置無法由體表觸知

16 右肺門（hilum）正後方的溝（或切跡）是由何結構造成的？
㈠食道 ㈡動脈弓 ㈢奇靜脈 ㈣上腔靜脈

17 與第七胸椎橫突形成關節的是肋骨上的那一項構造？
㈠肋骨頭關節面 ㈡肋骨頸 ㈢肋骨小節 ㈣肋骨體

18 下列有關大腦靜脈的敘述，何者錯誤？
㈠上大腦靜脈（superior cerebral vein）注入上矢狀竇（superior sagittal sinus）處易扯斷，造成硬腦膜下出血
㈡上矢狀竇的血液大部分流向左橫竇
㈢岩上竇（superior petrosal sinus）注入乙狀竇（sigmoid sinus）
㈣乙狀竇（sigmoid sinus）注入內頸靜脈（internal jugular vein）

19 下列何者爲泌尿生殖膈的一部分？
㈠梨狀肌 ㈡提肛肌 ㈢會陰深橫肌 ㈣尿道海綿體肌

20 尿道球腺的開口於：
㈠膜部尿道 ㈡陰莖尿道 ㈢骨盆橫膈 ㈣泌尿生殖膈

21 小腦的攀緣纖維（climbing fibers）主要徑行於下列何者？
㈠脊髓小腦前徑（anterior spinocerebellar tract） ㈡脊髓小腦後徑（posterior spinocerebellar tract）
㈢楔狀核小腦徑（cuneocerebellar tract） ㈣橄欖小腦徑（olivocerebellar tract）

22 下列有關十二指腸的敘述何者錯誤？
㈠膽管及胰管開口於十二指腸
㈡十二指腸第一段位在肋下平面（subcostal plane）的高度
㈢十二指腸第二段在右腎門內側下行
㈣ Treitz 韌帶將十二指腸固定在右橫膈腳

23 下列何者爲造成硬腦膜外出血（epidural hematoma）之最可能原因？
㈠大腦動脈環（arterial circle of cerebrum）上血管瘤破裂
㈡上頜動脈（maxillary artery）出血
㈢腦膜中動脈（middle meningeal artery）破裂
㈣大腦前動脈（anterior cerebral artery）出血

24 下列何結構是由後腦（metencephalon）衍生而來？
㈠延腦（medulla oblongata） ㈡小腦（cerebellum）
㈢丘腦（thalamus） ㈣下丘腦（hypothalamus）

25 腭帆張肌（tensor veli palatini）與下列何肌受相同顱神經支配？
㈠顳肌（temporal muscle） ㈡胸鎖乳突肌（sternocleidomastoid muscle）
㈢二腹肌後腹（posterior belly of digastric muscle） ㈣下直肌（inferior rectus muscle）

26 自鍾骨（stapes）及砧骨（incus）之間穿過者爲：
㈠鼓室神經（tympanic nerve）　㈡岩大神經（greater petrosal nerve）
㈢鼓索神經（chorda tympani nerve）　㈣岩小神經（lesser petrosal nerve）

27 大腦動脈環（arterial circle of cerebrum）不包括：
㈠椎動脈（vertebral artery）　㈡大腦前動脈（anterior cerebral artery）
㈢大腦後動脈（posterior cerebral artery）　㈣後交通枝（posterior communicating artery）

28 翼腭窩（pterygopalatine fossa）與其周邊之連通經由：
㈠上頷孔（maxillay foramen）進入硬腭黏膜
㈡翼管（pterygoid canal）接受交感神經節前纖維
㈢圓孔（foramen rotundum）接受第五顱神經之第二支
㈣翼腭孔（pterygopalatine foramen）進入鼻腔

29 透明膜（hyaline membrane）這種疾病與胎兒肺部在下列何時期發育不良有關？
㈠僞腺期（pseudoglandular period）　㈡小管期（canalicular period）
㈢末囊期（terminal sac period）　㈣肺泡期（alveolar period）

30 下列何構造不是由中胚層細胞衍生成的？
㈠軟骨　㈡乳腺　㈢腎上腺皮質部　㈣脾

31 肺臟發育過程中，下列何者從心包腹膜管（pericardioperitoneal canal）的外側生長出來，且位於發育肺臟的下方？
㈠橫隔（septum transversum）　㈡胸腹膜（pleuroperitoneal membrane）
㈢靜脈竇（sinus venosus）　㈣胸心包膜（pleuropericardial membrane）

32 法勒氏四聯症（tetralogy of Fallot）中之跨騎主動脈（overriding aorta）症，其成因應爲：
㈠球嵴（bulbar ridge）及動脈幹嵴（truncal ridge）尚未分隔動脈幹
㈡心室間隔（interventricular septum）之缺損
㈢動脈導管之異常閉鎖
㈣第一中隔（septum primum）未與心內膜墊相融合

33 有關萊氏細胞（Leydig cell），下列敘述何項錯誤？
㈠位於細精管（seminiferous tubule）間的間質（interstitial tissue）
㈡具有大量的粗糙性內質網（RER）
㈢細胞質含有 Reinke 氏結晶體
㈣細胞質含有管狀嵴的粒線體（tubular cristae mitochondria）

34 消化道中，下列何者可用銀染色法染上？
㈠腸內分泌細胞（enteroendocrine cells）　㈡頸黏液細胞（mucous neck cells）
㈢主細胞（chief cells）　㈣壁細胞（parietal cells）

35 有關呼吸系統，下列敘述何者錯誤？
㈠鼻腔內之黏膜（mucosa）可以溫暖，濕潤及過濾吸入之空氣
㈡ Bowman’s 腺可分泌漿液（serous），以去除已被偵測過之殘餘氣味物質
㈢鼻腔內之上皮組織屬於過渡性上皮（transitional epithelium）
㈣嗅上皮（olfactory epithelium）是僞複層柱狀上皮

36 在中樞神經系統，髓鞘是由那種細胞所構成？
㈠微小膠細胞　㈡寡樹突膠細胞　㈢星狀膠細胞　㈣室管膜細胞

37 下列何者不屬於單核吞噬細胞系統（mononuclear phagocytotic system）？
㈠組織細胞（histiocytes）　㈡破骨細胞（osteoclasts）
㈢肥大細胞（mast cells）　㈣庫弗氏細胞（Kupffer cells）

38 在白血球生成過程中，特異性顆粒（specific granule）最早出現於下列何者？
㈠髓細胞（myelocytes）　㈡成髓細胞（myeloblasts）
㈢前髓細胞（promyelocytes）　㈣後髓細胞（metamyelocytes）

39 下列何者不是中間絲蛋白（intermediate filament protein）？
㈠膠細胞纖維酸性蛋白（glial fibrillary acidic protein）
㈡纖維蛋白原（fibrinogen）
㈢結蛋白（desmin）
㈣神經絲蛋白（neurofilament protein）

40 腸內桿菌科（Enterobacteriaceae）細菌對下列何種糖類的發酵能力，常被用來作爲初步鑑定之用？
㈠葡萄糖（glucose）　㈡蔗糖（sucrose）
㈢乳糖（lactose）　㈣阿拉伯糖（arabinose）

41 下列有關披衣菌（Chlamydiaceae）的實驗診斷之敘述，何者錯誤？
㈠由感染部位採集到的膿，是最適當的檢體
㈡只有細胞培養（cell culture）法能用以分離此類細菌
㈢血清學試驗不易區分現在或過去的感染
㈣偵測其脂多醣體（lipopolysaccharide）的免疫螢光染色法，專一性較差

42 細菌內毒素（endotoxin）的產生來自：
㈠細菌代謝產物　㈡纖毛　㈢革蘭氏陽性菌細胞壁　㈣革蘭氏陰性菌細胞壁

43 下列何種內耳結構退化與老年失聰（presbycusis）最不相關？
㈠前庭神經節細胞（vestibular ganglion cells）　㈡血管紋（stria vascularis）
㈢內毛細胞（inner hair cells）　㈣外毛細胞（outer hair cells）

44 能製造白喉毒素的白喉桿菌具有下列何項特質？
㈠爲不溶血菌落　㈡具有莢膜　㈢具有潛溶性的β-噬菌體　㈣能代謝尿素

45 下列何種 DNA 病毒可造成先天性感染？
㈠巨細胞病毒（cytomegalovirus）　㈡ EB 病毒（Epstein-Barr virus）
㈢人類疱疹病毒第八型（HHV8）　㈣腺病毒（adenovirus）

46 下列何者具有肌間盤（intercalated disc）？
㈠心肌　㈡骨骼肌　㈢豎毛肌　㈣平滑肌

47 下列何者爲肺炎鏈球菌（*Streptococcus pneumoniae*）、腦膜炎雙球菌（*Neisseria meningitides*）和流行性感冒嗜血桿菌（*Haemophilus influenzae*）引起細菌性腦膜炎共同的致病因子？
㈠蛋白質 A（protein A）　㈡內毒素（endotoxin）
㈢β-內醯胺酶（β-lactamase）　㈣莢膜（capsule）

48 單內醯胺（monobactam）屬於β-內醯胺類的抗生素，但與其他同類藥物相較，其抗菌範圍較爲狹窄只可對抗何類細菌？
㈠革蘭氏陰性厭氧菌　㈡革蘭氏陽性厭氧菌　㈢革蘭氏陰性嗜氧菌　㈣革蘭氏陽性嗜氧菌

49 下列關於實驗室診斷病毒性疾病之敘述，何者爲錯？
㈠細胞學（cytology）檢查主要是觀察病毒感染後引起的細胞病變（cytopathologic effect）
㈡電子顯微鏡可觀察病毒顆粒，但不用於臨床常規檢查
㈢病毒的分離與增殖是證明病毒感染的最重要指標
㈣病毒基因物質（RNA 或 DNA）的檢查，可偵測檢體中有活病毒的存在

50 下列那一項有關 DNA 病毒之特性不正確？
㈠基因體可爲雙股或單股　㈡必須在細胞核內複製
㈢可具套膜　㈣相較於 RNA 病毒，基因體變異性較少

51 下列那一種病毒不是藉由呼吸道傳播？
㈠鼻病毒（rhinoviruses）　㈡冠狀病毒（coronaviruses）
㈢水痘病毒（chicken pox viruses）　㈣ C 型肝炎病毒（HCV）

52 拉薩熱（Lassa fever）屬第四級傳染原，可經由動物傳給人類，此傳染原屬沙狀病毒（arenavirus），其基因體爲：
㈠一個雙股 RNA　㈡二個環形負（－）股 RNA 遺傳體
㈢一個正（＋）股 RNA　㈣一個負（－）股 RNA

53 有關肝炎病毒，下列之敘述何者錯誤？
㈠ HAV 及 HEV 是糞－口途徑傳播
㈡ HBV 及 HCV 可能經由血液傳染
㈢ HAV、HBV、HCV 及 HDV 均是單股（single-stranded）RNA 病毒
㈣ HBV 是含有套膜（envelope）的病毒

54 下列關於小兒麻痺病毒（poliovirus）之敘述，何者正確？
㈠分類上屬於小 RNA 病毒科（Picornaviridae），只有一種血清型
㈡其疫苗有去活性的（inactivated）沙賓疫苗，及減毒活性的（live attenuated）沙克疫苗
㈢感染後大部分人出現中樞神經症狀，少部分人爲無症狀感染
㈣麻痺性脊髓灰白質炎（paralytic poliomyelitis）主要是因爲此病毒感染脊髓前角細胞所致

55 下列關於第一型人類免疫缺乏病毒（HIV-1）混合性療法（combination therapy）的敘述，何者爲錯？
㈠又名 HAART（highly active antiretroviral therapy）
㈡包括反轉錄酶抑制劑（reverse transriptase inhibitors）及蛋白酶抑制劑（protease inhibitor）的組合
㈢可根除體內的 HIV-1 病毒
㈣可降低愛滋病患的死亡率及感染其他疾病的罹病率

56 下列何種 RNA 病毒可造成胎兒感染及嚴重的先天性畸形發育？
㈠巨細胞病毒（CMV）　㈡德國麻疹病毒（rubella virus）
㈢人類細小病毒（parvovirus）B19　㈣水痘－帶狀疱疹病毒（VZV）

57 下列關於真菌的抵抗力之敘述，何者爲錯？
㈠對乾燥、陽光和紫外線抵抗力較強　㈡對一般消毒劑抵抗力較強
㈢耐熱，60℃一小時不會被殺死　㈣對抗細菌性抗生素不敏感

58 黃麴毒素損害的主要器官是：
㈠肺臟　㈡肝臟　㈢腎臟　㈣脾臟

59 新型隱球菌（*Cryptococcus neoformans*）以何種孢子進行繁殖？
㈠孢子囊孢子　㈡厚膜孢子　㈢分生孢子　㈣芽生孢子

60 疱疹病毒感染常造成病毒在宿主體內建立潛伏性感染，其中水痘－帶狀疱疹病毒（VZV）造成幼童出現水痘以及成年人之帶狀疱疹，此病毒在下列何者建立潛伏性感染？
㈠皮膚　㈡肝臟　㈢神經細胞　㈣脾臟

61 白色念珠菌（*Candida albicans*）所引起的鵝口瘡多見於：
㈠新生嬰兒　㈡兒童　㈢青少年　㈣成年人

62 小王由於白血病必須進行骨髓移植，他只有一位親弟弟，他這位弟弟進行 HLA 檢驗，則 HLA 完全與他符合的機會大約爲多少%？
㈠100　㈡ 75　㈢ 50　㈣ 25

63 下列有關交感性眼炎（sympathetic ophthalmia）的敘述，何者正確？
㈠由於交感性神經炎（sympathetic neuritis）引起的眼病變
㈡雙眼喪失協調性
㈢罕見的由於自體免疫反應引起的雙眼病變
㈣雙眼外旋肌的炎症

64 引發第一型過敏免疫反應的呼吸道疾病時，下列那一項有關過敏原特性的描述最恰當？
㈠常具有酵素活性　㈡常是大分子的蛋白質
㈢此類分子通常水溶性差　㈣此類分子通常不太穩定

65 下列何者爲不參與細胞毒殺作用的分子？
㈠穿孔素（perforin）和顆粒相關酵素（granule-associated enzymes；granzymes）
㈡ FasL 和 Fas 的作用
㈢氧反應代謝物（reactive oxygen intermediates）和一氧化氮（NO）
㈣整合凝集素（integrin）和纖維網蛋白（fibronectin）的作用

66 下列關於細胞黏著分子（adhesion molecule）的敘述，何者錯誤？
㈠內皮細胞上的黏著分子包括 E-selectin、P-selectin 和 L-selectin，屬於免疫球蛋白家族成員
㈡整合凝集素（integrin）屬於黏著分子，由兩條非共價鍵結合的蛋白鏈組成
㈢選擇凝集素（selectin）與糖類分子結合
㈣細胞激素（cytokine）會誘發黏著分子在內皮細胞上表現

67 下列關於 T 細胞的敘述，何者正確？
㈠是在淋巴結的生長中心（germinal center）聚集最多的細胞
㈡可幫助 B 細胞抗體重鏈類型的轉換（isotype switching）
㈢可經由 IL-12 的作用而分化爲 Th2 形式的細胞
㈣直接參與第一型過敏反應（type-1 hypersensitivity）

68 下列那一項是屬於 IgE 媒介的過敏免疫反應（IgE-mediated hypersensitivity）所引起的疾病：
㈠全身性對藥物反應的休克（anaphylaxis）
㈡植物葉面油質所引起的皮膚紅腫
㈢長期感染病原菌所引起的肉芽腫組織（granulomatous）
㈣自體免疫疾病所引起的腎絲球腎炎（glomerulonephritis）

69 抗體之效用功能（effector functions）是由下列那一項決定？
㈠輕鏈（light chain）的變異區（variable region）
㈡輕鏈（light chian）的不變區（constant region）
㈢重鏈（heavy chain）的變異區（variable region）
㈣重鏈（heavy chain）的不變區（constant region）

70 下列何者是輔助型 T 細胞（helper T cell）的共同接受器（co-receptor）？
㈠CD2 ㈡ CD3 ㈢ CD4 ㈣ CD8

71 抗體與抗原之結合不依賴：
㈠共價鍵（covalent bonds） ㈡靜電作用（electrostatic interactions）
㈢氫鍵（hydrogen bonds） ㈣凡德瓦爾力（van der Waals forces）

72 下列何者是屬於補體的 C3 轉化酶（C3 convertase）？
㈠C5b67 ㈡ C3a ㈢ C3b ㈣ C3bBb

73 下列何種免疫反應是淋巴系統（lymphoid system）的主要功能？
㈠先天性的免疫反應（innate immunity） ㈡適應性免疫反應（adaptive immunity）
㈢發炎反應（inflammation） ㈣吞噬作用（phagocytosis）

74 患者因肛門嚴重搔癢就診，並出現脫肛（rectal prolapse）症狀時，你應懷疑受到下列何種寄生蟲感染？
㈠蛔蟲（*Ascaris lumbricoides*） ㈡美洲鉤蟲（*Necator americanus*）
㈢鞭蟲（*Trichuris trichiura*） ㈣蟯蟲（*Enterobius vermicularis*）

75 下列何分子不會聚集在 T 細胞和抗原呈獻細胞的免疫胞突接合處（immunological synapse）？
㈠TCR ㈡ CD4/CD8 ㈢ CD28 ㈣ CD19

76 被下列那一種人體寄生蟲嚴重感染後，患者會出現腸阻塞（bowel obstruction）的臨床症狀？
㈠橫川氏吸蟲（*Metagonimus yokogawai*） ㈡旋毛蟲（*Trichinella spiralis*）
㈢蛔蟲（*Ascaris lumbricoides*） ㈣棘顎口線蟲（*Gnathostoma spinigerum*）

77 下列何者不是人類幼裂條蟲症（sparganosis）的感染途徑？
㈠喝入的飲水含有已感染寄生蟲之水蚤 ㈡生食已感染寄生蟲之蛙肉或蛇肉
㈢將已感染寄生蟲之蛙肉或蛇肉敷在傷口 ㈣生食已感染寄生蟲之魚肉

78 青蒿素（artemisinin）的殺傷對象是：
㈠血液裂殖體（blood schizonts） ㈡肝臟裂殖體（liver schizonts）
㈢休眠子（hypnozoites） ㈣配子母細胞（gametocytes）

79 下列何者之蟲卵可隨血液循環到腦或脊髓，形成肉芽腫，引起癲癇、神經缺陷？
㈠棘口吸蟲（*Echinostoma* spp.）　㈡異形吸蟲（*Heterophyes heterophyes*）
㈢牛羊肝吸蟲（*Fasciola hepatica*）　㈣薑片蟲（*Fasciolopsis buski*）

80 下列有關瘧疾的敘述，何者錯誤？
㈠寄生蟲病中，導致全球每年患者死亡人數最多的是瘧疾
㈡惡性瘧原蟲的配子母細胞（gametocytes）呈新月形
㈢熱帶性巨脾病（tropical splenomegaly syndrome）是瘧疾的併發症之一
㈣惡性瘧患者因紅血球破壞嚴重，因而常導致腎病症候群

81 某君爲退休之非洲農耕隊隊員，近日因眼睛有畏光及視力模糊等現象而求醫。經檢查後發現病人之角膜有死亡之微絲蟲，詢問病史，病人陳述多年前在非洲河邊曾被蚋（*Simulium* spp.）叮咬，但當時不以爲意，請問某君最可能感染何種寄生蟲？
㈠羅阿絲蟲（*Loa loa*）　㈡蟠尾絲蟲（*Onchocerca volvulus*）
㈢斑氏絲蟲（*Wuchereria bancrofti*）　㈣馬來絲蟲（*Brugia malayi*）

82 某研究探討含鉛油漆暴露與兒童智能發展遲緩之相關性，此研究所牽涉的變項包括種族（黑人或白人）、年齡（歲）、以及油漆暴露之程度（按濃度高低分爲四級），下列那一個選項的變項依序爲 nominal、ordinal、以及 ratio 尺度？
㈠油漆暴露之程度、種族、年齡　㈡年齡、種族、油漆暴露之程度
㈢種族、油漆暴露之程度、年齡　㈣油漆暴露之程度、年齡、種族

83 采采蠅（tse-tse fly）可以媒介下列何種寄生蟲病？
㈠黑熱病（kala azar）　㈡睡眠病（sleeping sickness）
㈢查加斯氏病（Chagas' disease）　㈣利什曼症（Leishmaniasis）

84 下列有關生物統計的敘述何者正確？
㈠以平均值來表達集中趨勢不會受到極端值之影響
㈡自變項與依變項都是類別變項時，以 ANOVA 檢定最佳
㈢自變項與依變項都是等距變項時，可以使用線性迴歸（linear regression）
㈣自變項是類別變項，依變項是等距變項時，以卡方檢定爲佳

85 在臨床實驗欲評估三組藥物降血壓數值何種藥物最有效果，可利用何種檢定方法最適當？
㈠卡方檢定　㈡變異數分析　㈢適合度檢定　㈣配對 t 檢定

86 若打算研究維他命 D 之攝取與癌症發生間的關係，找一群人依其近一星期的飲食習慣計算維他命 D 每日平均攝取量，對最高的四分之一和最低的四分之一追蹤數年後比較癌症之發生率，則本研究爲下列何種流行病學研究的設計？
㈠世代研究（cohort study）　㈡個案對照研究（case-control study）
㈢臨床試驗研究（clinical trial）　㈣橫斷式研究（cross-sectional study）

87 梅毒（syphilis）先使用 VDRL 檢測呈陽性，再使用 TPHA 測定亦呈陽性，才可以認定爲陽性，稱爲系列檢定（tests in series），其目的在於增加：
㈠敏感性（sensitivity）　㈡特異性（specificity）　㈢發生率（incidence）　㈣盛行率（prevalence）

88 傳染代隔（generation time）是指宿主得到感染至產生最大感染力之時間。如果傳染代隔越短，則：
㈠流行曲線較趨緩　㈡流行發生來得較慢　㈢流行曲線不受影響　㈣流行發生來得較快

89 在二手菸對於肺氣腫的病例對照研究中，選擇對照組的主要目的是：
㈠估計背景族群（source population）暴露之比例
㈡估計背景族群（source population）疾病之發病率
㈢去除安慰作用（placebo effect）
㈣增加取樣的效率

90 下列何者不是行政院衛生署社區健康營造計畫的目標？
㈠結合社區熱心人士及公益團體　㈡培養民眾健康生活型態
㈢發現及處理社區主要健康問題　㈣減少社區對健康的參與

91 隔離措施對下列何種傳染病的防治效果最差？
㈠天花（small pox） ㈡鼠疫（plague）
㈢霍亂（cholera） ㈣流行性感冒（influenza）

92 關於腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome），下列何者錯誤？
㈠在小指（第五指）有麻痺感
㈡在晚上（或不工作）時，大拇指和第二、第三指有痛感
㈢嚴重時手部的肌肉萎縮
㈣患者中女性較男性爲多

93 醫療人員抽血時被針頭扎傷，若患者有以下何種疾病，而醫療人員本身原未有保護性之抗體，其經血液傳染該疾病之機率爲最高？
㈠B 型肝炎（hepatitis B） ㈡ C 型肝炎（hepatitis C）
㈢人類免疫不全病毒（HIV）引起之症侯群 ㈣梅毒（syphilis）

94 以下何者不屬於水銀（汞）中毒最常見的症狀？
㈠性情變化，暴躁易怒 ㈡步履不穩
㈢腕垂症 ㈣顫抖

95 世界衛生組織在 2001 年的年度世界健康報告中，關於精神疾病之評估，下列何者正確？
㈠全球因精神疾病所造成的負擔，逐年在減少當中
㈡過去不曾有人因爲精神醫學的相關研究而獲得諾貝爾獎
㈢人類至今無法針對活人之大腦進行即時的功能性評估
㈣在基層照護（primary care）中提供精神疾病的治療，是該年度報告中的第一項建議

96 某職業病醫師想探討工廠勞工吃檳榔和口腔疾病可能的相關性，他在某工廠內問了每個工人是否有吃檳榔的習慣，同時請一個牙醫檢查口腔疾病，請問這是一個什麼樣的研究？
㈠個案對照研究（case-control study） ㈡橫斷研究（cross-sectional study）
㈢臨床試驗研究（clinical trial） ㈣世代研究（cohort study）

97 評估醫療品質，常用 Donabedian 所提出的三個構面來檢視，其中，以臨床路徑（clinical pathway）來改善醫療品質，是屬於那一個構面？
㈠背景 ㈡結構 ㈢過程 ㈣結果

98 某研究針對電鍍廠員工皮膚紅斑情形調查，發現 25 個皮膚紅斑病例，每個病例與 10 個沒有紅斑的員工配對，並對所有病例與對照組之工作場所暴露情形做調查，其結果如下：

	有皮膚紅斑	沒有皮膚紅斑
有溶劑暴露	15	50
沒有溶劑暴露	10	200

根據上面的結果，溶劑有暴露與無暴露員工得皮膚紅斑之勝算比（odds ratio）爲：
㈠1/6 或 0.16 ㈡ 1.0
㈢ 6.0 ㈣無法計算，因爲危險人口之分母爲未知

99 全民健保目前除依醫療院所層級收取不同部分負擔外，對下列那些門診費用未加重部分負擔？
㈠復健之簡單與中度治療 ㈡慢性病連續處方之藥費
㈢中醫之傷科治療 ㈣一定金額以上之藥品費用

100 在進行職業族群之標準死亡比（standardized mortality ratio，SMR）之研究時，常發現 SMR 低於 1.0，其最常見原因爲：
㈠職業族群追蹤的不完全 ㈡其他暴露因子未能完全受到考量
㈢職業暴露之錯誤分類 ㈣健康工人效應