97 年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員（不含牙醫師、助產師、職能治療師）、中醫師、心理師、營養師、獸醫佐考試暨醫師考試分試考試、97 年專門職業及技術人員高等考試法醫師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：醫師、醫師㈠
科　　目：醫學㈠（包括解剖學、胚胎學、組織學、微生物免疫學、寄生蟲學、公共衛生學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共100題，每題1分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 天幕脫疝（tentorial herniation）時，何種構造最易掉入天幕切跡（tentorial notch）？
Ⓐ間腦（diencephalon）　Ⓑ顳葉（temporal lobe）
Ⓒ嗅球（olfactory bulb）　Ⓓ腦下垂體（pituitary gland）

2 下列關於直接型腹股溝疝氣（direct inguinal hernia）的敘述何者錯誤？
Ⓐ發生於腹壁下動脈（inferior epigastric artery）內側區域
Ⓑ發生於內側腹股溝窩（medial inguinal fossae）
Ⓒ腹腔內構造常由腹股溝深環（deep inguinal ring）脫出
Ⓓ發生於海氏三角（Hesselbach triangle）

3 一中年女性手指麻且肌肉萎縮，診斷爲腕隧道症候群，下列何者不通過腕隧道？
Ⓐ傳遞大拇指基部（掌面）的感覺神經分支
Ⓑ支配外展拇短肌（abductor pollicis brevis）的運動神經
Ⓒ傳遞第二指指尖（掌面）的感覺神經分支
Ⓓ尺側屈腕肌（flexor carpi ulnaris）的肌腱

4 頸動脈竇（carotid sinus）與頸動脈體（carotid body）是一壓力接受器（baroreceptor）與化學接受器（chemoreceptor）位在總頸動脈分叉處，其訊息經由那一條神經傳入頭部？
Ⓐ舌咽神經（Glossopharyngeal nerve）　Ⓑ頸襻（Ansa cervicalis）
Ⓒ副神經（Accessory nerve）　Ⓓ舌下神經（Hypoglossal nerve）

5 實施中心靜脈壓（CVP）注射時，須摸到股動脈脈搏，在何處下針？
Ⓐ脈搏處內側　Ⓑ脈搏處外側　Ⓒ脈搏處　Ⓓ脈搏處下方

6 下列上肢肌肉中，何者止（insertion）於皮膚？
Ⓐ掌長肌（palmaris longus）　Ⓑ掌短肌（palmaris brevis）
Ⓒ小魚際肌（hypothenar muscles）　Ⓓ魚際肌（thenar muscles）

7 下列何者的肌腱會從足底長韌帶（long plantar ligament）前端兩附著點間穿過？
Ⓐ腓短肌（peroneus brevis）　Ⓑ腓長肌（peroneus longus）
Ⓒ脛後肌（tibialis posterior）　Ⓓ脛前肌（tibialis anterior）

8 下列何者不屬於深筋膜（deep fascia）的構造？
Ⓐ闊筋膜（fascia lata）　Ⓑ半月板（meniscus）
Ⓒ髂脛束（iliotibial tract）　Ⓓ足底筋膜（plantar aponeurosis）

9 下列何者由尺側屈腕肌（flexor carpi ulnaris）的兩個頭之間穿過？
Ⓐ橈神經（radial nerve）　Ⓑ正中神經（median nerve）
Ⓒ尺神經（ulnar nerve）　Ⓓ尺動脈（ulnar artery）

10 下列何者發生阻塞而最不會影響臀部的血液供應？
Ⓐ臀上動脈　Ⓑ臀下動脈　Ⓒ陰部內動脈　Ⓓ旋股內側動脈

11 子宮向前傾主要由下列何者牽引所造成？
㈠懸韌帶 ㈡卵巢韌帶 ㈢子宮圓韌帶 ㈣子宮薦韌帶

12 下列何者內含卵巢動脈？
㈠懸韌帶 ㈡樞紐韌帶 ㈢卵巢圓韌帶 ㈣薦結節韌帶

13 下列何者爲女性骨盆段輸尿管的主要血液供應來源？
㈠卵巢動脈 ㈡陰道動脈 ㈢子宮動脈 ㈣陰部內動脈

14 下列何者會直接跨越輸尿管？
㈠卵巢 ㈡輸卵管 ㈢輸精管 ㈣儲精囊

15 下列何者爲尿道外括約肌（external urethral sphincter）所在處？
㈠膀胱頸 ㈡膜部尿道 ㈢前列腺尿道 ㈣陰莖部尿道

16 下列何者傳遞心包膜及縱隔部壁層胸膜的知覺？
㈠迷走神經 ㈡大內臟神經 ㈢膈神經 ㈣肋間神經

17 右心房的動脈供應主要來自下列何者？
㈠右冠狀動脈
㈡右冠狀動脈的邊緣枝（marginal branch）
㈢左冠狀動脈的迴旋枝（circumflex branch）
㈣左冠狀動脈的前室間枝（anterior interventricular branch）

18 腹主動脈（abdominal aorta）分枝爲左右總腸骨動脈（common iliac artery）處，相當於下列那個體表位置？
㈠恥骨聯合上緣 ㈡恥骨上緣與臍連線的中點
㈢臍 ㈣橫幽門面（transpyloric plane）

19 下列有關胸管的敘述，何者錯誤？
㈠乳糜池（chyle cistern）的大小、外型是不固定的
㈡下六對肋間的淋巴亦下行匯入乳糜池（chyle cistern）
㈢胸管位在後縱隔腔（posterior mediastinum）
㈣胸管直接匯入上腔靜脈

20 前脈絡叢動脈（anterior choroidal artery）直接起自：
㈠前大腦動脈（anterior cerebral artery） ㈡頸內動脈（internal carotid artery）
㈢後大腦動脈（posterior cerebral artery） ㈣眼動脈（ophthalmic artery）

21 下列中腦何結構由翼板（alar plate）所發育而來？
㈠動眼神經核（oculomotor nucleus） ㈡大腦腳（cerebral peduncle）
㈢下丘（inferior colliculus） ㈣內縱束（medial longitudinal fasciculus）

22 下列有關脊髓的內終絲（filum terminale internum）的敘述，何者正確？
㈠附著在尾椎骨（coccyx）的內側面
㈡含有感覺及運動神經纖維
㈢起自脊髓圓錐（conus medullaris）尾端處
㈣由軟腦膜與蜘蛛網膜組織（pia-arachnoid tissue）所構成

23 眼外肌中，其肌腱附著於眼球外後上方者爲：
㈠外直肌（lateral rectus） ㈡上直肌（superior rectus）
㈢下直肌（inferior rectus） ㈣上斜肌（superior oblique）

24 腮腺（parotid gland）之分泌訊號藉由何神經傳遞？
㈠面神經（facial nerve） ㈡上頷神經（maxillary nerve）
㈢舌咽神經（glossopharyngeal nerve） ㈣第八顱神經

25 下列有關盲腸的敘述，何項錯誤？
㈠盲腸沒有腸繫膜
㈡闌尾（appendix）附著在盲腸的後內方
㈢盲腸繫膜（mesoappendix）附著於後腹壁
㈣盲腸的血液供應來自迴結腸動脈（ileocolic artery）

26 下列有關頸襻（ansa cervicalis）之敘述，何者錯誤？
㈠其分枝支配肩胛舌骨肌（omohyoid muscle）之上段
㈡其上根（superior root）源自於第一頸椎神經之腹側枝（ventral ramus）
㈢貼附於頸動脈鞘（carotid sheath）前外方
㈣其分枝鎖骨上神經（supraclavicular nerves）負責部分頸部皮膚之感覺

27 包含於頸部包裹筋膜（investing fascia）之中的肌肉包括下列何者？
㈠二腹肌（digastric muscle）　㈡頸闊肌（platysma muscle）
㈢胸骨舌骨肌（sternohyoid muscle）　㈣斜方肌（trapezius muscle）

28 第六頸椎之水平層面，頸動脈鞘（carotid sheath）並不包裹下列何者？
㈠頸內動脈（internal carotid artery）　㈡第十顱神經
㈢頸內靜脈（internal jugular vein）　㈣頸深淋巴結（deep cervical lymph nodes）

29 下列何者不是由背部腸繫膜（dorsal mesenteries）發育形成？
㈠大網膜（Greater omentum）　㈡小網膜（Lesser omentum）
㈢固有腸繫膜（Mesentery proper）　㈣結腸繫膜（Mesocolon）

30 迴腸憩室（ileal diverticulum）爲一殘留之指狀盲囊，其產生的原因爲何？
㈠卵黃囊（yolk sac）未退化　㈡尿囊（allantois）未退化
㈢卵黃柄（yolk stalk）退化不全　㈣臍帶閉合不全

31 分娩時，從連接胎盤一端的臍帶切口流出的血液源自下列何者？
㈠胎兒的動脈血及靜脈血　㈡母體的動脈血及胎兒的靜脈血
㈢胎兒的動脈血及母體的靜脈血　㈣胎兒和母體的動脈血及靜脈血

32 腰椎至骶椎（sacrum）的脊柱弓在發育時期沒有癒合，會造成下列何種缺陷？
㈠隱性脊柱裂（Spina bifida occulta）
㈡水腦（Hydranencephaly）
㈢ Arnold-Chiari 氏畸形（Arnold-Chiari malformation）
㈣裂顱畸形（Cranium bifidum）

33 在表皮（epidermis）中，含量最多的細胞是：
㈠黑色素細胞（melanocytes）　㈡角質細胞（keratinocytes）
㈢蘭氏細胞（Langerhans cells）　㈣默氏細胞（Merkel cells）

34 下列那一種組織結構不被外淋巴液（perilymph）所包圍？
㈠橢圓囊（utricle）　㈡耳蝸管（cochlea duct）
㈢鎚骨（malleus）　㈣球囊（saccule）

35 有關腦下垂體細胞（pituicytes），下列敘述何項正確？
㈠此細胞位於腦下垂體前葉（pars distalis）
㈡此細胞分泌催產素（oxytocin）與抗利尿激素（ADH/vasopressin）
㈢此細胞具有 Herring 小體（Herring bodies）
㈣此細胞屬神經膠細胞（neuroglial cell）

36 下列何者不與肝血竇（hepatic sinusoids）直接相通？
㈠門小靜脈（portal venule）　㈡中央靜脈（central vein）
㈢葉下靜脈（sublobular vein）　㈣肝小動脈（hepatic arteriole）

37 下列何種細胞的分泌顆粒含溶菌酶（lysozyme）？
㈠潘氏細胞（Paneth cells） ㈡杯狀細胞（goblet cells）
㈢腸內分泌細胞（enteroendocrine cells） ㈣黏液分泌細胞（mucus-secreting cells）

38 中樞神經系統內，具有吞噬能力的細胞是：
㈠原生質性星狀膠細胞（protoplasmic astrocyte） ㈡纖維性星狀膠細胞（fibrous astrocyte）
㈢寡突膠細胞（oligodendrocyte） ㈣微膠細胞（microglia）

39 對於「胸腺（thymus）」之敘述，下列何者正確？
㈠同時具有輸入和輸出淋巴管 ㈡是 T-淋巴球（T-lymphocyte）成熟位置
㈢主要功能爲過濾淋巴液 ㈣老年人具發達之胸腺

40 鍍銀法（silver impregnation）可將下列何種纖維染成黑色？
㈠網狀纖維 ㈡彈性纖維 ㈢骨骼肌纖維 ㈣膠原纖維

41 下列何段空氣通道變窄是肺氣腫（emphysema）之特徵？
㈠氣管（trachea） ㈡支氣管（bronchus）
㈢細支氣管（bronchioles） ㈣肺泡囊（alveolar sac）

42 會侵入腸壁細胞並進一步擴散至鄰近細胞，造成受侵犯細胞死亡而破壞大腸黏膜層的細菌屬於下列何種菌屬？
㈠志賀氏菌（*Shigella*） ㈡霍亂弧菌（*Vibrio*）
㈢幽門桿菌（*Helicobacter*） ㈣沙門氏菌（*Salmonella*）

43 下列梭狀芽胞桿菌中，會引起僞膜性結腸炎（pseudomembranous colitis）的是：
㈠肉毒桿菌（*Clostridium botulinum*） ㈡困難梭狀桿菌（*C. difficile*）
㈢產氣莢膜桿菌（*C. perfringens*） ㈣破傷風桿菌（*C. tetani*）

44 下列那一項物質存在革蘭氏陰性細菌中，而不存在革蘭氏陽性細菌中？
㈠胜肽聚糖（peptidoglycan） ㈡脂質 A（lipid A）
㈢莢膜（capsule） ㈣鞭毛（flagella）

45 DNA 病毒之蛋白質可與調節細胞週期之 p53 蛋白質作用者爲：
㈠人類乳頭瘤病毒第十六型（HPV16）之 E6 蛋白質
㈡人類乳頭瘤病毒第十六型（HPV16）之 E7 蛋白質
㈢腺病毒（Adenovirus）之 E1A 蛋白質
㈣ EB 病毒（Epstein-Barr virus）潛伏性膜蛋白質第一型（LMP1）

46 分枝桿菌可抵抗酸性酒精脫色的耐酸性是和此菌細胞壁上的何種成分有關？
㈠阿拉伯半乳聚糖（arabinogalactan） ㈡脂質（lipid）
㈢胜肽聚糖（peptidoglycan） ㈣蛋白質（protein）

47 下列何種病毒結構可以抵抗酸及消毒劑（detergents）？
㈠套膜（envelope） ㈡核酸蛋白質結合體
㈢蛋白殼（capsid） ㈣核酸（DNA 或 RNA）

48 肺炎鏈球菌（*Streptococcus pneumoniae*）可用下列何種方法鑑定？
㈠尿素酶試驗（urease test） ㈡膽汁溶解試驗（bile solubility test）
㈢錫克氏試驗（Schick test） ㈣氧化酶試驗（oxidase test）

49 下列何種細菌的特徵是初步判定爲單核球增多性李斯特菌（*Listeria monocytogenes*）感染之重要依據？
㈠溶血性 ㈡運動性 ㈢染色法 ㈣血清型

50 下列關於流行性感冒病毒（Influenza virus）的血球凝集素（hemagglutinin, HA）之敘述，何者爲錯？
㈠血清學上可區分爲各種亞型（subtype），例如 H1、H2、…H15 等，均存在於禽流感病毒（Avian flu virus）
㈡人類流行性感冒病毒包括 H1、H2、H3 等三種亞型
㈢人類流行性感冒病毒的 HA 和禽流感病毒的 HA 和相同結構的唾液酸（sialic acid）結合
㈣是中和抗體的主要作用目標

51 有關狂犬病病毒（Rabies viruses）的敘述，下列何者錯誤？
㈠產生 Negri 小體（Negri body） ㈡不能被乙醚破壞
㈢是 RNA 病毒 ㈣主要侵犯神經組織

52 下列第幾型乳頭瘤病毒常在子宮頸癌組織中出現？
㈠六 ㈡十一 ㈢十八 ㈣三十六

53 下列關於病毒與其可引起之疾病的敘述，何者錯誤？
㈠呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus）可引起肺炎（pneumonia）
㈡副流行性感冒病毒（Parainfluenza virus）可引起哮喘（croup）
㈢鼻病毒（Rhinovirus）可引起疱疹性咽呾炎（herpangina）
㈣冠狀病毒（Human coronavirus）可引起感冒（common cold）

54 下列何者不是人類免疫缺乏病毒（HIV）的傳染途徑？
㈠日常生活接觸 ㈡輸血 ㈢紋身 ㈣哺乳

55 下列何種病毒之基因體爲 DNA，並可造成幼兒傳染性紅疹症（erythema infectiosum）？
㈠人類細小病毒（parvovirus）B19 ㈡德國麻疹病毒（Rubella virus）
㈢麻疹病毒（Measles virus） ㈣伊柯病毒（Echovirus）第十六型

56 腺病毒之傳播方式爲：
㈠性行爲 ㈡接觸 ㈢輸血 ㈣母奶

57 下列節肢動物媒介病毒（Arbovirus）中，那一種病毒不以節肢動物爲傳播之媒介？
㈠黃熱病病毒（Yellow fever virus） ㈡西尼羅河腦炎病毒（West Nile virus）
㈢拉薩病毒（Lassa virus） ㈣登革病毒（Dengue virus）

58 下列關於真菌的描述，何者錯誤？
㈠大多數種類的真菌屬於多細胞生物 ㈡能引起人類疾病的真菌在真菌中占少數
㈢大多數致病性真菌的繁殖方式是有性生殖 ㈣菌絲和孢子可作爲鑑別真菌的重要依據

59 引起全身性感染的真菌大多數是何種真菌？
㈠產毒素真菌 ㈡條件致病性真菌 ㈢具有變異原性真菌 ㈣多細胞真菌

60 下列那一種真菌是屬於內源性感染真菌？
㈠念珠菌（*Candida*） ㈡麴菌（*Aspergillus*）
㈢表皮癬菌（*Epidermophyton*） ㈣新型隱球菌（*Cryptococcus neoformans*）

61 表皮癬菌屬（*Epidermophyton*）可引起：
㈠鵝口瘡 ㈡頭癬 ㈢甲癬 ㈣汗斑

62 將豬的心臟代替人類衰竭的心臟之移植手術，最大的障礙是：
㈠人類已經產生對別種哺乳動物細胞表面 α-Gal 之抗體，因而有超急性排斥（hyperacute rejection）
㈡發炎性血管傷害（inflammatory vascular injury）導致之慢性排斥（chronic rejection）
㈢目前術後之抗排斥藥物使用尚未達成共識
㈣豬的病毒感染問題無法釐清

63 自體抗原與致病微生物之抗原類似 cross reactivity 可以引起疾病，但下列何者並非如此？
㈠黴漿菌感染後之貧血症（anemia after mycoplasma infection）
㈡鏈球菌感染後之腎絲球腎炎（post-streptococcal glomerulonephritis）
㈢ Grave 氏病（Graves' disease）
㈣風濕熱（rheumatic fever）

64 導致因血型不符所引起的輸血反應（transfusion reaction）的機制是：
㈠立即性過敏免疫反應（immediate hypersensitivity）
㈡ T 細胞媒介的過敏反應（T cell-mediated hypersensitivity）
㈢免疫複合體媒介的過敏反應（immune complex-mediated hypersensitivity）
㈣抗體媒介的毒殺作用（antibody-mediated cytotoxicity）

65 如果將兩個不同的 inbred strain 老鼠，A 及 B 品系交配而產生子代 F1，接著再將 F1 老鼠互相交配而得到子代 F2。此時如果將 F1 老鼠的皮膚移植到任一隻 F2 時，F1 老鼠的皮膚被 F2 老鼠接受的比例（%）爲何？
(A) 100 (B) 75 (C) 50 (D) 25

66 下列有關新生兒免疫力的敘述，何者正確？
(A)不具免疫保護能力
(B)透過胎盤獲得母親的 IgM
(C)自身最早製造出來的是 IgM
(D)具有成年人 IgE 的量

67 特異性免疫反應和非特異性免疫反應除了專一性外，下列何項也是二者的不同之處？
(A)記憶性
(B)執行特異性免疫反應除了有細胞外，還有可溶性的蛋白質幫忙
(C)區別自我與非自我抗原的能力
(D)可保護宿主不被病原菌侵犯

68 補體（complement）系統中的凝集路徑（lectin pathway），是細菌感染時，其表面的醣蛋白或碳水化合物中的 mannose 部分和 mannose-binding lectin（MBL）結合所啓動的，則 MBL 和補體系統中的那一個分子功能相似？
(A)C1q (B) C2a (C) C3b (D) C4a

69 下列何者不是細胞趨化激素？
(A) IL-2 (B) IL-8
(C) Leukotriene B4（LTB4） (D) MCP-1（CCL2）

70 下列有關 B 和 T 細胞的敘述，那一項是 B 細胞所特有？
(A)表現特定的抗原受體（antigen-specific receptor）在細胞表面
(B)辨識與自身主要組織相容抗原（self MHC）結合的抗原分子
(C)在細胞發育過程會進行基因重組
(D)在細胞分化過程會進行類型轉換（isotype switching）

71 IL-2 受體（receptor）由三條鏈構成，在 T 細胞被活化時，那一條鏈大量表現而構成高親和力的 IL-2 受體？
(A)α 鏈 (B) β 鏈 (C) γ 鏈 (D) δ 鏈

72 在胸腺器官內，T 細胞發育到那一階段，就可以離開胸腺到達周邊淋巴器官？
(A)表現 CD3
(B) T 細胞受器基因（T cell receptor genes）重組成功
(C)同時呈現 CD4 以及 CD8
(D)單獨呈現 CD4 或 CD8

73 下列那一種抗體在血清中濃度最高？
(A) IgA (B) IgE (C) IgG (D) IgM

74 下列有關產生抗體多樣化（diversity）的原理，那一項描述錯誤？
(A)體細胞高度突變（somatic hyper-mutation）發生於基因重組（gene rearrangement）之前
(B)體細胞高度突變（somatic hyper-mutation）可以發生於抗體的重鏈（heavy chain）以及輕鏈（light chain）部位
(C)利用酵素將四種核苷酸（nucleotides）任意加入剪接部位，可以造成連接多樣化（junctional diversity）
(D)相同重鏈（heavy chain）與不同輕鏈（light chain）之組合亦可造成抗體多樣化（diversity）

75 食用未熟之淡水魚類，會感染下列何種人體寄生蟲？
(A)海獸胃線蟲（*Anisakis simplex*） (B)菲律賓毛線蟲（*Capillaria philippinensis*）
(C)廣東住血線蟲（*Angiostrongylus cantonensis*） (D)衛氏肺吸蟲（*Paragonimus westermani*）

76 下列人體寄生蟲檢查法，何者錯誤？
㈠惡性瘧原蟲（*Plasmodium faiciparum*）－血液厚片塗抹法（thick blood smear）
㈡蟯蟲（*Enterobius vermicularis*）－肛圍擦拭法（cellophane tape swab method）
㈢旋毛蟲（*Trichinella spiralis*）－肌肉活體採樣檢查（biopsy）
㈣蟠尾絲蟲（*Onchocerca volvulus*）－膜濾法（nuclear pore filtration）

77 下列何者是中華肝吸蟲（*Clonorchis sinensis*）的確認診斷？
㈠有生食淡水魚的習慣　　㈡周邊血的嗜酸性白血球增多
㈢有上腹疼痛、肝腫大、黃疸的現象　　㈣自糞便中檢出蟲卵

78 在人類，豬囊尾幼蟲（*Cysticercus cellulosae*）最常侵犯下列何處？
㈠眼睛　㈡腦　㈢小腸　㈣肝臟

79 若患者之新鮮糞便中含有感染型（infective form），則照顧患者之醫護人員較易受到感染的寄生蟲是：
㈠環孢子蟲（*Cyclospora cayetanensis*）　　㈡人肉孢子蟲（*Sarcocystis hominis*）
㈢等孢子蟲（*Isospora belli*）　　㈣隱孢子蟲（*Cryptosporidium parvum*）

80 下列有關瘧疾的敘述，何者錯誤？
㈠預防間日瘧之復發（relapse），宜用 primaquine
㈡瘧疾發作（paroxysm）之過程依序爲：惡寒（chill）、發燒（fever）、發汗（sweat）
㈢瘧疾的主要症狀爲：發燒、貧血、肝腫大
㈣惡性瘧患者周邊血液中，通常較不易發現裂殖體（schizonts）

81 某一高科技業者因家庭教育的關係，很少清洗肚臍，一日因肚皮奇癢難耐，並發現肚臍鑽出似蛆之小蟲，請問有關此病例之敘述，下列何者錯誤？
㈠此病人應是罹患蠅蛆症（myiasis）
㈡蠅蛆症之發生，一定是母蠅產卵於患者之傷口，因此本病人之肚臍已有病灶（lesion）
㈢蠅蛆症不只在皮膚病灶，腸道或生殖泌尿道也可能發生
㈣本病人之治療應清創和移除所有蠅蛆，並視情況給予適當抗生素治療，以防二次感染（secondary infection）

82 下列何種細菌可作爲微生物殺蟲劑，消滅病媒蚊之幼蟲，用以防治登革熱？
㈠比菲德氏菌（*Bifidus*）　　㈡蘇力菌（*Bacillus thuringiensis*）
㈢乳酸桿菌（*Lactobacillus acidophilus*）　　㈣大腸桿菌（*Escherichia coli*）

83 兩研究員分別探討吸菸與腦中風的相關性。兩人都得到勝算比（odds ratio）＝2.8 的結果，但是相對應的 95%信賴區間則不同：甲研究員得到（0.9, 8.7），乙研究員爲（1.8, 4.4）。請問下列敘述何者最可能正確？
㈠兩者都有統計學上的意義（即 $P<0.05$）　　㈡吸菸和腦中風沒有相關性
㈢甲研究員的樣本數（sample size）可能比較大　　㈣乙研究員的數據變異性（variation）較小

84 某班護理系學生 50 名參加內外科護理及精神科護理兩科測驗，其中內外科護理的全班平均分數爲 78 分、標準差爲 8 分，精神科護理的全班平均分數爲 70 分、標準差爲 8 分。該兩科目測驗分數之變異係數值（coefficient of variation）爲：
㈠內外科護理＝精神科護理　　㈡內外科護理＞精神科護理
㈢內外科護理＜精神科護理　　㈣資訊不足無法判定

85 2000 名 60 歲以上的男性在篩檢後發現有 200 人已有疾病 A；接下來 10 年的追蹤又有 300 人得到此病。若 10 年之間，這些男性均無人死亡，請問疾病 A 在 10 年內的累積發生率（cumulative incidence）是多少？
㈠ 15%　㈡ 16.7%　㈢ 25%　㈣ 27.8%

86 下列關於標準化死亡率比（standardized mortality ratio, SMR）之敘述，何者錯誤？
㈠病例對照法也可計算 SMR　　㈡兩個 SMR 無法直接相比
㈢是一種間接法之標準化方式　　㈣兩個族群 SMR 不同，必然是因分層死亡率不同

87 下列何者是肺結核（Tuberculosis）之初段預防工作？
㈠施打卡介苗 ㈡做好個案發現工作
㈢及早給予正確診斷和處理 ㈣發病個案登記管理

88 2006 年台灣子宮頸癌全年發生率（incidence），分子是 2006 年台灣新發生之子宮頸癌個案數，則其分母是：
㈠ 2006 年台灣全人口數
㈡ 2006 年台灣全部女性人口數
㈢ 2006 年台灣全部女性罹患癌症的個案數
㈣ 2006 年台灣女性有機會得到子宮頸癌，但尚未罹患的人口數

89 惡性瘧原蟲對何種貧血者的侵襲危險性較正常人爲低？
㈠缺鐵性貧血 ㈡鐮刀形血球性貧血
㈢維生素 B_{12} 缺乏性貧血 ㈣葉酸缺乏性貧血

90 下列何種流行病學團體層次的研究最適合探討疾病的遺傳與環境互動？
㈠時地聚集研究 ㈡移民比較研究 ㈢生態相關研究 ㈣時間序列研究

91 與西方先進國家比較，下列何者非台灣醫療服務體系最重要的問題？
㈠外科手術等候時間太久 ㈡重醫療輕預防
㈢未落實分級醫療 ㈣服務體系缺乏整合

92 下列何者不符合健康促進應有之倫理守則？
㈠價值明確開放 ㈡尊重個人隱私 ㈢專家主導決定 ㈣注重成本效益

93 使用個案對照研究（case-control）去探討大腸癌的危險因子，發現在控制各種因子後，時常食用黃豆類的勝算比（OR）是 0.6，其 95%信賴區間是（0.4, 0.9）。由本研究結果，食用黃豆類對大腸癌發生，其作用如何？
㈠沒有作用 ㈡傾向有保護作用（protective）
㈢傾向有危害作用（harmful） ㈣由此數據無法確定其作用

94 職業引起的帕金森氏症（Parkinsonism）與以下何種物質之暴露最有關？
㈠汞（Mercury） ㈡錳（Manganese）
㈢四氯化碳（Carbon tetrachloride） ㈣有機磷劑（Organophosphate）

95 下列有關病毒性肝炎的敘述，何者正確？
㈠ A 型肝炎疾病爲 DNA 病毒
㈡ A 型肝炎主要經輸血液或污染針頭傳染
㈢ B 型肝炎曾被稱血清性肝炎
㈣母親爲 B 型肝炎 e 抗原陽性者，則其嬰兒在出生 1 週後應注射 B 型肝炎免疫球蛋白

96 一位在噴砂工作超過 20 年的男性，若工作時未作適當的防護，他對以下那一項疾病，比一般人有較高的罹患率？
㈠職業氣喘症 ㈡肺結核 ㈢肺炎 ㈣膀胱癌

97 下列何種菌種可引起細菌性毒素之食物中毒？
㈠沙門氏菌 ㈡幽門螺旋桿菌 ㈢金黃葡萄球菌 ㈣腸炎弧菌

98 依據醫師法規定，醫師執行業務時應製作病歷。下列何者非醫師法明文列舉應包括之病歷內容？
㈠病人之姓名 ㈡診斷 ㈢造成傷病之外因 ㈣檢查結果

99 下列何者不是全民健康保險之特性？
㈠經驗費率 ㈡風險分擔 ㈢強制性 ㈣社會保險

100 醫院遇有危急病人，應先予適當之急救，若病人爲路倒病人且負擔不起醫療費用時，依據醫療法的規定，其費用應如何處理？
㈠由醫院列爲呆帳自行吸收 ㈡由醫院提撥之社福基金補助
㈢由全民健保補助 ㈣由直轄市或縣市政府社政單位補助