98 年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員（不含牙醫師、助產師、職能治療師）、中醫師、心理師、營養師考試暨醫師考試分試考試、98 年專門職業及技術人員高等考試法醫師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：醫師、醫師㈠
科　　目：醫學㈠（包括解剖學、胚胎學、組織學、微生物免疫學、寄生蟲學、公共衛生學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共100題，每題1分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 闌尾（appendix）手術之切口，何者較容易造成腹直肌（rectus abdominis）的血液供應和支配神經受損？
㈠正中切口（median or midline incision）
㈡旁正中切口（paramedian incision）
㈢麥白爾尼切口（McBurney incision）
㈣旁腹直肌鞘切口（pararectus incision (along the lateral border of rectus sheath)）

情況：30 歲男性因車禍致頭部外傷被送急診，呈半昏迷狀態，左側瞳孔放大，右側肢體無力，電腦斷層攝影顯示其左腦顳葉出血。依此回答第 2 題至第 4 題。

2 這位病人可能是因下列何構造被血塊擠壓，進而壓迫腦幹而引起上述症狀？
㈠小腦扁桃體（cerebellar tonsil）　㈡鉤（uncus）
㈢胼胝體（corpus callosum）　㈣下視丘（hypothalamus）

3 前述病人腦幹的什麼部位被壓迫而引起右側肢體無力？
㈠上丘（superior colliculus）　㈡延髓（medulla oblongata）
㈢大腦腳（cerebral peduncle）　㈣橋腦（pons）

4 前述病人的那一條顱神經被壓迫而引起左側瞳孔放大？
㈠滑車神經（trochlear nerve）　㈡動眼神經（oculomotor nerve）
㈢外展神經（abducens nerve）　㈣三叉神經（trigeminal nerve）

5 進行頸部腫瘤手術時，不幸傷及迷走神經的分枝，最有可能發生情形爲何？
㈠胃酸分泌減少　㈡腹瀉　㈢心搏過速　㈣聲音沙啞

6 一中年男子從事多年勞力工作後，主訴背部疼痛，且一側下肢肌肉無力。下列那一肌肉的功能缺失，可以確認是第一節薦神經（S1 spinal nerve）的受傷，而不是坐骨神經的受傷？
㈠股二頭肌　㈡腓腸肌　㈢臀大肌　㈣脛前肌

7 乳房惡性腫瘤（carcinoma of the breast）易由下列何靜脈引流轉移到椎骨（vertebrae）？
㈠上腹壁下靜脈（inferior epigastric vein）　㈡頭臂靜脈（brachiocephalic vein）
㈢外側胸靜脈（lateral thoracic vein）　㈣後肋間靜脈（posterior intercostal vein）

8 腹壁淺層靜脈蓄積來自臍旁靜脈（paraumbilical vein）的靜脈血而形成的放射狀走向是源自下列何者的阻塞？
㈠上腔靜脈　㈡下腔靜脈　㈢肝門靜脈　㈣肝靜脈

9 病人出現右下肢振動（vibration）感覺異常，左下肢輕觸覺及痛覺異常，最可能的病灶位於：
㈠右側胸段脊髓（right thoracic spinal cord）　㈡右側丘腦（right thalamus）
㈢左側延髓（left medulla）　㈣左側大腦感覺皮質（left sensory cortex）

10 支配陰囊後半部的神經爲下列何者的分枝？
㈠股神經　㈡陰部神經　㈢生殖股神經　㈣髂腹股溝神經

11 下列何者的副交感神經支配不屬於骨盆內臟神經（pelvic splanchnic nerve）？
㈠卵巢　㈡輸卵管　㈢子宮　㈣陰道

12 下列何者構成坐骨肛門窩（ischioanal fossa）的內側壁？
㈠臀中肌　㈡提肛肌　㈢梨狀肌　㈣閉孔內肌

13 肩胛骨下角相當於下列何者的高度？
㈠第一胸椎　㈡第三胸椎　㈢第五胸椎　㈣第七胸椎

14 前臂的骨間前神經（anterior interosseous nerve）爲下列何者的分枝？
㈠骨間總神經（common interosseous nerve） ㈡正中神經（median nerve）
㈢尺神經（ulnar nerve） ㈣橈神經（radial nerve）

15 上肢藉下列何者附著於軀幹？
㈠肩鎖關節（acromioclavicular joint） ㈡盂肱關節（glenohumeral joint）
㈢胸鎖關節（sternoclavicular joint） ㈣柄胸關節（manubriosternal joint）

16 下列何者分隔坐骨大切迹（greater sciatic notch）與坐骨小切迹（lesser sciatic notch）？
㈠髂後下棘（posterior inferior iliac spine） ㈡坐骨棘（ischial spine）
㈢坐骨粗隆（ischial tuberosity） ㈣恥骨結節（pubic tubercle）

17 旋股內側動脈（medial circumflex femoral artery）穿過下列何者，至大腿後面？
㈠髂腰肌（iliopsoas）和恥骨肌（pectineus） ㈡恥骨肌和內收短肌（adductor brevis）
㈢內收短肌和內收長肌（adductor longus） ㈣內收長肌和內收大肌（adductor magnus）

18 心尖相對於第幾個肋間？
㈠三 ㈡五 ㈢七 ㈣九

19 腹主動脈在下列何平面分枝成左右總腸骨動脈？
㈠橫幽門面（transpyloric plane） ㈡橫臍面（transumbilical plane）
㈢橫腸骨結節面（transtubercular plane） ㈣腸骨嵴間面（intercrestal plane）

20 下列何者可同時供血到左、右心室？
㈠右冠狀動脈
㈡右冠狀動脈的邊緣枝（marginal branch）
㈢左冠狀動脈的迴旋枝（circumflex branch）
㈣左冠狀動脈的前室間枝（anterior interventricular branch）

21 下列何結構不具有穩固腎臟的作用？
㈠圍腎脂肪（perirenal fat） ㈡腎肌膜（renal fascia）
㈢腎動、靜脈 ㈣腎上腺

22 頸外動脈（external carotid artery）與其分枝不供應血液給：
㈠腦部 ㈡硬腦膜 ㈢眼眶 ㈣鼻腔黏膜

23 下列有關迷走神經（vagus nerve）之敘述，何者錯誤？
㈠喉外神經（external laryngeal nerve）控制肌肉造成聲襞（vocal folds）緊繃
㈡其分枝形成頸襻（ansa cervicalis）之下根（inferior root）
㈢其分枝喉返神經（recurrent laryngeal nerve）控制喉內肌肉
㈣迷走神經於鎖骨下動脈（subclavian artery）前方跨越

24 舌神經（lingual nerve）內（包括所有伴行）之神經纖維，不包含：
㈠神經細胞體位於三叉神經節（trigeminal ganglion）之感覺神經纖維
㈡傳遞來自舌前三分之二段一般感覺之神經纖維
㈢傳遞舌前三分之二段味覺之神經纖維
㈣控制腮腺（parotid gland）之副交感神經節前纖維

25 支配下頜下腺（submandibular gland）之副交感神經纖維不經由：
㈠莖乳突孔（stylomastoid foramen） ㈡內耳道（internal acoustic meatus）
㈢中耳腔（middle ear cavity） ㈣舌神經（lingual nerve）

26 最近中線的小腦神經核爲：
㈠球狀核（globose nucleus） ㈡頂核（fastigial nucleus）
㈢栓狀核（emboliform nucleus） ㈣齒狀核（dentate nucleus）

27 眼球的血管層（vascular tunica）不包含下列何種結構？
㈠虹彩（iris） ㈡水晶體（lens）
㈢睫狀體（ciliary body） ㈣脈絡層（choroid）

28 下列何種細胞具頂樹突（apical dendrite）可延伸至大腦皮質表面？
㈠星狀細胞（stellate cell） ㈡錐狀細胞（pyramidal cell）
㈢梭狀細胞（fusiform cell） ㈣水平細胞（horizontal cell）

29 胚胎期所謂的初始橫隔膜（primordium diaphragm）不包含下列何者？
㈠橫隔（septum transversum） ㈡胸腹膜（pleuroperitoneal membrane）
㈢食道繫膜（mesoesophagus） ㈣體壁（body wall）

30 口咽膜（oropharyngeal membrane）是由下列何者組成？
㈠內胚層和外胚層 ㈡內胚層和中胚層 ㈢中胚層和外胚層 ㈣僅由外胚層組成

31 下列關於胰臟發育之敘述，何者正確？
㈠由前腸（foregut）及中腸（midgut）共同衍生而來
㈡大部分由背胰芽（dorsal pancreatic bud）衍生而來
㈢腹胰芽（ventral pancreatic bud）發育較背胰芽早
㈣背胰芽轉至腹面與腹胰芽癒合

32 下列何者不是發源於神經嵴（neural crest）？
㈠黑色素細胞（melanocyte） ㈡許旺氏細胞（Schwann cell）
㈢寡突膠質細胞（oligodendrocyte） ㈣嗜鉻細胞（chromaffin cell）

33 有關女性生殖系統之濾泡（follicle）發生過程，下列敘述何項正確？
㈠透明區（zona pellucida）初出現在初級濾泡（primary follicle）
㈡放射冠（corona radiata）是由顆粒細胞（granulosa cell）分泌所產生
㈢濾泡的發育不需要有濾泡刺激素（FSH）作用
㈣內膜（theca interna）爲結締組織

34 由 6 個穿過細胞膜的 connexins 組成一很小的管道，只容許 2 nm 大小的物質通過，這種接合稱爲：
㈠緊密接合（tight junction） ㈡間隙接合（gap junction）
㈢黏連接合（adhering junction） ㈣半胞橋小體（hemidesmosome）

35 下列何種器官之內襯是「移行上皮（transitional epithelium）」？
㈠膀胱（urinary bladder） ㈡氣管（trachea）
㈢食道（esophagus） ㈣膽囊（gall bladder）

36 下列何者常見於淋巴結的副皮質區（paracortex）？
㈠有高內皮細胞之小靜脈（high endothelial venule）
㈡淋巴小結（lymphatic nodule）
㈢漿細胞（plasma cell）
㈣ B 淋巴球（B-lymphocyte）

37 結締組織中，下列何者製造並分泌基質（ground substance）？
㈠漿細胞（plasma cell） ㈡肥大細胞（mast cell）
㈢組織球（histiocyte） ㈣纖維母細胞（fibroblast）

38 有關人體骨骼肌三合體（triad）的敘述，下列何者正確？
㈠由終池和兩側的 T 小管所構成 ㈡通常位在 Z 線上
㈢三合體的終池有貯存鈣離子的功能 ㈣ T 小管是內質網膨大所形成

39 消化道中，下列何者的胞質具有最強的嗜伊紅性（eosinophilic）？
㈠腸內分泌細胞（enteroendocrine cell） ㈡頸黏液細胞（mucous neck cell）
㈢主細胞（chief cell） ㈣壁細胞（parietal cell）

40 有關松果體（pineal gland），下列敘述何項錯誤？
㈠分泌褪黑激素（melatonin）進而影響生殖系統之功能
㈡成人松果體常含有腦沙（corpora arenacea / brain sand）
㈢此腺體包含很多黑色素細胞（melanocyte）
㈣此腺體之活性（activity）受光線（light）影響

41 舌缺少下列何種結構，使得人類家族遺傳性自主神經機能障礙（familial dysautonomia）的患者味覺喪失？
㈠蕈狀乳頭（fungiform papilla） ㈡葉狀乳頭（foliate papilla）
㈢輪廓乳頭（circumvallate papilla） ㈣絲狀乳頭（filiform papilla）

42 下列關於 *Staphylococcus aureus* 毒素的敘述，那一項錯誤？
㈠ alpha toxin 可嵌入多種細胞的細胞膜導致細胞因滲透壓改變而溶解
㈡ beta toxin 是造成 staphylococcal scalded skin syndrome（SSSS）的主因
㈢ delta toxin 也會在其他 staphylococci 如 *Staphylococcus epidermidis* 中發現
㈣ leukocidin 可導致嗜中性白血球的破壞

43 淋病球菌（gonococci）感染成年婦女，最常起始於下列那個部位？
㈠尿道 ㈡陰道 ㈢子宮頸 ㈣輸卵管

44 下列那種細菌不會造成人畜共通之感染症（zoonotic infection）？
㈠假結核耶爾辛氏菌（*Yersinia pseudotuberculosis*）
㈡炭疽桿菌（*Bacillus anthracis*）
㈢福氏志賀氏菌（*Shigella flexneri*）
㈣流產布魯氏菌（*Brucella abortus*）

45 下列關於 *Streptococcus pneumoniae* 的敘述，何者錯誤？
㈠是引發肺炎的致病菌，不會在正常人咽喉中找到
㈡是革蘭氏陽性菌，且常呈雙球菌形態
㈢會產生莢膜，且爲重要致病因子
㈣常造成肺部下方感染，又稱 lobar pneumonia

46 Pyrazinamide 在酸性環境中可有效對抗結核桿菌的活性，故常與其他藥物合併使用以治療結核病患，但該抗生素真正有活性的形式是必須被水解成 pyrazinoic acid。此水解反應需在何器官進行？
㈠心臟 ㈡肝臟 ㈢腎臟 ㈣脾臟

47 肺炎黴漿菌（*Mycoplasma pneumoniae*）感染會引起原發性非典型肺炎（primary atypical pneumonia），在鑑定培養時通常會加入下列何種抗生素於培養基中，以利黴漿菌的分離與生長？
㈠青黴素（penicillin） ㈡紅黴素（erythromycin）
㈢四環素（tetracycline） ㈣磺胺劑（sulfonamide）

48 一位在軍中服役的 18 歲青年與其女友先後罹患嚴重的腦膜炎，兩人緊急送醫治療後，其女友雖痊癒，青年本人則不治身亡。在治療前，於自兩人所採集的腦脊髓液（cerebrospinal fluid）中發現大量胞內含菌的多型核白血球（polymorphonuclear leukocytes）。根據由腦脊髓液所分離到的細菌種類，確定兩人罹患流行性腦膜炎。下列有關此致病菌的敘述，何者錯誤？
㈠此菌經由呼吸道感染人類 ㈡此菌廣泛生存於環境中
㈢此菌是一種革蘭氏陰性球菌 ㈣人類是此菌唯一的天然宿主

49 承上題，腦脊髓液檢體送細菌室培養過程中，需要注意下列那件事？
㈠檢體勿保存於冰箱 ㈡檢體需避光
㈢檢體需保存於無氧環境中 ㈣檢體勿置於密閉容器中

50 Q 型熱（Q fever）是發生在大部分國家的人畜共通傳染病（zoonosis），人被感染後，會呈急性型（肺炎、肝炎、感冒症狀、頭痛）或是嚴重慢性型（心內膜炎）症狀。此疾病是由何種細菌感染所引起？
㈠ *Rickettsia rickettsii* ㈡ *Coxiella burnetii*
㈢ *Ehrlichia canis* ㈣ *Staphylococcus epidermidis*

51 某人主訴有頭痛、發燒、全身疲勞、寒顫、噁心、嘔吐、頸部僵硬、肌肉關節疼痛及淋巴腺腫脹等症狀，經問診後發現，該人於一星期前曾參加登山活動，露宿野地；回來後發現身上有蟲子叮咬所留下來的紅斑，後來紅斑以圈狀向外擴散，變成遊走性紅斑（erythema migrans），此患者有可能是被何致病原感染？
㈠恙蟲病立克次氏菌（*Orientia tsutsugamushi*） ㈡布魯氏菌（*Brucella*）
㈢伯氏疏螺旋菌（*Borrelia burgdorferi*） ㈣鉤端螺旋體（*Leptospira interrogans*）

52 克流感（oseltamivir）主要藉由干擾流感病毒的那種蛋白的功能，以達到抑制病毒的功效？
㈠ M1 protein ㈡ Hemagglutinin ㈢ M2 protein ㈣ Neuraminidase

53 下列有關腸病毒（enterovirus）之敘述，何者錯誤？
㈠感染的人排出含有病毒的糞便，可長達 1 個月之久
㈡腸病毒成員包括 A 型肝炎病毒、伊柯病毒（echovirus）及克沙奇病毒（coxackievirus）
㈢近年來台灣流行之腸病毒 71 型感染，引起手足口症及神經系統之後遺症
㈣由糞口途徑傳播

54 褐菌絲症（phaeohyphomycosis）爲新興之真菌感染症，此群真菌共同之特徵爲何？
㈠具有兩型性（dimorphism）之酵母菌
㈡喜於 37℃生長之絲狀真菌
㈢會產生類似黑色素（melanin-like）之絲狀真菌或酵母菌
㈣同時產生大型頂端芽胞（macroconidia）及小型頂端芽胞（microconidia）之絲狀真菌

55 某農家飼養了許多家禽（雞、鴨與豬等），隨著夏天的到來經常高溫多雨，家中之老二今年 6 歲，放學回家後開始頭疼、嘔吐，1 天後出現嗜睡，經過 2 至 3 日，症狀加劇，嘔吐、意識模糊、抽搐、情緒激動、神智不清以及下肢麻痺等症狀，於 1 星期後退燒，但呈現運動及智能退化的現象，此孩童之病徵是由何病毒感染所引起的？
㈠疱疹病毒（herpesvirus）　㈡狂犬病病毒（rabies virus）
㈢日本腦炎病毒（Japanese encephalitis virus）　㈣登革病毒（dengue virus）

56 某患者抽血檢驗 B 型肝炎病毒（hepatitis B virus）感染指標，何種抗體存在時，代表受檢者已具有對抗此病毒之免疫力？
㈠IgG anti-HBs 抗體　㈡ IgG anti-HBe 抗體　㈢ IgM anti-HBc 抗體　㈣ IgG anti-HBc 抗體

57 下列病毒感染誘發寄主產生干擾素（interferon）之敘述，何者正確？
㈠病毒 DNA 是誘發干擾素產生之最佳物質
㈡當體內干擾素製造不足時，會降低病毒感染的嚴重性
㈢干擾素可調節輔助性 T 細胞增加免疫系統和毒殺性 T 細胞對感染細胞的確認，並予以殲滅
㈣干擾素在病毒感染之晚期才被釋放出來

58 下列有關流行性感冒病毒（influenza virus）之敘述，何者正確？
㈠流行性感冒病毒核酸含 16 個 RNA 片段
㈡ A 型流行性感冒病毒以核蛋白（nucleoprotein）爲區分亞種之分類依據
㈢流行性感冒病毒外層之血球凝集素其成分爲醣蛋白
㈣在細胞核內進行複製

59 一位 22 歲的男性最近感到不適，並發覺自己體重驟減 30 磅，最近更發生輕微的發燒等流感症狀，並患有鵝口瘡（thrush），伴隨嚴重而頻繁的腹瀉，此外亦有呼吸困難的現象，經肺部 X 光檢查顯示兩側有浸潤現象，在糞便檢體中測出梨形鞭毛蟲（*Giardia*），此患者最可能被何病原菌感染而造成上述之病徵？
㈠疱疹病毒（herpesvirus）　㈡細小病毒 B19（parvovirus B19）
㈢人類免疫缺乏病毒（HIV）　㈣流行性感冒病毒（influenza virus）

60 51 歲陳小姐，近一個月發現右側頭皮有局部脫髮，頭皮搔癢、脫皮並且產生疼痛之區塊，之前醫院醫師給予之抗生素及抗發炎之 prednisone 並沒有改善狀況。於是醫師詳細問診後才知道：陳小姐 3 個月前撿到一隻很可愛的流浪犬，取名波比。波比很活潑討喜，經常與陳小姐親近，醫師於是以伍氏燈（Wood's light）檢查呈陽性，進一步取患部皮屑培養；結果養出白色毛狀菌落，顯微鏡觀察呈現分隔菌絲（septate hyphae），產生數量眾多之梭形、厚壁、表面粗糙之大孢子（macrospores）。最可能之感染病原是下列何者？
㈠ *Epidermophyton floccosum*　㈡ *Microsporum canis*
㈢ *Microsporum gypseum*　㈣ *Trichophyton schoenleinii*

61 承上題，治療陳小姐之最可能選擇爲何？
㈠口服 flucytosine　㈡靜脈注射 ketoconazole
㈢口服 terbinafine　㈣口服碘化鉀（potassium iodide, KI）飽和溶液

62 下列那一種細胞常參與抗體依賴性細胞毒殺反應（antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC）？
㈠ B 淋巴細胞　㈡ CD8 T 淋巴細胞
㈢自然殺手細胞（natural killer cell）　㈣肥大細胞（mast cell）

63 樹突細胞爲重要的專業抗原呈現細胞，其由周邊組織移動至淋巴結時，細胞表面分子會出現變化，下列相關敘述何者正確？
㈠在周邊的未成熟樹突細胞具有較強的吞噬能力，是因爲表現高量的 CD11c 分子
㈡樹突細胞在周邊攝入病原體後，會遷移至附近淋巴結是因爲樹突細胞會表現 CCR7 分子
㈢病原體會刺激未成熟樹突細胞轉變爲成熟形式，而成熟的樹突細胞會表現大量的 MHC class II 分子與少量的 B7 分子，來幫助活化 T 細胞
㈣當成熟的樹突細胞活化T細胞時，可以分泌IL-10 來幫助T細胞分化變成第一型輔助性T細胞（T_H1）

64 下列有關毒殺性 T 細胞（cytotoxic T lymphocyte, CTL）與自然殺手細胞（natural killer cell, NK cell）之比較，何者錯誤？
㈠二者皆具有抗原特異性
㈡二者皆會表現 FasL
㈢二者的活性皆與 MHC class I 有關
㈣不表現 MHC class I 分子的腫瘤細胞，可以逃過 CTL 的辨認，但是無法逃過 NK cell 的追蹤

65 免疫球蛋白重鏈（immunoglobulin heavy chain）基因之胚原序列（germline sequence）可存在於下列那種細胞中？
㈠成熟之 B 細胞 ㈡活化之 B 細胞 ㈢漿細胞（plasma cell） ㈣ T 細胞

66 下列有關單株抗體（monoclonal antibody）的敘述，何項最正確？
㈠都是 IgM
㈡可以辨認很多抗原決定位
㈢可以利用 staphylococcal Protein A 親和力管柱純化而得
㈣目前臨床上只能用於降低組織移植排斥的治療

67 爲了預防新突變種流行性感冒病毒感染，建議老人及兒童每年施打流感疫苗。流感病毒最易發生突變的構造是下列那一項？
㈠紅血球凝集素（hemagglutinin） ㈡反轉錄酶（reverse transcriptase）
㈢轉錄酶（transcriptase） ㈣外套蛋白質（capsid protein）

68 有關黏膜免疫系統與由脾臟／淋巴結所構成的系統性免疫系統之比較，下列敘述何者錯誤？
㈠即使在缺乏感染之情形下，前者主要由活化的 T 細胞或是記憶型 T 細胞所構成
㈡前者抗原進入的路徑與後者類似，主要是透過血流或是皮下進入
㈢前者的免疫細胞與上皮細胞有密切接觸
㈣前者時常暴露在無害抗原之下，所以發展出很好的抑制免疫反應的調控機制

69 Toll-like receptors（TLRs）執行訊息傳遞，下列那一種可存在於內胞體（endosome）中，能辨識病毒之雙股 RNA（dsRNA）？
㈠ TLR-3 ㈡ TLR-4 ㈢ TLR-5 ㈣ TLR-7

70 下列有關初級淋巴器官（primary lymphoid organ）之敘述，何者錯誤？
㈠含有淋巴幹細胞（lymphoid stem cell）
㈡包含胎兒肝（fetal liver）、骨髓、胸腺
㈢除去辨識自我抗原（autoantigen）之淋巴細胞的場所
㈣接受抗原刺激之場所

71 下列何種免疫調節劑是影響到所有活化的淋巴球，及作用於其他所有正在分裂的細胞，而並非僅限於適應性免疫反應（adaptive immune responses）的調節及抑制？
㈠ mycophenolate ㈡ cyclosporine A
㈢ rapamycin（sirolimus） ㈣ tacrolimus（FK-506）

72 張先生目前 50 餘歲，最近出現多個關節腫脹、疼痛，主要在雙手近端指間關節、雙手腕關節、膝關節等，檢查結果爲類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）。醫師表示目前張先生體內的類風濕性因子（rheumatoid factor）價數頗高，需積極治療。此因子是下列那一項？
㈠細胞激素（cytokine） ㈡自體抗體（autoantibody）
㈢調節性T細胞（T_{reg}細胞）產生之調控因子 ㈣補體複合體（complement complex）

73 張太太的女兒現年 10 歲，自上學期中就開始經常口渴，有消瘦現象。有一天昏倒送醫之後，診斷得到第一型糖尿病，胰臟之 β（beta）細胞破壞嚴重，缺乏胰島素，血糖過高。這個疾病的成因爲何？
㈠感染症破壞胰臟腺體，引起胰臟功能過高
㈡攝取糖份過多，引起胰臟功能衰竭
㈢產生自體免疫反應 T 細胞，破壞胰臟 β（beta）細胞所致的自體免疫疾病
㈣電解質代謝失常，引起胰臟功能衰竭

74 P 先生對蝦蟹過敏，每次吃了海鮮大餐都會產生蕁麻疹。在 K 先生的主動提議下，K 先生將 P 先生的血清注射到自己的皮下後 1 週，K 先生吃了海鮮大餐後半小時也在注射的皮膚出現明顯的皮膚疹，但吃其他的食物並不會出現反應，身體其他地方也無特別病狀。下列敘述何者正確？
㈠P 先生的反應是被動免疫，K 先生的反應是主動免疫
㈡血清中具抗原特異性的 IgE 已經黏附在皮下的過敏細胞
㈢ P 先生的血清已經在 K 先生的身上引起免疫容忍
㈣ P 先生和 K 先生的反應都是被動免疫

75 下列何種人體寄生蟲會出現孤雌生殖（parthenogenesis）的現象？
Ⓐ旋毛蟲（*Trichinella spiralis*） Ⓑ糞小桿線蟲（*Strongyloides stercoralis*）
Ⓒ菲律賓毛線蟲（*Capillaria philippinensis*） Ⓓ東方毛線蟲（*Trichostrongylus orientalis*）

76 豬不是下列何種寄生蟲的貯存宿主（reservoir host）？
Ⓐ薑片蟲（*Fasciolopsis buski*） Ⓑ日本血吸蟲（*Schistosoma japonicum*）
Ⓒ埃及血吸蟲（*Schistosoma haematobium*） Ⓓ衛氏肺吸蟲（*Paragonimus westermani*）

77 下列何者與陰道滴蟲無關？
Ⓐ囊體 Ⓑ攝護腺炎 Ⓒ新生兒肺部感染 Ⓓ軸柱（axostyle）

78 瘧疾（malaria）之傳播是經由病媒蚊爲之，請問病媒蚊傳播方式是下列何種機制？
Ⓐ週期發育型傳播（cyclo-developmental transmission）
Ⓑ跨蟲期傳播（transstadial transmission）
Ⓒ週期繁殖型傳播（cyclo-propagative transmission）
Ⓓ繁殖型傳播（propagative transmission）

79 有一水電工人在室外修理水管弄得手腳滿是污泥，幾天後手臂發癢並開始出現一端會持續延伸的紅斑，直到 2 個月後情況才改善，下列敘述那一項錯誤？
Ⓐ該工人可能罹患爬行疹（creeping eruption）
Ⓑ十二指腸鉤蟲（*Ancylostoma duodenale*）感染造成的
Ⓒ紅斑部位會癢是因爲蟲體引起過敏反應
Ⓓ紅斑周圍病理變化可見到嗜伊紅性白血球浸潤

80 確定診斷爲弓蟲症（toxoplasmosis）之病人，測得其血清抗弓蟲（*Toxoplasma gondii*）抗體 IgG 爲陽性反應，同時亦測得 IgM 具高效價陽性反應，則可推論此病人：
Ⓐ在近期 3-6 個月內感染弓蟲 Ⓑ在過去 1-2 年間感染弓蟲
Ⓒ在 2 年以前感染弓蟲 Ⓓ無法判斷

81 感染岡比亞錐蟲（*Trypanosoma gambiense*）之晚期，手指壓迫病人之尺神經（ulnar nerve）部位，病人會有感覺遲鈍的現象，此徵候（sign）稱爲：
Ⓐ Kernig’s sign Ⓑ Romaña’s sign Ⓒ Winterbottom’s sign Ⓓ Kerandel’s sign

82 下列有關熱帶脾臟腫大症候群（tropical splenomegaly syndrome）的敘述，何者錯誤？
Ⓐ病人的脾臟異常腫大
Ⓑ病人血清之 IgG 濃度比當地脾臟大小正常的居民高出甚多
Ⓒ以抗瘧藥物治療會使病人脾臟縮小
Ⓓ病人之肝血管竇（hepatic sinusoid）可能會有淋巴球增加的現象

83 下列那一種經濟分析方法，會將政策實施結果以自然單位（例如避免死亡人數或醫療服務人次）來計算，而且比較適合用在有 2 個或以上政策替選方案的情況下，回答那一個政策或方案「最有效率」的問題？
Ⓐ成本效益分析（cost-benefit analysis） Ⓑ成本效果分析（cost-effectiveness analysis）
Ⓒ成本效用分析（cost-utility analysis） Ⓓ成本分析（cost analysis）

84 依據世界衛生組織的統計，下列那一類疾病是目前人類社會 0 歲至 44 歲者的最主要死因？
Ⓐ事故傷害 Ⓑ傳染性疾病
Ⓒ非傳染性疾病 Ⓓ死產及出生後 1 週內死亡

85 一個公共衛生計畫如果希望達到最起碼的「理性」標準，下列那一個步驟是不可缺少的？
Ⓐ列舉可以測量的政策目標（target） Ⓑ列舉價值性的政策目標
Ⓒ進行人民的健康需要評估 Ⓓ列舉不同的政策替選方案

86 一位婦產科醫師在看診時建議病人做子宮頸抹片檢查，在三段五級的預防層次（levels of prevention）中，這是屬於那一個層次？
Ⓐ第一段第二級 Ⓑ第二段第三級 Ⓒ第三段第四級 Ⓓ第三段第五級

87 根據「擁有心理健康是權利、維護心理健康是責任」的意涵，下列何者錯誤？
Ⓐ罹患精神疾病是無法抗拒的
Ⓑ沒有心理健康就不能稱之爲健康
Ⓒ我們需要有國家的心理健康政策
Ⓓ社會、政治、經濟、醫療等因素都會影響心理健康

88 下列何者不是評估健康服務的指標？
㈠ efficacy ㈡ ethnicity ㈢ effectiveness ㈣ efficiency

89 醫護人員前往社區提供醫療服務，以下列那一種模式最具永續性？
㈠請鄰里長配合醫院已規劃好的工作
㈡挑選院內優秀醫師出國進修社區健康營造技術
㈢固定向政府爭取經費以補助社區的健康營造工作
㈣鼓勵社區組織志工團體並藉充能計畫強化其服務社區的能力

90 下列爲 case-control study、prospective cohort study 與 retrospective cohort study 的比較，何者錯誤？
㈠成本：prospective cohort study＞retrospective cohort study＞case-control study
㈡最易建立時序關係的是 retrospective cohort study
㈢只有 case-control study 無法計算 relative risk 和 absolute risk
㈣ case-control study 所用的樣本數相對較少

91 近年來全球氣候快速變遷，對大氣之成分組成與濃度變化亦產生關鍵性影響。對全世界大多數國家地區而言，下列那一項空氣污染物之消長受此影響最大？
㈠CO ㈡SO_2 ㈢NO_3 ㈣O_3

92 引起集體性食物中毒的最大原因是下列那一項？
㈠食物添加物過量 ㈡農藥殘留 ㈢細菌性污染 ㈣天然食物毒性

93 腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）的診斷，最宜採下列那一種方法？
㈠核磁共振（MRI） ㈡神經傳導速度（NCV）
㈢電腦斷層（CT scan） ㈣身體檢查（physical examination）

94 許多國家的癌症統計資料都顯示，發生率最高的癌症，其死亡率卻不一定是最高的，造成此現象的最主要原因是：
㈠各個國家發生率與死亡率的統計資料品質不一 ㈡各種癌症的致死率不一
㈢對於各種癌症的診斷水準不一 ㈣人口逐漸老化

95 某一關於抽菸在一具人口代表性之世代中的前瞻式追蹤研究，5 年之後對於肺癌之調查結果如下表，就得肺癌的危險性而言，抽菸比不抽菸的相對危險性（relative risk）爲何？

	基線人數	肺癌病例數
抽菸者	70,000	70
不抽菸者	130,000	26

㈠ 2.2 ㈡ 2.7 ㈢ 4.8 ㈣ 5.0

96 病例對照研究中，爲了要探討危險因子單獨對於疾病發生的作用，病例組應選取那種病人？
㈠新發病者 ㈡久病未癒者 ㈢復發者 ㈣得病後改變行爲者

97 有一位小兒精神科醫師探討小朋友住院期間，父母親是否在醫院照顧，和小朋友心理焦慮程度的相關性。此研究使用了一個標準化的精神評估量表，評估小朋友的焦慮程度。此研究者在一個研討會報導其研究結果爲「不論父母親有沒有在醫院照顧的小孩，他們的焦慮狀態在 5%的顯著水準，沒有達到統計上的顯著」。此研究的結論爲：
㈠此檢定有足夠的檢力
㈡此檢定的 p 值小於 0.05
㈢所觀察到兩組小朋友的差異不可能是因爲隨機抽樣誤差所造成
㈣此檢定的 p 值大於 0.05

98 某醫師追蹤研究長期服用避孕藥可能發生的副作用，該研究的觀察偏差（observation bias）可能發生在下列那一項？
㈠評估避孕藥服用情形 ㈡追蹤調查病人參與情形
㈢評估副作用的發生情形 ㈣統計分析、結果報告

99 假如一個人口有 10% 的人有某特定疾病，若從此人口隨機抽取出一個人，此人有此特定疾病的勝算是多少？
㈠ 1/10 ㈡ 1/9 ㈢ 10 ㈣ 9

100 與醫療資源耗用和配置較有關係的健康指標爲何？
㈠疾病盛行率 ㈡疾病發生率 ㈢有效接觸率 ㈣平均餘命