

Задача для собеседования на кафедре

Игорь Вожга Б05-872

Май 2020

Задача TSP

Формулировка: Дана карта, на которой отмечено N поселений. Поселения находятся на различном расстоянии друг от друга. Торговец отправляется из поселения N_0 . Предложите алгоритм, который позволит найти оптимальный маршрут для обхода всех N поселений и вернуться в точку старта.

Ответ должен содержать один или несколько алгоритмов (можно псевдокод) и пояснение о эффективности данных решений.

Решение:

Для решения задачи будем использовать жадный алгоритм *greedy* и алгоритм $2 - opt$, реализующий 2-оптимальную эвристику.

Для начала примитивный алгоритм *greedy* построит цикл, который будет близок к тому, к чему мы стремимся. После этого полученный *greedy* цикл я улучшу спомощью $2opt$.

2-оптимальная эвристика основана на построении окрестности для данного тура τ . То есть для τ строится множество туров τ' полученных из τ спомощью удаления двух рёбер (a, b) и (c, d) и добавления рёбер (a, c) и (b, d) .

А алгоритм $2 - opt$ является реализацией данной эвристики для задачи *TSP*. Построим псевдокод:

(Так как мы в итоге строим цикл, то там по факту не важно с какой позиции мы стартуем, поэтому примем N_0 за единицу)

$In : N$ - колво поселений, множество поселений $P = \{p_1, \dots, p_N\}$; Координаты поселений (x_i, y_i) ;

Первоначальный тур: $\tau = (p_{0_1}, \dots, p_{0_n})$

$Out : \text{Тур } T = (p'_1, \dots, p'_n)$

$begin : \text{Обозн } Pairs_0 = \{(i, j) | i, j \in 1, \dots, n; i \neq j\}$ - множество пар поселений

$Pairs = Pairs_0$

repeat

$Pairs - (a, b)$

$t' = \{p_1, \dots, p_{a-1}, p_b, p_{b-1} \dots, p_{a+1}, p_a, p_{b+1} \dots\}$

if $length(\tau') < length(\tau)$ *then* - где $length$ - длина тура

begin :

$\tau = \tau'$

$Pairs = Pairs_0$

end;

until $|Pairs| = 0$ - пока не переберём все пары для текущего тура

return τ'

end;

Оптимальность алгоритма:

Для начала докажем, что если для входа x алгоритм $2 - opt$ нашёл тур $T = (p_1, \dots, p_n)$, то количество q пар (a, b) поселений для которых

$$\rho(a, b) > \frac{2l^*(x)}{\sqrt{i}} \quad \forall i \in 1, \dots, n \rightarrow q < i \quad (1)$$

(где $l^*(x)$ - оптимальная длина цикла являющегося решением для данного входа x)

Допустим, что это не так, тогда $q \geq i$. Рассмотрим пары поселений (a, b) удовлетворяющие условию (1).

Покажем, что число конечных точек b ограничено.

Рассмотрим окружность радиуса $\frac{l^*(x)}{\sqrt{i}}$ и предположим, что точки b_1, \dots, b_s лежат в данной окружности. Причём $s \geq \sqrt{i}$. А точки a_1, \dots, a_s - это соответствующие им начальные.

Тогда по предположению расстояние между b_1, \dots, b_s не больше $\frac{2l^*(x)}{\sqrt{i}}$. А из этого будет следовать, что между начальными a_1, \dots, a_s расстояние не меньше $\frac{2l^*(x)}{\sqrt{i}}$, потому что

иначе удалив рёбра (a_1, b_1) и (a_1, b_1) и вставив два других: (a_1, a_2) и (b_1, b_2) В T получили бы более короткий тур T' , но это противоречит факту, что T - локально оптимальный тур полученный алгоритмом $2 - opt$. Поэтому мы доказали, что существует $s > \sqrt{i}$ точек на расстоянии не меньше $\frac{2l^*(x)}{\sqrt{i}}$. А значит оптимальный цикл на поселениях a_1, \dots, a_s имеет длину не меньше чем $2l^*(x)$. Однако из неравенства треугольника мы знаем, что если a_1, \dots, a_s является подмножеством входного множества поселений P , то тк добавление точек не может уменьшить длину тура, то длина тура на точках a_1, \dots, a_s должна быть меньше $l^*(x)$. А значит мы пришли к противоречию. То есть внутри такой окружности может лежать $s \leq \sqrt{i}$ конечных точек b_1, \dots, b_s .

Теперь покажем, что когда $q \geq i$ мы можем построить такое множество P' , что $|P'| \geq i$ и любые его точки лежат на расстоянии как минимум $\frac{l^*(x)}{\sqrt{i}}$.

Для этого мы возьмём множество всех поселений P и будем добавлять в P' произвольные конечные точки b_i из P и удалять из P все точки находящиеся в окрестности радиусом $\frac{l^*(x)}{\sqrt{i}}$. Таким образом, исходя из предыдущего пункта так как мы могли удалить $s \leq \sqrt{i}$ конечных точек, то в построенном множестве P' не меньше \sqrt{i} точек.

Таким образом, в P' расстояние между точками $> \frac{l^*(x)}{\sqrt{i}}$, точек $> \sqrt{i}$ значит длина цикла на таком множестве P' $l > l^*$, что противоречит неравенству треугольника, тк P' - подмново P . Таким образом мы доказали утверждение, что количество q пар (a, b) поселений для которых

$$\rho(a, b) > \frac{2l^*(x)}{\sqrt{i}} \quad \forall i \in 1, \dots, n \rightarrow q < i$$

Теперь, если просуммировать по i для n точек и вместо рёбер уже рассматривать полный цикл, то получим выражение, определяющее оптимальность $2 - opt$:

$$L^{2opt} \leq 4 \cdot OPT \sqrt{n}$$

(где OPT - оптимальный размер цикла, L^{2opt} - размер цикла, который вернул алгоритм $2opt$)