

Examen final de SIN: Test del bloc 2 (1,75 punts)

ETSINF, Universitat Politècnica de València, 17 de gener de 2023

Grup, cognoms i nom: 2,

Marca cada requadre amb una única opció. Puntuació: $\max(0, (\text{encerts} - \text{errors}) / 3) \cdot 1,75 / 9$.

- 1 ☐ Supposeu que tenim dues caixes amb 40 taronges en la primera i 80 en la segona. La primera caixa conté 26 taronges Navelina i 14 Caracara. La segona caixa conté tres vegades més taronges Navelina que Caracara. Ara supposeu que s'escull una caixa a l'atzar, i després una taronja a l'atzar de la caixa escollida. Si la taronja escollida és Navelina, la probabilitat P de que procedisca de la primera caixa és:

- A) $0/4 \leq P < 1/4$.
B) $1/4 \leq P < 2/4$.
C) $2/4 \leq P < 3/4$.
D) $3/4 \leq P \leq 4/4$.


- 2 ☐ Siga un problema de classificació en quatre classes per a dades del tipus $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^t \in \{0, 1\}^2$, amb les distribucions de probabilitat de la taula. Indica en quin interval es troba l'error de Bayes, ε^* :

- A) $\varepsilon^* < 0.40$.
B) $0.40 \leq \varepsilon^* < 0.45$.
C) $0.45 \leq \varepsilon^* < 0.50$.
D) $0.50 \leq \varepsilon^*$.

\mathbf{x}		$P(c \mid \mathbf{x})$				$P(\mathbf{x})$
x_1	x_2	$c=1$	$c=2$	$c=3$	$c=4$	
0	0	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1
0	1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3
1	0	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1
1	1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.5

- 3 ☐ Donat el classificador en dues classes definit per la seua frontera i regions de decisió de la figura de la dreta, ¿quin dels següents vectors de pesos (en notació homogènia) defineix un classificador equivalent al donat?

- A) $\mathbf{w}_1 = (0, 0, 2)^t$ i $\mathbf{w}_2 = (1, 0, 0)^t$.
B) $\mathbf{w}_1 = (0, 0, -2)^t$ i $\mathbf{w}_2 = (-1, 0, 0)^t$.
C) $\mathbf{w}_1 = (1, 0, 0)^t$ i $\mathbf{w}_2 = (0, 0, 2)^t$.
D) Tots els vectors de pesos anteriors defineixen classificadors equivalents.





- 4 ☐ Supposeu que estem aplicant l'algorisme Perceptró, amb factor d'aprenentatge $\alpha = 1$ i marge $b = 0.1$, a un conjunt de 4 mostres bidimensionals d'aprenentatge per a un problema de 4 classes, $c = 1, 2, 3, 4$. En un moment donat de l'execució de l'algorisme s'han obtingut els vectors de pesos $\mathbf{w}_1 = (-2, -8, -12)^t$, $\mathbf{w}_2 = (-2, -6, -4)^t$, $\mathbf{w}_3 = (-2, -6, -4)^t$, $\mathbf{w}_4 = (-2, -8, -8)^t$. Suposant que a continuació es va a processar la mostra $(\mathbf{x}, c) = ((5, 3)^t, 2)$, quants vectors de pesos es modificaran?

- A) 0
B) 2
C) 3
D) 4


- 5 ☐ Supposeu que estem aplicant l'algorisme d'aprenentatge d'arbres de classificació per a un problema de dues classes, $c = A, B$. L'algorisme ha arribat a un node t la impuressa del qual, mesurada com l'entropia de la distribució empírica de les probabilitats a posteriori de les classes en t , és $I = 0.72$. Quin és el nombre de mostres de cadascuna de les classes en el node t ?

- A) 8 de classe A i 64 de classe B
B) 16 de classe A i 128 de classe B
C) 16 de classe A i 64 de classe B
D) 8 de classe A i 128 de classe B

- 6 ☐ Donat el conjunt de mostres de 2 classes (○ i ●) de la figura de la dreta, ¿quin dels següents arbres de classificació és coherent amb la partició representada?




7 ☐ La figura següent mostra una partició de 5 punts bidimensionals en dos clústers, \bullet i \circ :



Si transferim de clúster el punt $(7, 1)^t$, es produeix una variació de la suma d'errors quadràtics (SEQ), $\Delta J = J - J'$ (SEQ després de l'intercanvi menys SEQ abans de l'intercanvi), tal que:

- A) $\Delta J < -7$.
- B) $-7 \leq \Delta J < 0$.
- C) $0 \leq \Delta J < 7$.
- D) $\Delta J \geq 7$.

8 ☐ Siga M un model de Markov de representació gràfica:



Quantes cadenes distintes de llargària 2 que comencen pel símbol a pot generar M ?

- A) Cap.
- B) Una.
- C) Dos.
- D) Més de dos.

9 ☐ Siga M un model de Markov de conjunt d'estats $Q = \{1, 2, F\}$; alfabet $\Sigma = \{a, b\}$; probabilitats inicials $\pi_1 = \frac{1}{2}, \pi_2 = \frac{1}{2}$; matriu de probabilitats de transició entre estats A i d'emissió de símbols B , i matriu Forward α :

A	1	2	F
1	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$
2	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$

B	a	b
1	$\frac{3}{6}$	$\frac{3}{6}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

α	b	b
1	$\frac{1}{4}$	α_{12}
2	$\frac{3}{8}$	α_{22}

Quins són els valors corresponents a α_{12} i α_{22} ?

- A) $\alpha_{12} = \frac{1}{28}, \alpha_{22} = \frac{27}{224}$
- B) $\alpha_{12} = \frac{1}{16}, \alpha_{22} = \frac{27}{224}$
- C) $\alpha_{12} = \frac{1}{28}, \alpha_{22} = \frac{39}{224}$
- D) $\alpha_{12} = \frac{1}{16}, \alpha_{22} = \frac{39}{224}$

Examen final de SIN: Problema del bloc 2 (2 punts)

ETSINF, Universitat Politècnica de València, 17 de gener de 2023

Grup, cognoms i nom: 2,

Problema sobre Viterbi

Siga M un model de Markov de conjunt d'estats $Q = \{1, 2, F\}$; alfabet $\Sigma = \{a, b\}$; probabilitats inicials $\pi_1 = \frac{1}{2}, \pi_2 = \frac{1}{2}$; i probabilitats de transició entre estats i d'emissió de símbols:

A	1	2	F
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$
2	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$

B	a	b
1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Es demana:

- (1 punt) Realitzeu una traça de l'algorisme de *Viterbi* per a obtindre la seqüència d'estats més probable amb la qual M genera la cadena **aa**.
- (1 punto) Donats els parells d'entrenament, cadena - seqüència de Viterbi, (**ab**, 12F) i (**bbab**, 2212F) amb la cadena **aa** i la seua seqüència de Viterbi calculada en l'apartat anterior, reestimeu els paràmetres d' M mitjançant una iteració de l'algorisme de reestimació per Viterbi.