

Examen final de SIN: Test del bloc 2 (1,75 punts)

ETSINF, Universitat Politècnica de València, 3 de febrer de 2021

Grup, cognoms i nom: TA-Blanc, 3,

Marca cada requadre amb una única opció. Puntuació: $\max(0, (\text{encerts} - \text{errors} / 3) \cdot 1,75 / 6)$.

- 1 ☐ Siga M un model de Markov de conjunt d'estats $Q = \{1, 2, F\}$ i alfabet $\Sigma = \{a, b\}$. Durant l'aplicació d'una iteració de l'algorisme de reestimació per Viterbi, s'ha obtingut un parell "(cadena, camí més probable)" per cada cadena d'entrenament. Seguidament, a partir de tots els parells obtinguts, s'han obtingut els comptes (freqüències absolutes) d'emissió de símbols en els estats mostrats en la taula a la dreta. La normalització *correcta* d'aquests comptes resultarà en la taula de probabilitats d'emissió de símbols en els estats:

B	a	b
1	2	2
2	1	3

A)

B	a	b
1	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$

B)

B	a	b
1	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$


C)

B	a	b
1	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{5}$

D)


B	a	b
1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{5}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{5}$

- 2 ☐ La figura següent mostra una partició de 6 punts bidimensionals en dos clústers, \bullet i \circ :



La transferència del punt $(4, 1)^t$ del clúster \bullet al clúster \circ produeix una variació de la suma d'errors quadràtics, ΔJ , tal que:

- A) $\Delta J < 0$, açò és, la transferència és profitosa.
 B) $0 \leq \Delta J < 1$.
 C) $1 \leq \Delta J < 2$.
 D) $\Delta J \geq 2$.
- 3 ☐ Siga M el model de Markov representat en la figura a la dreta, on B_{1s} denota una probabilitat *positiva* d'emissió del símbol s ($s = a, b$) en l'estat 1. Donada la cadena $x = "aba"$, suposeu que s'està aplicant l'algorisme *Forward*, havent-hi arribat al càlcul de la probabilitat de que M emeta x i en l'instant 3 es trobe en l'estat 1, $\alpha_{13} = P_M(x = "aba", q_3 = 1)$. Si $\alpha_{13}(B_{1s})$ denota el valor de α_{13} en funció de les probabilitats d'emissió en l'estat 1, indica quina de les següents afirmacions *no* es compleix:



- A) $\alpha_{13}(B_{1s})$ amb $B_{1a} = 0.1$ és menor que $\alpha_{13}(B_{1s})$ amb $B_{1a} = 0.4$.
 B) $\alpha_{13}(B_{1s})$ amb $B_{1a} = 0.9$ és menor que $\alpha_{13}(B_{1s})$ amb $B_{1a} = 0.7$.
 C) $\alpha_{13}(B_{1s})$ amb $B_{1a} = 0.4$ és menor que $\alpha_{13}(B_{1s})$ amb $B_{1a} = 0.6$.
 D) $\alpha_{13}(B_{1s})$ amb $B_{1a} = 0.2$ és menor que $\alpha_{13}(B_{1s})$ amb $B_{1a} = 0.1$.

4 ☐ Supposeu que estem aplicant l'algorisme d'aprenentatge d'arbres de classificació per a un problema de 4 classes, $c = 1, 2, 3, 4$. L'algorisme ha arribat a un node t que ha estat dividit en un node esquerre amb 0 mostres de la classe 1, 0 mostres de la classe 2, 1 mostra de la classe 3 i 3 mostres de la classe 4; i un node dret amb 1 mostra de la classe 1, 2 mostres de la classe 2, 0 mostres de la classe 3 i 0 mostres de la classe 4, quin decrement d'impuresa s'ha assolit amb esta partició?

- A) $0.00 \leq \Delta\mathcal{I} < 0.25$.
- B) $0.25 \leq \Delta\mathcal{I} < 0.50$.
- C) $0.50 \leq \Delta\mathcal{I} < 0.75$.
- D) $0.75 \leq \Delta\mathcal{I}$.

5 ☐ Siga $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_D)^t$, $D > 1$, un objecte representat mitjançant un vector de característiques D -dimensional a classificar en una de C classes. Indica quin dels següents classificadors *no* és (de risc) d'error mínim:

- A) $c(\mathbf{x}) = \arg \max_{c=1, \dots, C} p(c) p(c | x_1) p(x_2, \dots, x_D | x_1, c)$
- B) $c(\mathbf{x}) = \arg \max_{c=1, \dots, C} p(c | x_1) p(x_2, \dots, x_D | x_1, c)$
- C) $c(\mathbf{x}) = \arg \max_{c=1, \dots, C} \log p(x_1, c) + \log p(x_2, \dots, x_D | x_1, c)$
- D) $c(\mathbf{x}) = \arg \max_{c=1, \dots, C} \log p(c | x_1) + \log p(x_2, \dots, x_D | x_1, c)$

6 ☐ Supposeu que estem aplicant l'algorisme Perceptró, amb factor d'aprenentatge $\alpha = 1$ i marge $\gamma = 0.1$, a un conjunt de 4 mostres bidimensionals d'aprenentatge per a un problema de 4 classes, $c = 1, 2, 3, 4$. En un moment donat de l'execució de l'algorisme s'han oberts els vectors de pesos $\mathbf{w}_1 = (-2, -8, -5)^t$, $\mathbf{w}_2 = (-2, -6, -3)^t$, $\mathbf{w}_3 = (-2, -6, -11)^t$, $\mathbf{w}_4 = (-2, -4, -7)^t$. Suposant que a continuació es va a processar la mostra $(\mathbf{x}, c) = ((4, 1)^t, 2)$, quants vectors de pesos es modificaran?

- A) 0
- B) 2
- C) 3
- D) 4


Examen final de SIN: Problema del bloc 2 (2 punts)

ETSINF, Universitat Politècnica de València, 3 de febrer de 2021

Grup, cognoms i nom: TA-Blanc, 3,

Problema sobre Bayes

Es té un problema de classificació en dues classes, A i B , per a objectes representats mitjançant una única característica discreta, $x \in \{0, 1, \dots, 10\}$. Se sap que les probabilitats a priori de les classes són $P(A) = 0.7$ i $P(B) = 0.3$. Així mateix, se sap que les funcions de probabilitat condicionals de les classes són:



Siga $x = 5$. Es demana:

1. (0.5 punts) Determina la probabilitat (incondicional) d'observar x .
2. (0.5 punts) Troba la probabilitat a posteriori de que x pertanyi a la classe A .
3. (0.5 punts) Classifica x per mínim (risc d')error.
4. (0.5 punts) Calcula l'error de Bayes.