

Polifenoles de calafate

Berberis microphylla G. Forst

Estructuras químicas para COSMO-RS

33 estructuras discretas

Antocianina — 10

Flavonol — 11

Flavan-3-ol — 2

Ác. Hidroxicinámico — 7

Ác. Hidroxibenzoico — 1


Tanino Condensado — 2

Las antocianinas se representan como CATIÓN FLAVILIO (carga +1), que es la especie dominante a pH 2-4 (rango de los NADES de este trabajo).

Fórmula, peso molecular, carga y número de anillos verificados computacionalmente (RDKit). La estereoquímica NO está verificada: contrastar por InChIKey contra PubChem antes del paso QM.


Fuente de la lista: Ruiz et al. (2024) Horticulturae 10, 458 (fruto); Mocan et al. (2017) y Muñoz et al. (2011) para hojas y tallo, con asignaciones generalizadas de Berberis spp.

Cianidín-3-glucósido




Antocianina · C₂₁H₂₁O₁₁⁺ · 449.39 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
RKWHWFONKJEUUF-GQUPQBGVSA-O

Cianidín-3-rutinosido




Antocianina · C₂₇H₃₁O₁₅⁺ · 595.53 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
USNPULRDBDVJAO-ACXVBFAASA-O

Delfinidín-3-glucósido




Antocianina · C₂₁H₂₁O₁₂⁺ · 465.39 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
XENHPQQLDPAYIJ-PEVLUNPASA-O

Delfinidín-3-rutinosido




Antocianina · C₂₇H₃₁O₁₆⁺ · 611.53 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
PLKUTZNSKRWCCA-QXVQRCPSNA-O

Malvidín-3-glucósido




Antocianina · C₂₃H₂₅O₁₂⁺ · 493.44 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
PXUQTDZNOHRWLI-OXUVVBNBSA-O

Malvidín-3-rutinosido




Antocianina · C₂₉H₃₅O₁₆⁺ · 639.58 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
YCDMGCUGMVVWAB-YAGJAPKFSOA-O

Peonidín-3-glucósido




Antocianina · C₂₂H₂₃O₁₁⁺ · 463.42 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
ZZWPMFROUHHAKY-OUUKCGNVSA-O

Peonidín-3-rutinosido




Antocianina · C₂₈H₃₃O₁₅⁺ · 609.56 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
ONQVTPMFYSRLL-LVQFFINWSA-O

Petunidín-3-glucósido




Antocianina · C₂₂H₂₃O₁₂⁺ · 479.41 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
CCQDWIRWKWIUK-KQYBYQKWSA-O

Petunidín-3-rutinosido




Antocianina · C₂₈H₃₃O₁₆⁺ · 625.56 g/mol · carga +1
fuente: Ruiz 2024
IWTWNQZWPPSSQB-CBJDNGMYSA-O

Isorhamnetina




Flavonol · C₁₆H₁₂O₇ · 316.27 g/mol
fuente: Molecules 2019
IZQSVBODKVDZ-UHFFFAOYSA-N

Isorhamnetín-3-galactosido




Flavonol · C₂₂H₂₂O₁₂ · 478.41 g/mol
fuente: Ruiz 2024
CQLRUIIRZYYHS-UVHBULKNSA-N

Isorhamnetín-3-rutinosido




Flavonol · C₂₈H₃₂O₁₆ · 624.55 g/mol
fuente: Ruiz 2024
UIDGLYUNOUKLBM-WDJYQGQPSA-N

Kaempferol-3-glucósido




Flavonol · C₂₁H₂₀O₁₁ · 448.38 g/mol
fuente: Molecules 2019
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N

Quercetina




Flavonol · C₁₅H₁₀O₇ · 302.24 g/mol
fuente: Molecules 2019
REFJWTPEDVJJY-UHFFFAOYSA-N

Quercetín-3-galactosido




Flavonol · C₂₁H₂₀O₁₂ · 464.38 g/mol
fuente: Ruiz 2024
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N

Quercetín-3-glucósido




Flavonol · C₂₁H₂₀O₁₂ · 464.38 g/mol
fuente: Ruiz 2024
OVSQVDMCBVZWGM-QSOFNFLRSA-N

Quercetín-3-malonilgalactosido




Flavonol · C₂₄H₂₂O₁₅ · 550.43 g/mol
fuente: Ruiz 2024
NBQPHANHNTWDM-LYYYZAYPPSA-N

Quercetín-3-malonilglucósido




Flavonol · C₂₄H₂₂O₁₅ · 550.43 g/mol
fuente: Ruiz 2024
NBQPHANHNTWDM-L-UJKBSQBPSA-N

Quercetín-3-ramnosido




Flavonol · C₂₁H₂₀O₁₁ · 448.38 g/mol
fuente: Ruiz 2024
OXGUCUVFOIWWQJ-VHQAYEMVSA-N

Quercetín-3-rutinosido (Rutina)




Flavonol · C₂₇H₃₀O₁₆ · 610.52 g/mol
fuente: Ruiz 2024
IKGXIBQEEMLURG-FYIKAPSBASA-N

Catequina




Flavan-3-ol · C₁₅H₁₄O₆ · 290.27 g/mol
fuente: Molecules 2019
PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N

Epicatequina




Flavan-3-ol · C₁₅H₁₄O₆ · 290.27 g/mol
fuente: Molecules 2019
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N

3-Cafeoilquínico




Ác. Hidroxicinámico · C₁₆H₁₈O₉ · 354.31 g/mol
fuente: Ruiz 2024
GYFFKZTYAFCTR-DHLOTTMOSA-N

4-Cafeoilquínico




Ác. Hidroxicinámico · C₁₆H₁₈O₉ · 354.31 g/mol
fuente: Ruiz 2024
GYFFKZTYAFCTR-ZZVAFGPTSA-N

Cafeoilglucárico (isómeros A-D)




Ác. Hidroxicinámico · C₁₅H₁₆O₁₁ · 372.28 g/mol
fuente: Ruiz 2024
OMIXKOJEIRRAJW-HLWOJZJGSA-N

Dicafeoilglucárico




Ác. Hidroxicinámico · C₂₄H₂₂O₁₄ · 534.43 g/mol
fuente: Ruiz 2024
ZQGMKFHEDFRLZ-BYCAZERCSA-N

Ácido Cafeico




Ác. Hidroxicinámico · C₉H₈O₄ · 180.16 g/mol
fuente: Molecules 2019
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N

Ácido Clorogénico (5-cafeoilquínico)




Ác. Hidroxicinámico · C₁₆H₁₈O₉ · 354.31 g/mol
fuente: Ruiz 2024
CWVRJTMFETXNAD-QEPAVKMUSA-N

Ácido Ferúlico




Ác. Hidroxicinámico · C₁₀H₁₀O₄ · 194.19 g/mol
fuente: JChromA 2013
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N

Ácido Elágico




Ác. Hidroxibenzoico · C₁₄H₆O₈ · 302.19 g/mol
fuente: Modelo NEP
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N

Procianidina B1



Tanino Condensado · C₃₀H₂₆O₁₂ · 578.53 g/mol
fuente: Modelo NEP
UPSCCKSYXWBZPX-FSIJYMTBSA-N

Procianidina B2



Tanino Condensado · C₃₀H₂₆O₁₂ · 578.53 g/mol
fuente: Modelo NEP
UPSCCKSYXWBZPX-KWKLTRBOSA-N