

ALGEBRĂ - SIMULARE TEST UNIC

OVIDIU VEGHEȘ

noiembrie 2016

Testul de simulare este disponibil începând cu data de luni 28 noiembrie 2016. Conținutul acestei foi se tipărește (sau se copiază cu mâna) pe o foaie de hârtie albă înainte de începerea testului. El reprezintă anexa ce conține informații necesare rezolvării testului. Simularea permite reluarea testului de ori câte ori este nevoie (spre deosebire de testul unic !!) În timpul rezolvării folosiți notițele, unitățile de învățare și ori ce material îl considerați necesar. Timpul de rezolvare al testului de simulare este limitat la 30 minute. Notați la fiecare reluare atât timpul consumat cât și punctajul obținut. Aceste informații se comunică cadrului didactic, o singură dată (pentru toate încercările), prin email, pe adresa: ovidiuvro2012@gmail.com până marți 17 ianuarie 2017 ora 23⁵⁰.

Testul unic va fi disponibil între 12 ianuarie 2017 ora 19 și 14 ianuarie 2017 ora 15.

== == ==

În spațiul vectorial real \mathbb{R}^3 se consideră vectorii

$$(1.1) \quad v_1 = (0, 1, -1), v_2 = (1, -1, 1), v_3 = (1, 1, -1), v_4 = (1, 1, 2), v_5 = (2, 0, 1)$$

În spațiul vectorial real \mathbb{R}^4 se consideră reperul canonic $E = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ și endomorfismul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ pentru care matricea de reprezentare a sa în perechea de repere E, E este

$$(1.2) \quad A = [T]_E^E = \begin{bmatrix} 19 & 34 & 51 & 17 \\ -5 & -8 & -15 & -5 \\ -3 & -6 & -7 & -3 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

În spațiul vectorial real \mathbb{R}^n , cu $n \in \mathbb{N}$, considerăm un subspațiu vectorial \mathbb{W} . Notăm cu

$$(1.3) \quad w_{\max}^* = \max \{w_1 + \dots + w_n \mid w \in \mathbb{W} \text{ cu } \|w\|_{\infty} = 1\}$$

unde $\|(w_1, \dots, w_n)\|_{\infty} = \max \{|w_1|, \dots, |w_n|\}$ este norma cubică a vectorului $w = (w_1, \dots, w_n)$.

Started on	Sunday, 11 December 2016, 12:18 AM
State	Finished
Completed on	Sunday, 11 December 2016, 12:37 AM
Time taken	19 mins 8 secs
Marks	8.00/8.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

O mulțime de vectori este liniar independentă dacă:

Select one or more:

- ☒ a. Nu este liniar dependentă ✓ ok
- ☒ b. Este o submulțime a altei mulțimi liniar independente ✓ ok
- ☐ c. Este o supramulțime a unei mulțimi liniar independente
- ☒ d. Orice combinație liniară nulă atrage toți scalarii sunt nuli ✓ ok
- ☐ e. Nu conține vectorul nul

Bine

The correct answer is: Este o submulțime a altei mulțimi liniar independente, Orice combinație liniară nulă atrage toți scalarii sunt nuli, Nu este liniar dependentă

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

O matrice pătrată este bloc Jordan dacă are următoarea structură:

Select one or more:

- ☒ a. Pe diagonala principală o constantă, iar în rest zero ✓ ok
- ☐ b. Pe diagonala principală celule Jordan, iar în rest zero
- ☒ c. Pe diagonala principală o constantă, pe diagonala imediat inferioară cel puțin un unu și altfel zero, iar în rest zero ✓ ok
- ☐ d. Nu este matrice Jordan
- ☒ e. Pe diagonala principală o constantă, pe diagonala imediat superioară cel puțin un unu și altfel zero, iar în rest zero ✓ ok

Bine

The correct answer is: Pe diagonala principală o constantă, iar în rest zero, Pe diagonala principală o constantă, pe diagonala imediat superioară cel puțin un unu și altfel zero, iar în rest zero, Pe diagonala principală o constantă, pe diagonala imediat inferioară cel puțin un unu și altfel zero, iar în rest zero

Algebră, Tip-AT, Sem-1, ID (2017)

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Teorema Hamilton-Cayley este adevărată pentru următoarele corpuri:

Select one or more:

- ☐ a. H (corpul cuaternionilor)
- ☐ b. Z_3
- ☒ c. Q ✓ ok
- ☐ d. Z_2
- ☒ e. R ✓ ok

Bine

The correct answer is: R , Q

Algebră, Tip-AT, Sem-1, ID (2017)

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Suma directă a r subspații vectoriale poate fi definită în mod echivalent în cel mult ... moduri:

Select one or more:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 5 ✓ ok
- ☒ c. 4 ✓ ok
- ☒ d. 3 ✓ ok
- ☐ e. 2

Bine

The correct answer is: 3, 4, 5

Algebră, Tip-AT, Sem-1, ID (2017)

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

În contextul relației 1.1 din anexă se consideră X_1 acoperirea liniară a vectorilor v_1, v_2 și v_3 , respectiv X_2 acoperirea liniară a vectorilor v_4 și v_5 . Fie Y intersecția subspațiilor X_1 și X_2 . Atunci dimensiunea lui Y este:

Select one:

- ☒ a. 1 ✓ ok
- ☐ b. 2
- ☐ c. 0
- ☐ d. Alt răspuns decât cele alăturate
- ☐ e. 3

Bine

The correct answer is: 1

Algebră, Tip-AT, Sem-1, ID (2017)

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

În contextul relației 1.1 din anexă se consideră X_1 acoperirea liniară a vectorilor v_1, v_2 și v_3 , respectiv X_2 acoperirea liniară a vectorilor v_4 și v_5 . Fie Y intersecția subspațiilor X_1 și X_2 . Atunci y_{\max}^* definit de relația 1.3 este cuprins în intervalul:

Select one:

- ☐ a. $(2;3]$
- ☒ b. $(0,5;1]$ ✓ ok
- ☐ c. $(0;0,5]$
- ☐ d. $(1,5;2]$
- ☐ e. $(1;1,5]$

Bine

The correct answer is: $(0,5;1]$

Algebră, Tip-AT, Sem-1, ID (2017)

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

În contextul relației 1.2 din anexă se consideră Y subspațiul propriu corespunzător unei valori proprii cu dimensiunea algebrică 1. Atunci y_{\max}^* definit de relația 1.3 este cuprins în intervalul:

Select one:

- ☐ a. $(0; 3/7]$
- ☐ b. $(3/7; 4/7]$
- ☐ c. $(5/7; 6/7]$
- ☒ d. $(4/7; 5/7]$ ✓ ok
- ☐ e. $(6/7; 4]$

Bine

The correct answer is: $(4/7; 5/7]$

Algebră, Tip-AT, Sem-1, ID (2017)

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

În contextul relației 1.2 din anexă se consideră a_n suma componentelor matricei A^n și r_n restul împărțirii lui a_n la $2^n - 1$, pentru n număr natural nenul. Atunci r_{2011} este:

Select one:

- ☐ a. 0,1,2
- ☐ b. 9,10,...,16
- ☒ c. 3,4 ✓ ok
- ☐ d. 5,6,7,8
- ☐ e. Nici una din variantele alăturate

Bine

The correct answer is: 3,4

QUIZ NAVIGATION

1 2 3 4 5 6 7 8

Show all questions on one page

Finish review