

1098 Найти жорданову форму следующей матрицы:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$$

Решим характеристическое уравнение $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -3 & 3 \\ -2 & -6 - \lambda & 13 \\ -1 & -4 & 8 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-6 - \lambda)(8 - \lambda) + 39 + 24 + 3(-6 - \lambda) - 6(8 - \lambda) + 52(1 - \lambda) = -(\lambda - 1)^3$$

Корень $\lambda = 1$, алгебраическая кратность равна $\alpha = 3$ (входит во третьей степени в уравнение)

Геометрическая кратность $\beta = 3 - \text{Rg}(A - \lambda E) = 3 - 2 = 1$ (вектор получился $(3 \ 1 \ 1)^T$)

Тогда ЖНФ

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1102 Найти жорданову форму следующей матрицы:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & 2 \\ 8 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

Решим характеристическое уравнение $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 0 \\ 6 & -3 - \lambda & 2 \\ 8 & -6 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)(-3 - \lambda)(5 - \lambda) - 16 + 0 - 0 + 6(5 - \lambda) + 12(3 - \lambda) = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 9\lambda + 5 =$$

$$= -(\lambda - 1)(\lambda - (2 - i))(\lambda - (2 + i))$$

Корень $\lambda = 1$, алгебраическая кратность равна $\alpha_1 = 1$, геометрическая кратность равна $\beta_1 = 1$ (так как геометрическая кратность не превышает алгебраическую кратность и не меньше 1)

Корень $\lambda = 2 - i$, алгебраическая кратность равна $\alpha_{2-i} = 1$, геометрическая кратность равна $\beta_{2-i} = 1$ (аналогично)

Корень $\lambda = 2 + i$, алгебраическая кратность равна $\alpha_{2+i} = 1$, геометрическая кратность равна $\beta_{2+i} = 1$ (аналогично)

Тогда ЖНФ

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 - i & 0 \\ 0 & 0 & 2 + i \end{pmatrix}$$

Примечание. У вас могла получиться другая ЖНФ, где значения идут в другом порядке. ЖНФ единственна с точностью до перестановки клеток.

1134 Найти минимальный многочлен следующей матрицы:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Определение. Минимальным многочленом линейного оператора A называется многочлен $\mu(\lambda) \neq 0$ такой, что $\mu(A) = 0$, старший коэффициент 1 и степень минимальна.

Примечание. Минимальный многочлен похож на характеристическое уравнение, но степень у корней будет равна длине максимальной жордановой цепочки.

Есть три способа нахождения минимального многочлена. Первый способ: составить характеристическую матрицу $(A - \lambda E)$, привести её к диагональному виду и последний инвариантный множитель и будет минимальным многочленом. Но мы рассмотрим второй и третий способ, причем решение через поиск ЖНФ будем использовать для проверки, а в основном воспользуемся формулой:

$$\mu_A(\lambda) = \frac{(-1)^n \chi_A(\lambda)}{d_{n-1}(\lambda)}, \text{ где } d_{n-1}(\lambda) - \text{НОД миноров хар. матрицы порядка } n-1$$

Составим характеристическую матрицу

$$\begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

Найдём её миноры порядка 2 (α_{ij} - определитель матрицы, полученный вычеркиванием i строки и j столбца)

$$\alpha_{11} = (2-\lambda)(1-\lambda)$$

$$\alpha_{12} = 0$$

$$\alpha_{13} = -(2-\lambda)$$

$$\alpha_{21} = 1-\lambda+1 = 2-\lambda$$

$$\alpha_{22} = (3-\lambda)(1-\lambda) + 1 = (2-\lambda)^2$$

$$\alpha_{23} = 3-\lambda-1 = 2-\lambda$$

$$\alpha_{31} = 2-\lambda$$

$$\alpha_{32} = 0$$

$$\alpha_{33} = (3-\lambda)(2-\lambda)$$

НОД, как можно заметить, $d_{n-1}(\lambda) = (2-\lambda)$

Найдём и характеристический многочлен

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \{\text{разложу по второй строке}\} = (2-\lambda)((3-\lambda)(1-\lambda) + 1) = (2-\lambda)(2-\lambda)^2 = -(\lambda-2)^3$$

Осталось только посчитать по формуле

$$\mu_A(\lambda) = \frac{(-1)^3(-(\lambda-2)^3)}{(2-\lambda)} = (\lambda-2)^2$$

Теперь посмотрим на ЖНФ, в данном примере она выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Примечание. Первая клетка размером 2 на 2 с собственным значением 2 и вторая клетка размером 1 на 1 с собственным значением 1. Максимальная длина жордановой цепочки для собственного значения 2 равна 2, тогда степень 3 у данного собственного значения в характеристическом многочлене заменим на 2 и получим $-(\lambda-2)^2$, но помним про то, что старший коэффициент должен быть равен 1, а тогда минимальный многочлен равен $\mu_A(\lambda) = (\lambda-2)^2$

1135 Найти минимальный многочлен следующей матрицы:

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -5 & 7 & -5 \\ -6 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

Составим характеристическую матрицу

$$\begin{pmatrix} 4-\lambda & -2 & 2 \\ -5 & 7-\lambda & -5 \\ -6 & 6 & -4-\lambda \end{pmatrix}$$

Найдём её миноры порядка 2 (α_{ij} - определитель матрицы, полученный вычеркиванием i строки и j столбца)

$$\alpha_{11} = (7-\lambda)(-4-\lambda) + 30 = 2 - 3\lambda + \lambda^2 = (\lambda-1)(\lambda-2)$$

$$\alpha_{12} = -5(-4-\lambda) - 30 = 5\lambda - 10 = 5(\lambda-2)$$

$$\alpha_{13} = -30 + 6(7-\lambda) = 12 - 6\lambda = -6(\lambda-2)$$

$$\alpha_{21} = -2(-4-\lambda) - 12 = 8 + 2\lambda - 12 = 2(\lambda-2)$$

$$\alpha_{22} = (4-\lambda)(-4-\lambda) + 12 = \lambda^2 - 4 = (\lambda+2)(\lambda-2)$$

$$\alpha_{23} = 6(4-\lambda) - 12 = 12 - 6\lambda = -6(\lambda-2)$$

$$\alpha_{31} = 10 - 2(7-\lambda) = 10 - 14 + 2\lambda = 2(\lambda-2)$$

$$\alpha_{32} = -5(4-\lambda) + 10 = 5\lambda - 10 = 5(\lambda-2)$$

$$\alpha_{33} = (4-\lambda)(7-\lambda) - 10 = (\lambda-2)(\lambda-9)$$

НОД, как можно заметить, $d_{n-1}(\lambda) = (\lambda-2)$

Найдём и характеристический многочлен

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & -2 & 2 \\ -5 & 7-\lambda & -5 \\ -6 & 6 & -4-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12 = -(\lambda-3)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = -(\lambda-3)(\lambda-2)^2$$

Осталось только посчитать по формуле

$$\mu_A(\lambda) = \frac{(-1)^3(-(\lambda-3)(\lambda-2)^2)}{(\lambda-2)} = (\lambda-2)(\lambda-3)$$

Теперь посмотрим на ЖНФ, в данном примере она выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Примечание. Первая клетка размером 1 на 1 с собственным значением 2, вторая клетка размером 1 на 1 с собственным значением 2, третья клетка размером 1 на 1 с собственным значением 3. Максимальная длина жордановой цепочки для собственного значения 2 и 3 равна 1, тогда степень 2 у собственного значения 2 в характеристическом многочлене заменим на 1 и получим $-(\lambda-3)(\lambda-2)$, но помним про то, что старший коэффициент должен быть равен 1, а тогда минимальный многочлен равен $\mu_A(\lambda) = (\lambda-3)(\lambda-2)$

1370 Найти ортогональную проекцию y и ортогональную составляющую z вектора $x = (4, -1, -3, 4)$ на линейное подпространство L , натянутое на векторы $a_1 = (1, 1, 1, 1)$, $a_2 = (1, 2, 2, -1)$, $a_3 = (1, 0, 0, 3)$

Определение. Пусть H - подпространство в V . Множество $H^\perp = \{x \in V \mid (x, y) = 0 \ \forall y \in H\}$ называется ортогональным дополнением H .

Утверждение. H^\perp является линейным подпространством в V и $V = H \oplus H^\perp$ (прямая сумма групп, надеюсь, вы про неё помните).

Определение. $x = y + z$, где $y \in H$ - ортогональная проекция x на H , а $z \in H^\perp$ - ортогональная составляющая x относительно H .

Для начала найдём базис L^\perp , для этого выпишем векторы по столбцам и найдём ФСР

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ФСР: $b_1 = (0, -1, 1, 0)$; $b_2 = (-3, 2, 0, 1)$ - базис L^\perp

Тогда $z = \alpha b_1 + \beta b_2$, а $x = y + z = y + \alpha b_1 + \beta b_2$

По свойствам скалярного произведения ($(y, b_1) = 0$ и $(y, b_2) = 0$ по определению ортогонального дополнения)

$$\begin{cases} (x, b_1) = (y + \alpha b_1 + \beta b_2, b_1) = (y, b_1) + \alpha(b_1, b_1) + \beta(b_2, b_1) = \alpha(b_1, b_1) + \beta(b_2, b_1) \\ (x, b_2) = (y + \alpha b_1 + \beta b_2, b_2) = (y, b_2) + \alpha(b_1, b_2) + \beta(b_2, b_2) = \alpha(b_1, b_2) + \beta(b_2, b_2) \end{cases}$$

Нам известны x , b_1 , b_2 , а значит, мы можем найти все скалярные произведения и получить α и β

$$\begin{cases} -2 = 2\alpha - 2\beta \\ -10 = -2\alpha + 14\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

$$z = -2b_1 - b_2 = (3, 0, -2, -1)$$

$$y = x - z = (1, -1, -1, 5)$$

1374 а) Найти расстояние от точки, заданной вектором $x = (4, 2, -5, 1)$, до линейного многообразия, заданного системой уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 9 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 12 \end{cases}$$

Определение. Расстоянием от точки M , заданной вектором x до линейного многообразия (множество решений неоднородной СЛАУ) L называется $\rho(M, L) = \min \|x - u\|$, где $u \in L$

Утверждение. Расстояние $\rho(M, L) = \rho(M, x_0 + L_0) = \rho(M - x_0, L_0)$ равно длине ортогональной составляющей вектора $x - x_0$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -2 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & -4 & 2 & 3 & 12 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -2 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0.5 & 1 & 4.5 \\ 0 & 1 & -0.5 & -0.5 & -1.5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0.5 & 3 \\ 0 & 1 & -0.5 & -0.5 & -1.5 \end{array} \right)$$

Частное решение $x_0 = (3, -1.5, 0, 0)$

$$b_1 = (2, 0, 0, 1) \in L^\perp, \quad b_2 = (0, 2, -1, -1) \in L^\perp$$

$$z = \alpha b_1 + \beta b_2, \quad x - x_0 = y + z = y + \alpha b_1 + \beta b_2$$

$$\begin{cases} (x - x_0, b_1) = (y + \alpha b_1 + \beta b_2, b_1) = \alpha(b_1, b_1) + \beta(b_2, b_1) \\ (x - x_0, b_2) = (y + \alpha b_1 + \beta b_2, b_2) = \alpha(b_1, b_2) + \beta(b_2, b_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 = 5\alpha - \beta \\ 11 = -\alpha + 6\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 2 \end{cases}$$

$$z = b_1 + 2b_2 = (2, 4, -2, -1), \quad \rho(M, L) = \|z\| = \sqrt{(z, z)} = 5$$

1542 Линейное преобразование φ евклидова пространства в базисе из векторов $f_1 = (1, 2, 1)$, $f_2 = (1, 1, 2)$, $f_3 = (1, 1, 0)$ задано матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 2 & 7 & -3 \end{pmatrix}$$

Найти матрицу сопряженного преобразования φ^* в том же базисе, считая, что координаты векторов базиса даны в некотором ортонормированном базисе.

Определение. Линейный оператор $\varphi^* : \epsilon \rightarrow \epsilon$ называется сопряженным к линейному оператору $\varphi : \epsilon \rightarrow \epsilon$, если $\forall x, y \in \epsilon (A_\varphi x, y) = (x, A_{\varphi^*} y)$

Теорема. Для любого линейного оператора существует (и единственный) сопряженный оператор, причем его матрица вычисляется по формуле $(A_{\varphi^*})_b = G^{-1}(A_\varphi)_b^T G$, G - матрица Грама базиса b .

Примечание. Матрица Грама базиса b $G[i, j] = (b_i, b_j)$, то есть скалярное произведение векторов.

Найдём матрицу Грама и обратную к ней (посмотрите первый модуль пеерд экзаменом, если забыли, как найти обратную матрицу)

$$G(f_1, f_2, f_3) = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad G^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 0.75 & 0.75 \\ -2 & 0.75 & 2.75 \end{pmatrix}$$

Тогда по формуле

$$A_\varphi^* = G^{-1} A_\varphi^T G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 0.75 & 0.75 \\ -2 & 0.75 & 2.75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & 7 \\ 3 & -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -36 & -37 & -15 \\ 30 & 30 & 14 \\ 26 & 27 & 9 \end{pmatrix}$$

1558 Пусть G - матрица Грама некоторого базиса и A - матрица линейного преобразования φ . Найти матрицу A^* сопряженного преобразования φ^* в том же базисе

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

По формуле

$$A^* = G^{-1} A^T G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \\ -3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 4 \\ 0 & -8 & 7 \\ -7 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

1571 Для ортогонального преобразования φ , заданного в ортонормированном базисе матрицей A , найти ортонормированный базис, в котором матрица B этого преобразования имеет канонический вид. Найти канонический вид. (Искомый базис определен неоднозначно.)

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Найдём собственные значения

$$\begin{vmatrix} \frac{2}{3} - \lambda & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} - \lambda & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 = -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = -(\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$$

Канонический вид

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Примечание. Канонический вид - это блочно-диагональный вид матрицы, блоки могут быть двух видов: 1 на 1 со значением 1 или -1, 2 на 2 следующего вида

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi_i & -\sin\varphi_i \\ \sin\varphi_i & \cos\varphi_i \end{pmatrix}$$

Если бы собственные значения были $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\lambda_3 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, то канонический вид ($\varphi = \frac{\pi}{3}$):

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

1586 Найти ортонормированный базис собственных векторов и матрицу B в этом базисе для линейного преобразования, заданного в некотором ортонормированном базисе матрицей A (искомый базис определен не однозначно).

$$A = \begin{pmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{pmatrix}$$

Эта задача на процесс ортогонализации Грама-Шмидта, но для начала найдём собственные значения и векторы.

$$\begin{vmatrix} 17-\lambda & -8 & 4 \\ -8 & 17-\lambda & -4 \\ 4 & -4 & 11-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 45\lambda^2 - 567\lambda + 2187 = -(\lambda - 27)(\lambda^2 - 18\lambda + 81) = -(\lambda - 27)(\lambda - 9)^2$$

1. $\lambda = 9$

$$(A - 9E) = \begin{pmatrix} 8 & -8 & 4 \\ -8 & 8 & -4 \\ 4 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ФСР: $v_1 = (1, 1, 0)^T$, $v_2 = (-1, 0, 2)^T$

Начнём процесс ортогонализации.

$$v'_2 = v_2 + \alpha v_1$$

$$0 = (v'_2, v_1) = (v_2 + \alpha v_1, v_1) = (v_2, v_1) + \alpha(v_1, v_1) = -1 + 2\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

$$v'_2 = v_2 + \frac{1}{2}v_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2\right)^T$$

v_1, v'_2 - ортогональные собственные векторы для собственного значения 9.

$$\text{Нормируем их: } \overline{v_1} = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T, \quad \overline{v_2} = \frac{v'_2}{\|v'_2\|} = \left(-\frac{1}{3\sqrt{2}}, \frac{1}{3\sqrt{2}}, \frac{4}{3\sqrt{2}}\right)^T$$

1. $\lambda = 27$

$$(A - 27E) = \begin{pmatrix} -10 & -8 & 4 \\ -8 & -10 & -4 \\ 4 & -4 & -16 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 18 \\ 0 & 9 & 18 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ФСР: $v_3 = (2, -2, 1)^T$

$$\text{Нормируем вектор: } \overline{v_3} = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)^T$$

$$B = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}, \text{ где } C = (\overline{v_1}, \overline{v_2}, \overline{v_3})$$

1598 Следующую матрицу представить в виде произведения симметрической матрицы с положительными характеристическими числами на ортогональную матрицу.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Речь идёт о полярном разложении. Оно получается из сигнулярного разложения

$$A = V\Sigma U^T = V\Sigma(V^T V)U^T = (V\Sigma V^T)(VU^T) = SO$$

Для начала найдём сингулярное разложение.

1. $A^T A$ приводим к диагональному виду в ОНБ

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{8}, \sigma_2 = \sqrt{2}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

2. Найдём матрицу U

$e_1 = (1, 0)^T$, $e_2 = (0, 1)^T$ - ОНБ базис, тогда

$$U = (e_1, e_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Найдём матрицу V

$$f_1 = \frac{1}{\sigma_1} A e_1 = \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f_2 = \frac{1}{\sigma_2} A e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V = (f_1, f_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

4. Получили SVD разложение

$$A = V\Sigma U^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Найдём матрицы полярного разложения

$$S = V\Sigma V^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$O = VU^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Получили полярное разложение

$$A = SO = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

1600 Следующую матрицу представить в виде произведения симметрической матрицы с положительными характеристическими числами на ортогональную матрицу.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 4 & 4 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Задача, аналогичная предыдущей, только побольше размеры.