

Galois 理论

Ihaku

本作品采用 [Creative Commons](#) “署名-非商业性使用-相同方式
共享 4.0 国际”许可协议进行许可。



前言

此版本为 v2.71. 较上一版本改进了附录 B.2 和 B.3, 有大幅删改; 增加了附录 B.4 和第一章的内容, 其中 1.3 未竟; 增加了两本参考文献; 删去了第零章各节的尾言; 增加了裴蜀定理; Creative Commons 标识改为中文; 增加了前言; 另有部分小改动.

下次讨论班前将暂不更新. 此外, v2.7 版本的 L^AT_EX 可编辑源码放在 Overleaf 上, 仍未更新: <https://www.overleaf.com/1866727589qtwjzvzsrmqm>

有对本讲义内容或 T_EX 源码有疑问的同学可以私信我, 我的微信 ID: Ihaku5.

有关本讲义的说明:

本讲义例子较为稀少, 多数定理未给出 (严格) 证明, 其中人名定理都已标注, 请自行参考文献和互联网资源. [1] [2] [3] [4] [5]

除参考文献外, 本讲义主要参考维基百科, 采用的记号和翻译也以主流为准, 同时在有歧义时给出注解. 多数记号命名思路可参考索引中的中英对照, 同时记号尽简洁而避繁杂, 便于记忆, 采取全文通用的形式, 非首次出现则不再解释.

同时本讲义具备了目录, 索引, 参考文献, 网址超链接. 对于文中的交叉引用也附有超链接, 但考虑到线性阅读的流畅性, 尽量减少交叉引用的使用, 而是通过调整结构顺序来避免这一麻烦.

本讲义附录 A 为语音学相关知识, 和伽罗瓦理论无关, 仅供感兴趣的读者阅读. 由于本人对法语一窍不通, 如有纰漏, 敬请指正.

书山有路勤为径, 学海无涯苦作舟.

Ihaku

2022/1/30

目录

前言	iii
目录	v
第零章 预备知识	1
0.1 群	1
0.2 环和域	5
第一章 伽罗瓦理论	9
1.1 域扩张	9
1.2 正规扩张与可分扩张	10
1.3 伽罗瓦对应	11
附录 A 法语发音初步	13
A.1 法语与英语	13
A.2 法语的发音特点	14
A.3 法国数学家人名例	16
附录 B 要点知识	17
B.1 对称群	17
B.2 群列	19
B.3 可解群	22
B.4 多项式补遗	23
索引	25
参考文献	27

第零章 预备知识

0.1 群

定义 0.1 集合 S 和 S 上满足结合律的二元运算 \cdot 所形成的代数结构叫做**半群**. 这个半群记成 (S, \cdot) 或者简记成 S , 运算 $x \cdot y$ 也尝尝简写成 xy . 与任何元素相乘等于自身的称为**幺元**, 若含有幺元则称为**幺半群**, 幺元通常记作 e 或 1 . 若满足交换律则称为**交换半群**.

例 0.2 $(\mathbb{Z}, -)$ 不满足结合律, 故不是半群.

对于交换幺半群, 惯例是将其二元运算 \cdot 写成加法 $+$, 并将幺元 1 写成 0 , 元素 x 的逆写成 $-x$; 但一些场合仍适用乘法记号. 必要时另外申明.

定义 0.3 与任何元素相乘等于幺元的称为**逆元**, 若含幺半群 (G, \cdot) 中每一个元素都存在逆元, 则 G 叫做**群**. 若满足交换律则称为**交换群**或**阿贝尔群**.

简言之, 群内的元素满足封闭性, 结合律, 含幺元, 含逆元四个性质. 其中逆元往往难以满足, 结合律通常难以验证. 向量空间的前四条性质即是群的定义.

例 0.4 一个拓扑 (τ, \cup) 是一个幺半群, 而拓扑 (τ, Δ) 是一个群. 单位元都为 \emptyset , 后者逆元为自身, 亦即 $\forall A \in \tau, A^2 = \emptyset$, 该群每一个非单位元的阶都为 2 . 此为群中的拓扑, 反之, 拓扑中亦有群, 称为**拓扑群**.

定义 0.5 设 G 为群, 子集 $H \subset G$ 被称为 G 的**子群**, 如果

- (i) H 是子幺半群,
- (ii) 对任意 $x \in H$ 有 $x^{-1} \in H$.

表示成 $H \leq G$. 假若子群 H 对所有 $x \in G$ 满足 $xH = Hx$, 则称 H 为 G 的**正规子群**, 记作 $H \triangleleft G$. 子群 $\{1\} \triangleleft G$ 称作 G 的**平凡子群**.

定义 0.6 (i) 一个群的**阶**是指其势, 即其元素的个数, 记为 $|G|$;

- (ii) 一个群内的一个元素 a 之**阶** (有时称为**周期**) 是指会使得 $a^m = e$ 的最小正整数 m . 若没有此数存在, 则称 a 有无限阶. 有限群的所有元素有有限阶, 记为 $\text{ord } a$.

例 0.7 包含 x 的最小群叫做由 x **生成**的群, 记作 $\langle x \rangle$. 若群 G 中存在元素 x 使得 $G = \langle x \rangle$, 则称 G 为**循环群**. 循环群又叫单位生成群, 且都同构于 \mathbb{Z} 的子群.

例 0.8 从任意集合 X 映到自身的全体双射构成一个群, 称为 X 上的**对称群** $\mathfrak{S}_X := \text{Aut}(X)$. 其中的二元运算是双射的合成 $(f, g) \mapsto f \circ g$, 幺元为恒等映射 $\text{id}_X : X \rightarrow X$, 而逆元无非是逆映射. 当 $X = \{1, \dots, n\}$ ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$) 时也称为 n 次**对称群**, 记为 $\mathfrak{S}_n^{\text{i}}$, 它的每个子群称作**置换群**. 注意到 $|\mathfrak{S}_n| = n!$. 其所有偶置换元素组成的子群称为**交错群**, 记作 $\mathfrak{A}_n^{\text{ii}}$, 且 $\mathfrak{A}_n \triangleleft \mathfrak{S}_n$.

定义 0.9 设 H 为群 G 的子群. 定义:

- (i) **左陪集**: G 中形如 xH 的子集, 全体左陪集构成的集合记作 G/H ;
- (ii) **右陪集**: G 中形如 Hx 的子集, 全体右陪集构成的集合记作 $H \backslash G$;
- (iii) **双陪集**: 设 K 为另一子群, 则 G 中形如 $HxK := \{h x k : h \in H, k \in K\}$ 的子集称为 G 对 (H, K) 的**双陪集**, 全体双陪集构成的集合记作 $H \backslash G / K$.

陪集中的元素称为该陪集的一个代表元. $H \triangleleft G$ 等价于左, 右陪集相同. 由于陪集的左右之分总能从符号辨明, 以下不再申明. 定义 H 在 G 中的**指数**

$$[G : H] := |G/H|.$$

陪集空间 G/H 未必有限, 在此视 $[G : H]$ 为基数.

定理 0.10 (Lagrange 定理) 设 H 为群 G 的子群, 则

- (i) $|G| = [G : H]|H|$, 特别地, 当 G 有限时 $|H|$ 必整除 $|G|$;
- (ii) 若 K 是 H 的子群, 则 $[G : K] = [G : H][H : K]$.

推论 0.11 群 G 中任意元素 g 的阶整除 G 的阶, 即 $\text{ord } g \mid |G|$. 由此直接得费马小定理.

拉格朗日定理的逆命题并不成立. 给定一个有限群 G 和一个整除 G 的阶的整数 d , G 并不一定有阶数为 d 的子群. 最简单的例子是 4 次交替群 \mathfrak{A}_4 , 它的阶是 12, 但对于 12 的因数 6, \mathfrak{A}_4 没有 6 阶的子群. 对于这样的子群的存在性, Cauchy 定理和 Sylow 定理给出了一个部分的回答.

定义 0.12 设 G 为群.

- (i) G 的**中心**定义为 $Z_G := \{z \in G : \forall x \in G, xz = zx\}$ ⁱⁱⁱ;
- (ii) 设 $E \subset G$ 为任意子集, 定义其**中心化子**为 $Z_G(E) := \{z \in G : \forall x \in E, xz = zx\}$ ^{iv};
- (iii) 承上, 定义其**正规化子**为 $N_G(E) := \{n \in G : nEn^{-1} = E\}$ ^v.

当 E 是独点集 $\{x\}$ 时, 使用简写 $Z_G(x)$ 和 $N_G(x)$.

显然有

$$Z_G = Z_G(G) \leq Z_G(E) \leq N_G(E) \leq G.$$

阿贝尔群等价于中心是自身的群. $H \triangleleft G$ 等价于 $N_G(H) = G$.

ⁱ 德文尖角体 S, 对应德文 Symmetrische Gruppe 或英文的首字母 S.

ⁱⁱ 德文尖角体 A, 对应德文 Alternierende Gruppe 或英文的首字母 A.

ⁱⁱⁱ 因其德文 Zentrum(注意德文中名词首字母应大写), 首字母为 Z, 也有部分书采用英文 center 的首字母 C 表示.

^{iv} 因其德文 Zentralisator, 首字母为 Z, 也有部分书采用英文 centralizer 的首字母 C 表示.

^v 因其德文 Normalisator 和英文 normalizer, 首字母为 N.

注记 0.13 若 $N, H \leq G$, 而且 $H \subset N_G(N)$, 则 $HN = NH$ 是 G 的子群且 $N \triangleleft HN$.

定义 0.14 设 M_1, M_2 为么半群. 映射 $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ 如满足下述性质即称为同态

- (i) $\forall x, y \in M_1, \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$;
- (ii) $\varphi(1) = 1$.

从 M_1 到 M_2 的同态所成集合写作 $\text{Hom}(M_1, M_2)$. 设 $\varphi \in \text{Hom}(M_1, M_2)$. 它的像记作 $\text{Im}(\varphi) := \{\varphi(x) : x \in M_1\}$, 而其核定义为 $\text{Ker}(\varphi) := \varphi^{-1}(1)$. 若 M_1, M_2 是群, 则他们分别是 M_1, M_2 的正规子群.

从么半群 M 映至自身的同态称为自同态, 自同态全体对加法和复合构成一个环, 叫做自同态环, 记作 $\text{End}(M) := \text{Hom}(M, M)$. 同态的合成仍为同态. 取常值 1 的同态称作平凡同态.

若存在同态 $\psi : M_2 \rightarrow M_1$ 使得 $\varphi\psi = \text{id}_{M_2}$, $\psi\varphi = \text{id}_{M_1}$, 则称 φ 可逆而 ψ 是 φ 的逆; 可逆同态称作同构, 记作 $M_1 \cong M_2$. 此时我们也称 M_1 与 M_2 同构. 从么半群映至自身的同构称为自同构, 自同构全体构成一个群, 叫做自同构群, 它是 $\text{End}(M)$ 的单位群 (见 0.31), 记作 $\text{Aut}(M) := U(\text{End}(M))$, 如恒等映射 $\text{id}_M \in \text{Aut}(M)$.

定义 0.15 设 G 为群, N 为其正规子群. 在陪集空间 G/N 上定义二元运算

$$xN \cdot yN = xyN, \quad x, y \in G.$$

这使得 G/N 构成一个群, 称为 G 模 N 的商群, 其中的么元是 $1 \cdot N$ 而逆由 $(xN)^{-1} = x^{-1}N$ 给出. 群同态

$$\pi : G \rightarrow G/N^{\text{vi}}, \quad x \mapsto xN$$

称为商同态.

定义 0.16 设么半群 M 作用于 X . 定义

- (i) 不动点集 $X^M := \{x \in X : \forall m \in M, mx = x\}$;
- (ii) 对于 $x \in X$, 轨道 $Mx := \{mx : m \in M\}$, 其元素称为该轨道的代表元, 轨道 Mx 是 X 的 M -子集;
- (iii) 承上, 其稳定化子定为 M 的子么半群 $M_x := \{m \in M : mx = x\}$.

定理 0.17 (轨道分解定理) 设群 G 作用于 X , 则

- (i) 有轨道分解 $X = \bigsqcup_x Gx$, 其中我们对每个轨道选定代表元 x ;
- (ii) 对每个 $x \in X$, 映射

$$G/G_x \rightarrow Gx, \quad g \cdot G_x \mapsto gx$$

是 G -集间的同构;

- (iii) 特别地, 我们有基数的等式

$$|X| = \sum_x [G : G_x];$$

^{vi}一般用 \hookrightarrow 表示单射, 用 \twoheadrightarrow 表示满射. 可类比 \subset, \supset 记忆.

(iv) 对所有 $x \in X$ 和 $g \in G$, 有

$$G_{gx} = gG_xg^{-1}.$$

定义 0.18 依旧设 G 为群. 伴随自同构 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ 给出的作用称为 G 的共轭作用 $G \times G \rightarrow G$ (在此考虑左作用). 定义展开后无非是

$$(g, x) \mapsto {}^gx := gxg^{-1}.$$

共轭作用下的轨道称为 G 中的共轭类.

推而广之, 对任意子集 $E \subset G$ 我们业已定义子群 $N_G(E)$, 它在 E 上的作用也叫共轭. 若两子集 E, E' 满足 $\exists g \in G, E' = gEg^{-1}$, 则称 E 与 E' 共轭. 易知正规子群仅与自身共轭.

非交换群共轭作用的性状一般相当复杂. 对于 $x \in G$, 其稳定化子群正是中心化子 $Z_G(x)$, 而不动点集则是中心 Z_G . 剖析 G 的共轭作用是了解其群结构的必由之路.

定理 0.19 (同态基本定理) 设 $\varphi \in \text{Hom}(G, G')$, 则 φ 诱导出同构

$$\bar{\varphi} : G / \text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi), \quad g \cdot \text{Ker}(\varphi) \mapsto \varphi(g).$$

此同构叫做正则同构.

定理 0.20 (Caylay 定理) 对任意有限群 G , 同态

$$\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_G, \quad \rho(g)a = ga$$

是单的, 故 $\text{Ker}(\rho) = \{1\}$, 利用同态基本定理得: 每个群均同构于某个对称群的子群.

定理 0.21 (Cauchy 定理) 设 G 为有限群, 素数 p 整除 $|G|$, 则存在 $x \in G$ 使得 $\text{ord } x = p$.

定义 0.22 设 G 为 n 阶有限群, p 为素数. 设 $p^m \mid n$, 满足 $|H| = p^m$ 的子群 H 称为 G 的 Sylow p -子群.

定理 0.23 (Sylow 定理) 对任意有限群 G 和任意素数 p ,

- (i) G 含有 Sylow p -子群.
- (ii) (a) 任意 p -子群 $H \subset G$ 皆包含于某个 Sylow p -子群;
(b) G 的任两个 Sylow p -子群 P, P' 皆共轭;
特别地, G 中存在正规的 Sylow p -子群当且仅当 G 有唯一的 Sylow p -子群.
- (iii) G 中 Sylow p -子群的个数 $\equiv 1 \pmod{p}$.

定理 0.24 (有限生成阿贝尔群结构定理) 有限生成阿贝尔群都同构于若干 \mathbb{Z} 子群的直和.

0.2 环和域

定义 0.25 称 $(R, +, \cdot)$ 是 (含么) 环, 如果

- (i) $(R, +)$ 是阿贝尔群, 二元运算用加法符号记作 $(a, b) \mapsto a + b$, 加法么元记为 0, 称之为 R 的加法群;
- (ii) (R, \cdot) 是含么半群;
- (iii) $a(b + c) = ab + ac, (b + c)a = ba + ca$ (分配律, 或曰双线性)

除去和么元相关性质得到的 $(R, +, \cdot)$ 称作无么环. 若子集 $S \subset R$ 对 $(+, \cdot)$ 也构成环, 并且和 R 共用同样的乘法么元 1, 则称 S 为 R 的子环, 或称 R 是 S 的环扩张或扩环. 若乘法也满足交换律则称为交换环.

例 0.26 一般将有限个元素 $r_1, \dots, r_n \in R$ 生成的环记为 $\langle r_1, \dots, r_n \rangle$. 在交换环的情形也习惯写作 (r_1, \dots, r_n) . 零环 (0) 是无么环, 也是平凡环.

定义 0.27 设 R, S 为环, 映射 $\varphi: R \rightarrow S$ 为环同态, 如果 φ 是加法群同态, 且为乘法么半群同态. 如去掉与 $1_R, 1_S$ 相关的条件, 就得到无么环之间的同态概念.

由此可导出环的同构 (即可逆同态), 自同态, 自同构, 像与核等概念, 与 0.14 同一套路, 不再赘述.

定义 0.28 设 R 为环, $I \subset R$ 为加法子群.

- (i) 若对每个 $r \in R$ 皆有 $rI \subset I$, 则称 I 为 R 的左理想;
- (ii) 若对每个 $r \in R$ 皆有 $Ir \subset I$, 则称 I 为 R 的右理想;
- (iii) 若 I 兼为左, 右理想, 则称作双边理想.

满足 $I \neq R$ 的左, 右或双边理想称为真理想. 交换环的左, 右理想不分, 与双边理想一起简称为理想.

定义 0.29 设 I 为 R 的理想, 赋予加法群 R/I 乘法运算如下

$$(r + I) \cdot (s + I) := (rs + I), \quad r, s \in R.$$

则 R/I 构成一个环, 称为 R 模 I 的商环. 商映射 $R \rightarrow R/I$ 称为商同态.

定理 0.30 (环同态基本定理) 设 $\varphi \in \text{Hom}(R, R')$, 则 $\text{Ker}(\varphi) := \varphi^{-1}(0)$ 是 R 的理想, 且诱导同态 $\bar{\varphi}: R/\text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi)$ 是环同构.

定义 0.31 既然 R 对乘法构成么半群, 故可定义其中元素的左逆与右逆. 设 $r \in R$ 非零, 若 r 可逆, 其逆记为 r^{-1} ; 全体可逆元构成的乘法群称作单位, 记作 $U(R)$, 有时也简记 R^\times . 若存在 $r' \neq 0$ 使得 $rr' = 0$ 则称 r 为左零因子; 条件改作 $r'r = 0$ 则称右零因子. 为 R 中左或右零因子的元素统称为零因子. 元素 $r \in R - \{0\}$ 非左零因子当且仅当 r 的左乘满足消去律; 右零因子的情形类似.

定义 0.32 设 R 非零环, 定义其特征为加法群元素的最大阶, 记为 $\text{char}(R)$. 若含有无限阶元素则特征记为 0.

例 0.33 对于特征 p 域 K , 利用二项式定理和数论中的有关结论可知 $\forall x, y \in K$,

$$(x + y)^p = x^p + y^p.$$

定义 0.34 无零因子的交换环称为**整环**. 若环 R 中的每个非零元皆可逆, 则称 R 为**除环**. 交换除环称为**域**^{vii}. 可类似定义子除环和子域.

例 0.35 按本节的约定, 除环不能是零环, 四元数 \mathbb{H} 是除环; 某些文献将除环称作**斜域** (skew field) 或**体**, 但因体在不同地区有歧义, 所以尽量避免使用体这一说法.

命题 0.36 无零因子的有限环必为除环.

定理 0.37 (Wedderburn 小定理) 对于有限环, 整环等价于除环等价于域.

定义 0.38 设 R 为交换环. 子集 $S \subset R$ 若对环的乘法构成么半群, 则称 S 为 R 的**乘性子集**. 构造对乘性子集 S 的**局部化** $R[S^{-1}]$ 如下. 首先在集合 $R \times S$ 上定义关系

$$(r, s) \sim (r', s') \Leftrightarrow [\exists t \in S, trs' = tr's].$$

易证 \sim 是等价关系, 相应的商集记为 $R[S^{-1}]$, 其中的等价类 $[r, s]$ 应该设想为“商” r/s , 且对任意 $t \in S$ 皆有 $[r, s] = [rt, st]$. 以下定义的环运算因而是顺理成章的:

$$[r, s] + [r', s'] = [rs' + r's, ss'],$$

$$[r, s] \cdot [r', s'] = [rr', ss'].$$

$R[S^{-1}]$ 对此成交换环, 零元为 $0 = [0, s]$ 而么元为 $1 = [s, s]$, 其中 $s \in S$ 可任取. 由此得到

$$[r, s] = 0 \Leftrightarrow [\exists t \in S, tr = 0].$$

因此 $R[S^{-1}]$ 是零环当且仅当存在 $s \in S$ 使得 $sR = 0$, 我们既假定 R 含么元, 这也相当于说 $0 \in S$; 一般总排除这种情形.

另一方面, $r \mapsto [r, 1]$ 给出环同态 $R \rightarrow R[S^{-1}]$. 注意到 $s \in S$ 的像落在 $R[S^{-1}]^\times$ 中, 其逆无非是 $[1, s]$. 局部化应当同态射 $R \rightarrow R[S^{-1}]$ 一并考量.

引理 0.39 设 $S \subset R$ 为乘性子集, $0 \notin S$, 则 $[r, s] \in R[S^{-1}]$ 可逆当且仅当存在 $r_1 \in R$ 使得 $rr_1 \in S$.

证明 若 $rr_1 \in S$ 则 $[r, s][r_1s, rr_1] = 1$. 反之设存在 $[r', s']$ 使得 $[r, s][r', s'] = 1$, 则存在 $t \in S$ 使得 $trr' = tss'$, 因而 $r(tr') \in S$.

^{vii}1871 年德国数学家戴德金提出 Körper 的概念, 因此也有书中用 K 指代域而非 F . 在德语里该词意为“体”, 故日本和港澳台地区从德文直译为汉字“体”, 与大陆有所不同. 1893 年由美国数学家摩尔将 Körper 翻译为 field, 而大陆所采用的翻译由英语转译为域.

原环 R 的部分信息可能在局部化过程中丢失. 可知

$$\text{Ker}[R \rightarrow R[S^{-1}]] = \{r \in R : \exists s \in R, sr = 0\}.$$

我们希望取尽可能大的 S 使得 $R[S^{-1}]$ 是 R 的扩环. 前述讨论自然引向以下结果.

引理 0.40 设 $S \subset R$ 为乘性子集, $0 \notin S$. 则局部化态射 $R \rightarrow R[S^{-1}]$ 是单射当且仅当 S 不含零因子. 另一方面, $R - \{0\}$ 中的所有非零因子构成 R 的乘性子集, 相应的局部化记为

$$R \hookrightarrow \text{Frac}(R),$$

而 $\text{Frac}(R)$ 称为 R 的**全分式环**.

当 R 是整环时, $\text{Frac}(R)$ 无非是对 $S := R - \{0\}$ 的局部化; 此时由引理 0.39 知 $\text{Frac}(R)$ 是域: 事实上 $r \neq 0$ 时 $[r, s]^{-1} = [s, r]$; 称此为 R 的**分式域**或**商域**.

局部化是交换代数中的常见操作, 它把环里一些元素变得可逆, 是分式域概念的推广. 在代数几何的观点下, 局部化所得的环是原来的环的某些“局部”, 其谱自然地是原来环的谱的子集. 既然如此, 局部化的环通常会变得更简单. 我们也常常通过研究环的各个局部化来研究环本身.

定义 0.41 含么交换环 R 的真理想 I 称为

- (i) **素理想**, 如果 $xy \in I$ 蕴涵 $x \in I$ 或 $y \in I$; ^{viii}
- (ii) **极大理想**, 如果 $I \neq R$ 且不存在严格包含 I 的理想.

分别记 R 中素理想和极大理想所成的集合为 $\text{Spec } R$ 与 $\text{MaxSpec } R$, 称为 R 的**素谱**和**极大理想谱**.

命题 0.42 设 I 为含么交换环 R 的真理想, 则

- (i) R/I 为整环当且仅当 I 为素理想;
- (ii) R/I 为域当且仅当 I 为极大理想.

推论 0.43 极大理想必为素理想. 其逆一般不成立, 因为整环未必是域.

定义 0.44 设 I 为 R 的理想, 若存在 $a \in R$ 使得 $I = \langle a \rangle = Ra$, 则称 I 为**主理想**. 若整环 R 的所有理想皆为主理想, 则称 R 为**主理想整环**.

定理 0.45 (中国剩余定理) 设 R 为环, I_1, \dots, I_n 为一族理想. 假设对每个 $i \neq j$ 皆有 $I_i + I_j = R$, 则环同态

$$\varphi: R \rightarrow \prod_{i=1}^n R/I_i, \quad r \mapsto (r \bmod I_i)_{i=1}^n$$

诱导出环同构 $R/(\bigcap_{i=1}^n I_i) \cong \prod_{i=1}^n R/I_i$.

^{viii} 有些书对于一般环的素理想定义为: 对于 R 的理想 I , 如果任意两个理想 A, B 满足 $AB \subset I$, 则 $A \subset I$ 或者 $B \subset I$. 当环是含么交换环时这两种定义是等价的.

定义 0.46 整环 R 中的非零元 r 称为不可约元, 如果 $r \notin R^\times$ 而且在 R 中 $d \mid r$ 蕴涵 $\langle d \rangle = \langle r \rangle$ 或 $d \in R^\times$. 不可约性仅取决于 r 在 \mathcal{P} 中的像. 令 $\mathcal{P} := (R - \{0\})/R^\times$, 以 $\dot{x} \in \mathcal{P}$ 标记 $x \in R - \{0\}$ 的像如果 \mathcal{P} 的每个元素 \dot{r} 都能写成

$$\dot{r} = \prod_{i=1}^n \dot{p}_i, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

其中 $\dot{p}_i \in \mathcal{P}$ 不可约, 而且 $\{\dot{p}_1, \dots, \dot{p}_n\}$ (计重数但不计顺序) 是唯一的, 则称 R 为**唯一分解整环**; 称 $\dot{p}_1, \dots, \dot{p}_n$ (或其原像 $p_1, \dots, p_n \in R$) 是 \dot{r} (或其原像 $r \in R$) 的不可约因子. 约定 $n = 0 \iff \dot{r} = 1$. 如果整环 R 中的非零元 p 满足 $p \notin R^\times$ 而且 $p \mid ab \iff (p \mid a) \vee (p \mid b)$, 则称 p 是**素元**.

有以下结论:

- (i) p 是素元 $\iff \langle p \rangle$ 是素理想;
- (ii) 素元是不可约元, 当环是 UFD 时反之也成立;
- (iii) 整环 R 是 UFD 当且仅当主理想满足升链条件且不可约元皆为素元, 前者保证不可约分解存在, 后者保证此分解唯一.
- (iv) UFD 中任意两个元素 a, b 都具有最大公因子 (a, b) 和最小公倍元 $[a, b]$.

定义 0.47 设 R 为整环, 若存在良序集 L 和函数 $N : R - \{0\} \rightarrow L$, 使得对任意 $x \in R$, $d \in R - \{0\}$ 都存在 $q \in R$ 使 $r := x - qd$ 满足

$$r = 0 \quad \text{或者} \quad r \neq 0 \text{ 且 } N(r) < N(d).$$

满足此条件的 R 称作**欧几里得整环**.

命题 0.48 ED^{ix} 是 PID, PID 是 UFD.

判定一个环是否为 PID 并不容易. ED 推广了 \mathbb{Z} 中的带余除法, 从而使判断 PID 变为判断 ED, 但并非时时好用, 即存在非 ED 的 PID, 也存在非 PID 的 UFD.

定理 0.49 (裴蜀定理) 对于 PID 中的任意元素 a, b , 存在 x, y , 使得以下等式成立:

$$ax + by = (a, b).$$

^{ix}此 ED 非彼 ED.

第一章 伽罗瓦理论

1.1 域扩张

定义 1.1 设 K 和 E 均为域, 如果存在域同态 $\iota: K \hookrightarrow E$, 则称 (E, ι) 为 K 的域扩张, 其中 K 是域扩张的基域, E 为 K 的扩域, 并记为 E/K . 若存在 $S \subset E$, 使得 $F(S) = E$, 则称 E 是由 S 在 K 上生成的域. 若 S 为有限集, 则称该扩张为有限生成扩张; 若 $S = \{x\}$, 则称该扩张为单扩张, x 称为本原元.

定义 1.2 每个域扩张中, 扩域 E 可以看作是以基域 K 为系数域的向量空间, 称扩张 E/K 的次数为 $[E : K] = \dim_K E$. 次数为 1 的扩张称为平凡扩张, 此时 E 与 F 同构; 次数为 2 的扩张称为二次扩张, 可以证明二次扩张必形如 $E = K(\sqrt{d})$, 从而是单扩张; 次数有限的扩张称为有限扩张, 否则称为无限扩张, 取向量空间的一组基可知有限扩张必为有限生成扩张.

定理 1.3 若存在域扩张 E/F 和 F/K , 则称 F 为中间域, F/K 是 E/F 的子扩张. 此时满足如下关系式:

$$[E : K] = [E : F][F : K].$$

定理 1.4 (本原元定理) 一个有限扩张 E/K 是单扩张, 即存在本原元 $x \in E$, $E = F(x)$, 当且仅当 E 和 F 之间有有限个中间域.

定义 1.5 对于域扩张 E/K , 如果 $a \in E$ 是 K 上非零多项式的根, 则称 a 在 K 上代数, 否则称 a 在 K 上超越. 若 E 中所有元素均在 K 上代数, 则 E/K 称为代数扩张, 否则称为超越扩张.

定义 1.6 若 a 在 K 上代数, 则存在唯一一个次数最小的首一多项式, 称为 a 在 K 上的极小多项式 m_a , 则有同态映射 $\pi: K[a] \rightarrow K(a)$, 且 $\text{Ker}(\pi) = (m_a)$, 故由同态基本定理知

$$K[a]/(m_a) \cong K(a).$$

由此可见以 $\{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ 为基的 K -线性空间即为 $K(a)$, 故 $[K(a) : K] = \deg m_a$. 故代数扩张为有限扩张, 反之, $\{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}, a^n\}$ 必线性相关, 故存在 a 的化零多项式, 故有限扩张也为代数扩张. 因此有限扩张无非是有限生成的代数扩张.

定义 1.7 域 K 称为代数闭域, 若 a 在 K 上代数蕴含 $a \in K$. 域扩张 \bar{K}/K 若满足 E 为代数闭域, 且 E/K 为代数扩张, 则称之为 K 的代数闭包, 并记 E 为 \bar{K} .

定理 1.8 (代数基本定理) \mathbb{C} 是代数闭包.

1.2 正规扩张与可分扩张

定义 1.9 设 E/K 为域扩张, 称多项式 $p \in K[x]$ 在 E 上分裂, 若其在 $E[x]$ 可分解为一次因子的积. 设 \mathcal{P} 为 $K[x]$ 中一族非常数多项式. 若域扩张 E/K 满足于

- (i) 每个 $p \in \mathcal{P}$ 皆在 E 上分裂;
- (ii) 诸根 $R := \{\alpha_{p,j} : p \in \mathcal{P}, 1 \leq j \leq \deg p\}$ 在 K 上生成 E , 即 $E = K(R)$.

则称 E/K 为多项式族 \mathcal{P} 的分裂域.

命题 1.10 设 $p \in K[x], \deg p \geq 1$, 则 p 在 K 上的分裂域 E/K 存在且唯一, 且 $[E : K] \leq (\deg p)!$.

定义 1.11 对于代数扩张 E/K , 以下性质等价:

- (i) 任一不可约多项式 $p \in K[x]$ 若在 E 中有根, 则它在 E 上分裂;
- (ii) 取定代数闭包 \bar{K}/E 并视 E 为 \bar{K} 的子域, 则任意 $\iota \in \text{Hom}_K(E, \bar{K})$ 皆满足 $\iota(E) = E$.
- (iii) 存在一族非常数多项式 \mathcal{P} 使得 E/K 是 \mathcal{P} 的分裂域.

满足以上任一条的代数扩张称为正规扩张.

定义 1.12 设 E/K 为代数扩张, \bar{K}/E 为选定的代数闭包. 定义 E/K 的正规闭包 M/K 为 $\bar{K}|K$ 中所有含 E/K 的正规子扩张之交. 即

$$M = \bigcap_{\substack{E \leq N \leq \bar{K} \\ N/K \text{ 正规}}} N.$$

由定义知这是包含 E 的 F 之最小正规扩张.

例 1.13 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的正规闭包是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, 其中 ω 是三次单位根.

定义 1.14 称非常数多项式 $p \in K[x]$ 为可分多项式, 若其无重根. 对于代数扩张 E/K , 若元素 $a \in E$ 在 K 上的最小多项式为可分多项式, 则称 a 在 K 上可分. 记 E 中所有可分元素为 E_s , 此为 E/K 的中间域, 则称 $[E : K]_s := [E_s : K]$ 为可分次数, 若 E/K 为有限扩张, 则称 $[E : K]_i := [E : K]/[E_s : K]$ 为不可分次数. 如果 E 中每个元素都在 K 中可分, 即不可分次数为 1, 则称 E/K 为可分扩张.

定义 1.15 对于代数扩张 \bar{K}/K , \bar{K} 中的所有可分元素构成中间域 K^{sep} , 称为可分闭包.

推论 1.16 由定理 1.4, 有限可分扩张必是单扩张.

定义 1.17 若域 F 的所有代数扩张都是可分扩张, 也即 $F[x]$ 中的每个不可约多项式都是可分多项式, 则称 F 为完全域.

命题 1.18 特征零域均为完全域; 特征 p 域 K 是完全域当且仅当 $K = K^p := \{a^p | a \in K\}$, 故有限域均为完全域.

定义 1.19 (有限) 可分正规扩张 E/K 称为 (有限) 伽罗瓦扩张.

铺展可分性与正规性的定义, 可知伽罗瓦扩张无非是一族无重根不可约多项式的分裂域. 可分保证扩张不会过大, 正规保证扩张不会过小.

定义 1.20 设 E/F 为域扩张, $(E_i|F)_{i \in I}$ 为其中一族子扩张, 定义其复合 $\bigvee_{i \in I} E_i$ 为 E 中包含所有 E_i 的最小域, 其元素形如有理分式

$$\frac{P(x_{i_1}, \dots, x_{i_n})}{Q(x_{i_1}, \dots, x_{i_n})}, \quad Q(x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) \neq 0,$$

其中 $n \geq 0$, $P, Q \in F[X_1, \dots, X_n]$, $i_1, \dots, i_n \in I$, $x_{i_k} \in E_{i_k}$. 两个扩张的复合也写作 $E_1 E_2$.

命题 1.21 令 \mathcal{E} 分别为有限, 代数, 正规, 可分, Galois, 则

- (i) 对于扩张 $E/F, F/K$, E/K 是 \mathcal{E} 当且仅当 E/F 和 F/K 都是 \mathcal{E} ; (对于正规扩张例外)
- (ii) 扩张 E/K 的任意子扩张 F_1/K 和 F_2/K , 若 F_1/K 为 \mathcal{E} , 则 $F_1 F_2 / F_2$ 也为 \mathcal{E} .
- (iii) 扩张 E/K 的任意一族 \mathcal{E} 子扩张的复合和非空交仍为 \mathcal{E} . (对于有限扩张例外, 需要子扩张族有限)

1.3 伽罗瓦对应

定义 1.22 对于域扩张 E/K , 其伽罗瓦群定为 $\text{Gal}(E/K) := \text{Aut}_K(E)$, 表示保持 K 不动的 E 的自同构群. 习惯用 $\text{Gal}(E/K)$ 的群论性质来描述 E/K , 例如称 E/K 为交换 (或循环, 可解等) 扩张, 如果 $\text{Gal}(E/K)$ 作为群是交换的 (或循环, 可解等).

另一方面, 若 H 为 $\text{Aut}(E)$ 的子群, 则其不动域定为 $\text{Inv}(H) := E^H$. 故而有二个映射

$$\begin{aligned} \text{Gal}(E/\cdot) &: E \text{ 的子域} \rightarrow \text{Aut}(E) \text{ 的子群} & K &\mapsto \text{Gal}(E/K) \\ \text{Inv} &: \text{Aut}(E) \text{ 的子群} \rightarrow E \text{ 的子域} & H &\mapsto \text{Inv}(H) \end{aligned}$$

定理 1.23 若 E/F 为有限扩张, 则 $[E : K] \geq |\text{Gal}(E/K)|$, 且 $[E : K]$

可见伽罗瓦扩张即是满足 $[E : K] = |\text{Gal}(E/K)|$.

附录 A 法语发音初步

Évariste Galois 是法国数学家, 读音在法语中为/evaʁist galwa/(IPA 宽式音标). 和通常的英语的发音区别很大, 容易造成非法语学习者的困扰. 本附录主要参考 [3].

A.1 法语与英语

法语和英语虽都属于印欧语系, 但英语属于日耳曼语族, 法语属于罗曼语族. 日耳曼语族还包括德语, 荷兰语等. 罗曼语族还包括拉丁语西班牙语, 葡萄牙语, 意大利语等. 熟悉其中一两门语言的人可以窥见两种语族的明显区别.




图 A.1: The percentage of modern English words derived from each language group

虽然英语在发展的过程中兼收并蓄了许多罗曼语族语言, 但发音基本上遵循日耳曼语族的特点, 仅在部分词汇中发源语言的读音. 比如 (此处音标为 K.K. 音标):

- avalanche /'ævələ:ns/
- bourgeois / buʒwa:/
- genre /'ʒɑ:rə/
- ballet /bæleɪ:/
- cliché /'kli:ʃeɪ/
- naïve /naɪ'i:v/
- bouquet /bu'keɪ/
- façade /fə'sɑ:d/
- rendezvous /'rɑ:ndivvuz/

还有一些具有明显法语特征的后缀, 请注意这些单词的发音:

(i) eau, 如:	amateur(业余爱好者)	mosque(清真寺)
bureau(办公室)	chauffeur(司机)	unique(独一无二的)
plateau(高原)	grandeur(壮观)	oblique(倾斜的)
tableau(场面)	monsieur(先生)	(viii) gue, 如:
chapeau(帽子)	(v) eon, 如:	fatigue(疲劳)
beau(花花公子)	dungeon(城堡)	vague(模糊的)
nouveau(爆发户)	pigeon(鸽子)	vogue(时尚)
(ii) ette, 如:	surgeon(外科医生)	plague(瘟疫)
cigarette(烟卷)	luncheon(午餐)	colleague(同事)
silhouette(剪影)	(vi) et, 如:	league(联盟)
croquette(油炸丸子)	ballet(芭蕾舞)	(ix) ch, 如:
etiquette(礼仪)	beret(贝雷帽)	mustache(胡子)
(iii) oir 或 oire, 如:	buffet(小卖部)	chef(男厨师长)
memoir(回忆录)	crochet(钩针编织品)	brochure(小册子)
soiree(晚会)	bouquet(花束)	parachute(降落伞)
reservoir(水库)	croquet(棒球游戏)	(x) gn, 如:
repertoire(全部节目)	(vii) que, 如:	assign(分配)
armoire(大橱)	plaque(匾)	campaign(战役)
mouchoir(手帕)	clique(小集团)	foreign(外国的)
(iv) eur, 如:	pique(生气)	design(设计)

可见, 这些单词的发音与通常的英语发音相差许多, 在英语学习时也应多加注意. 其余英语中的法语借词可参照:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_French_origin

A.2 法语的发音特点

世界上的拼音文字可分为不需要音标拼写的直接拼法, 需要音标辅助的间接拼法. 世界上绝大多数表音文字都是属于直接拼法, 即是拼写都非常规则不使用音标就可以直接正确地拼读出单词, 尽管法语的读音规则非常简单, 但法语跟英语一样需要音标辅助拼写单词, 法语属于间接拼法, 当掌握规律后可以不用音标正确拼出单词, 拼写比英语规则, 通常在普通的法语字典里占一页的篇幅, 但是法语单词中不发音的字母特别多, 同一个字母或字母组合可以发不同的音, 不同的字母或字母组合可以发相同的音, 看单词一般可以读出正确的发音, 但不一定能根据单词的发音正确拼写出单词, 人们举例拼写复杂的言语时通常用法语和英语为例.

下面罗列一些法语的发音特点, 以帮助汉语和英语学习者快速掌握法语词汇的发音.

- 法语主要用五个变音符号, 有时候用来表示不同的发音, 有时候只是区别不同的语义:

“^”长音符通常用于区分词形相同的词, 或者表示某个元音字母后面曾经有一个被删去的字母, 如 *êtes* 源于拉丁语单词 *estis* (古法语为 *estes*), 中间的 *s* 已经随着语音流变而消失了;

“˘”分音符可以和多个元音字母组合, 表示这个元音字母不跟前面的元音字母构成一个字母组合, 而分别发音, 类似于双元音;

“˙”尖音符只用在字母“e”之上, 表示这个字母发音为闭口音 [e]. 也可以是某一个音消失的痕迹, 如古法语系词的过去分词为 *esté(t)*, 现代法语为 *été*;

“ˊ”重音符用在字母“e”上表示这个字母发开口音 [ɛ], 而用在其他字母上则用以区分不同的语义, 如 *ou* (“或者”) 和 *où* (“哪里”) 两个单词发音拼写完全一样, 但是不同的词;

“, ”软音符只用于“c”字母下面, 因为法语中和英语中一样, “c”在“a、o、u”前发 [k] 音, 在“e、i”前发 [s] 音, 如果在“a、o”想让它发 [s] 音, 需加软音符, 如在 *français* (“法国人”) 中.

- 单词末尾的辅音字母通常是不发音的, 除非其后跟的有元音字母或同一个辅音字母. 但是, 这些辅音字母在联诵或者连音中可能发音.
- “n”和“m”在元音字母前面发字母音, 而在某些元音字母后面并且后面没有元音字母或者“m”或“n”相连的时候与前面的元音构成鼻化元音.
- 辅音字母“h”在任何时候都不发音, 但在作为单词开头时区分为“哑音”和“嘘音”, 词典上一般在嘘音单词前加上“*”. 哑音和嘘音主要分别为哑音开头的词其读音和写法变化和元音开头的单词一样, 而嘘音开头的单词的变化则和辅音开头的单词一样, 即不能连读, 不能省音等.
- 法语和英语、汉语的不同之处在于法语没有双元音, 发每个元音时口型都不滑动, 尤其要注意发鼻化元音时不能像汉语韵母似的有延续动作. 法语的元音多数圆唇, 因此法国人说话的时候嘴唇好像总是圆着的.
- p,t,k 分别发/p,t,k/, 即不送气音. 注意汉语普通话中 p,t,k 为送气音, 而 b,d,g 为不送气音, 这些都为清音, 汉语普通话中不存在浊音, 而送气音是法语中没有的. 英语在流变中也逐渐失去了浊音, 大多数浊音用不送气清音/p,t,k/代替, 而原本的 p,t,k 与汉语普通话一样发送气清音, IPA 严式音标记作/p^h,t^h,k^h/. 清音和浊音的区别是声带是否振动, 但对汉语言学习者来说浊音发音较为困难, 在不引起混淆的情况下可以用不送气清音代替.
- 法语中辅音 j 发/ʒ/, 即浊腭龈擦音, 类似于汉语拼音中 r 的音. 英语中此音也有被拼写为 ge, 多是来自法语的外来词, 例如 *genre, garage, prestige* 以及 *Baton Rouge*. 英语、德语中, 此音通常被拼写为 zh, 但主要用于外来词. 例如, *Zhukovsky* (茹科夫斯基)、*Brezhnev* (勃列日涅夫) 和 *Zhengzhou* (郑州). *zhoosh* 可能是英语中唯一的含有此音的本族词.
- 前词是 ce/de/je/jusque/le/la/me/ne/que/se/te, 后词是元音或者哑音 h 开头时会出现

省音, 例: ce est=c'est, de aimer=d'aimer, je aime=j'aime, 此外 la, si, jusque, lorsque, presque, puisque 等词也有省音现象.

其余具体发音规则可参照法语正字法的维基百科界面:

https://en.wikipedia.org/wiki/French_orthography

A.3 法国数学家人名例

有了以上的理论知识已经足够回答最初的问题, Galois 中的 Gal 与英语发音相似, 而 oi 发/wa/的音, 末尾辅音 s 不发音, 这也正应和了汉语音译伽 (gā) 罗瓦. 以下再列举一些常见的法国数学家及其译名, 结合上面的规则, 感受它们的发音:

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| • Baire 贝尔 | • Goursat 古尔萨 | • Pascal 帕斯卡 |
| (“拜尔”为错译) | • Hadamard 阿达马 | • Picard 皮卡 |
| • Bézout 贝祖 | • Hermite 厄米特 | • Poincaré 庞加莱 |
| • Binet 比内 | • Jordan 若尔当 | • Poisson 泊松 |
| • Bourbaki 布尔巴基 | • Lagrange 拉格朗日 | • Rolle 罗尔 |
| • Cartan 嘉当 | • Laplace 拉普拉斯 | • Rouché 鲁歇 |
| • Cauchy 柯西 | • Laurent 洛朗 | • Serre 塞尔 |
| • d'Alembert 达朗贝尔 | • Lebesgue 勒贝格 | • Sturm 斯图姆 |
| • Darboux 达布 | • Legendre 勒让德 | • Vandermonde 范德蒙 |
| • de Moivre 棣莫佛 | • l'Hôpital 洛必达 | • Viète 韦达 |
| • Descartes 笛卡尔 | • Liouville 刘维尔 | • Weil 韦伊 |
| • Fatou 法图 | • Mandelbrot 曼德博 | • Wroński 朗斯基 |
| • Fermat 费马 | • Monge 蒙日 | |
| • Fréchet 弗雷歇 | • Parseval 帕塞瓦尔 | |

可见汉语音译始终遵循“名从主人”的原则, 这不光对法语人名来说是这样, 对于其他语言同样如此, 需要认真区分.

在常见的数学家中, 来自非英语国家诸如古希腊, 德国, 苏俄, 印度, 日本的人名或词汇要多加注意, 尽量遵循源语言的读法. 有关数学家人名在各国语言中的发音可参照:

<https://mathpron.github.io>

有关国际音标 (IPA) 的内容请参考:

https://mathpron.github.io/#IPA_Notes

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet

<https://www.bilibili.com/video/BV1QA411i7Yf>

附录 B 要点知识

B.1 对称群

定义 B.1 设 a_1, \dots, a_m 是 X 中相异的元素. 对称群 \mathfrak{S}_X (见 0.8) 中的 m -轮换 $(a_1 \cdots a_m)$ 是下述映射 $\sigma: X \rightarrow X$

$$\begin{aligned}\sigma(a_i) &= a_{i+1}, \quad i \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \\ \sigma(x) &= x, \quad x \notin \{a_1, \dots, a_m\},\end{aligned}$$

在此将下标 $\{1, \dots, m\}$ 方便地视为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中元素, 即模 m 的同余类. 称 m 为该轮换的长度; 2-轮换 (ab) 又称对换. 我们称 \mathfrak{S}_X 中两个轮换 $(a_1 \cdots a_m), (b_1 \cdots b_k)$ 不交, 如果 $\{a_1, \dots, a_m\} \cap \{b_1, \dots, b_k\} = \emptyset$.

由先前讨论可知不交的轮换对乘法相交换. 同样显然的是 $\text{ord}(a_1 \cdots a_m) = m$.

命题 B.2 (轮换分解) 每个 $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ 都能表成不交的轮换之积

$$\sigma = (a_1 a_2 \cdots)(b_1 b_2 \cdots) \cdots$$

其中的轮换 $(a_1 \cdots), (b_1 \cdots)$ 在至多差一个顺序的意义下唯一. 由于 1-轮换是单位元, 乘积中可以省去.

这无非是 X 在 σ 生成的有限轮换群 $\langle \sigma \rangle$ 下的轨道分解 (引理 0.17), 每个轮换对应到一个轨道, 描述了 σ 在该轨道上的作用.

我们称轮换分解中出现的轮换长度 n_1, n_2, \dots (包括长度为一的轮换) 为 σ 的**轮换型**, 计重数不计顺序. 为了得到唯一性, 不妨排成 $n_1 \geq n_2 \geq \dots$, 轮换型因之对应于整数 $n := |X|$ 的**分拆**: $n = n_1 + n_2 + \dots$. 上面对阶数的讨论蕴涵 σ 的阶数等于 n_1, n_2, \dots 的最小公倍数.

推论 B.3 (对换分解) 每个 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 都能表成若干对换的积, 但不唯一. 且群 \mathfrak{S}_n 由对换 $(1i)$ 或 $(i-1 i)$ 生成, 这里 $1 < i \leq n$.

我们既可以将 m -轮换拆分成 $m-1$ 个对换之积, 也可以直接通过排序算法 (如冒泡排序) 将其拆分, 行列式中的逆序数可看为选择排序. 由于对换分解不唯一, 且两两不可交换, 故不如轮换分解方便.

据此, 共轭作用 (见 0.18) 在对称群情形下有干净的陈述.

引理 B.4 设 $\tau = (a_1 a_2 \cdots)(b_1 \cdots) \cdots$ 为上述的轮换分解, $\tau \in \mathfrak{S}_X$, 则

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \cdots)(\sigma(b_1) \cdots) \cdots.$$

作为推论, 元素 τ 的共轭类由其轮换型确定; \mathfrak{S}_X 中的共轭类一一对应于轮换型 $n_1 \geq n_2 \geq \cdots$, 后者又一一对应于整数 $n = |X|$ 的分拆.

这无非是先给一个新序, 置换后再回到旧序, 等价于在新序下的置换.

引理 B.5 存在唯一的群同态 $\text{sgn} : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 使得 $\text{sgn}((ab)) = -1$.

若置换 $\sigma \in \text{Ker}(\text{sgn})$, 则称为偶置换, 否则为奇置换. 虽然对换分解不唯一, 但对换分解个数的奇偶性将始终保持一致 (因为两个对换之积为一个 3-轮换, 不可能退化成一个对换), 如何得到置换的奇偶性在交错代数 (比如行列式) 中将非常关键.

显然奇偶置换个数相同, 为此我们可以构造一个映射, 将每个偶置换乘上随意一个对换则为奇置换, 容易验证这是一个双射. 因此 $|\mathfrak{A}_n| = n!/2$.

定义 B.6 只有平凡正规子群的群称为单群.

例 B.7 (i) 素数阶循环群是单群, 而 $p^n (n \geq 2, p \text{ 为素数})$ 阶群有非平凡中心, 故不是单群;
(ii) $pq, p^2q (p, q \text{ 为素数})$ 阶群不是单群;
(iii) $2m (m \text{ 为大于 } 3 \text{ 奇数})$ 阶群不是单群.

以下记任意置换 σ 的不动点集为 $\text{Fix}(\sigma) := \{i : \sigma(i) = i\}$.

定理 B.8 (É. Galois) 当 $n \geq 5$ 时 \mathfrak{A}_n 是单群.

证明 设 $H \triangleleft \mathfrak{A}_n, H \neq \{1\}$. 从以上性质可知找出一个 3-轮换 $\sigma \in H$ 即足. 兹断言取 $\sigma \in H - \{1\}$ 使得 $|\text{Fix}(\sigma)|$ 极大便是.

如果 σ 的轮换分解中只有对换, 那么分解中至少含两项如 $(ij)(kl)$, 其中 $\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$. 由于 $n \geq 5$, 可取 $r \notin \{i, j, k, l\}$ 并定义

$$\tau := (klr), \quad \sigma' := [\tau, \sigma] = \tau \sigma \tau^{-1} \sigma^{-1} \in H \quad (\because H \triangleleft \mathfrak{A}_n). \quad (\text{B.1})$$

可直接验证 $i, j \in \text{Fix}(\sigma') - \text{Fix}(\sigma), \sigma'(k) = r \neq k$, 以及

$$\text{Fix}(\sigma) - \{r\} = \text{Fix}(\sigma) - \{k, l, r\} = \text{Fix}(\sigma) \cap \text{Fix}(\tau) \subset \text{Fix}(\sigma').$$

综之 $|\text{Fix}(\sigma')| > |\text{Fix}(\sigma)|$, 矛盾.

设 σ 的轮换分解中包含长度 > 2 的项 $(ijk \cdots)$. 假若 $\sigma = (ijk)$ 则是所求的 3-轮换; 否则因为 σ 不可能是 4-轮换, σ 除了 i, j, k 之外还挪动至少两个相异元 r, l . 依然以 (B.1) 式定义 $\sigma' \in H$. 可以验证 $j \in \text{Fix}(\sigma'), \sigma'(k) = l \neq k$ 和

$$\text{Fix}(\sigma) = \text{Fix}(\sigma) - \{k, l, r\} = \text{Fix}(\sigma) \cap \text{Fix}(\tau) \subset \text{Fix}(\sigma').$$

仍得到矛盾 $|\text{Fix}(\sigma')| > |\text{Fix}(\sigma)|$. 明所欲证.

推论 B.9 当 $n \geq 5$ 时, \mathfrak{A}_n 是 \mathfrak{S}_n 的唯一非平凡正规子群.

利用以上结果和 Sylow 定理可知最小非阿贝尔单群的阶数是 60, 且必同构于 \mathfrak{A}_5 .

B.2 群列

定义 B.10 考虑一系列群同态

$$\cdots \xrightarrow{f_0} G_1 \xrightarrow{f_1} G_2 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_i} G_{i+1} \rightarrow \cdots,$$

长度或有限或无限. 若对所有 i 都有

$$\text{Im}(f_i) = \text{Ker}(f_{i+1}),$$

则称此列**正合**. 我们经常把 $\{1\}$ 简写为 1 , 或用加性符号记为 0 . 举例明之, 对于任意同态




图 B.1: Illustration of an exact sequence of groups G_i using Venn diagrams

$\varphi: G \rightarrow G'$, 列 $G \rightarrow G' \rightarrow 1$ 正合当且仅当 φ 是满的, 列 $1 \rightarrow G \rightarrow G'$ 正合当且仅当 φ 是单的. **短正合列**为具有下列形式的正合列

$$1 \rightarrow G' \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} G'' \rightarrow 1$$

如上所述, 对任何一个短正合序列, f 一定为单射, 且 g 一定为满射, 且 f 的像会等于 g 的核. 有时也称 G 为 G'' 经由 G' 的**扩张**, 亦即 G 可表为 $G' \rtimes G''$. 而若 G 可表为 $G' \times G''$, 则称为**平凡扩张**; 若 G' 落在 G 的中心, 则称为**中心扩张**.

正合列经常和交换图表搭配. 其妙用在同调代数中才会完全彰显, 在 Galois 理论中不会用到.

定义 B.11 群 G 的**递降子群链**

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n = \{1\}$$

如满足 $\forall 0 \leq i < n, G_{i+1} \triangleleft G_i$, 则称之为**次正规列**, 若还有 $G_i \triangleleft G$ 则称为**正规列**, 而群族

$$G_i/G_{i+1}, \quad i = 0, \dots, n-1$$

称为该列的**因子群**. 正规列的**加细**是透过形如

$$[\cdots \triangleright G_i \triangleright G_{i+1} \triangleright \cdots] \rightsquigarrow [\cdots \triangleright G_i \triangleright G' \triangleright G_{i+1} \triangleright \cdots]$$

的反复插项得到的新列. 插入 $G' = G_i$ 或 G_{i+1} 得到的加细是平凡的; 反之则称为**真加细**.

定义 B.12 群 G 的正规列 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots$ 如对每个 i 都满足

$$G_i/G_{i+1} \leq Z_{G/G_{i+1}},$$

则称为**中心列**.

定义 B.13 若群 G 的次正规列 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots$ 满足 $G_{i+1} \subsetneq G_i$, 而且因子群皆为单群, 则称之为**合成列**, 若同时为正规列, 则称为**主序列**.

细观单群定义可见合成列正是无冗余项, 而且无法再 (真) 加细的列. 有限群总有合成列, 一般的群则未必.

引理 B.14 (Zassenhaus 蝴蝶引理) 固定群 G , 考虑子群 U, V 及各自的正规子群 $u \triangleleft U$, $v \triangleleft V$. 则有


$$u(U \cap v) \triangleleft u(U \cap V),$$

$$(u \cap V)v \triangleleft (U \cap V)v,$$


其中各项在注记 0.13 的意义下都是子群, 而且有自然的同构

$$\frac{u(U \cap V)}{u(U \cap v)} \cong \frac{(U \cap V)v}{(u \cap V)v}.$$

证明 我们将表解各子群之间的关系, 图例如下:



其中 $H \subset N_G(N)$. 现断言有以下图表:



即证. 故该引理也被称为蝴蝶引理.

定义 B.15 设 $G = G_0 \triangleright \cdots$ 为次正规列, 我们视其因子群 $(G_i/G_{i+1})_{i \geq 0}$ 为不计顺序, 但计入重数的集合. 如果两个次正规列长度相同, 而且其因子群在上述意义下相等, 则称两次正规列等价.

定理 B.16 (Schreier 加细定理) 设

$$\begin{aligned} G &= G_0 \triangleright \cdots \triangleright G_r \triangleright G_{r+1} = \{1\}, \\ G &= H_0 \triangleright \cdots \triangleright H_s \triangleright H_{s+1} = \{1\} \end{aligned}$$

为 G 的两个次正规列, 则两者有等价的加细.

证明 对每个 $0 \leq i \leq r, 0 \leq j \leq s$ 定义

$$\begin{aligned} G_{i,j} &:= G_{i+1}(H_j \cap G_i), \\ H_{j,i} &:= (G_i \cap H_j)H_{j+1}. \end{aligned}$$

先看 $G_{i,j}$, 由 $G_{i+1} \triangleleft G_i$ 知其为子群. 包含关系 $G_{i,j+1} \triangleleft G_{i,j}$ 成立, 而且

$$G_{i,0} = G_{i+1}(G \cap G_i) = G_i, \quad G_{i,s+1} = G_{i+1},$$

遂得到 $(G_i)_{i=0}^r$ 的加细

$$\mathcal{G} := [\cdots \triangleright G_i = G_{i,0} \triangleright G_{i,1} \triangleright \cdots \triangleright G_{i,s} \triangleright G_{i,s+1} = G_{i+1} \triangleright \cdots].$$

同理可见 $H_{j,i}$ 给出 $(H_j)_{j=0}^s$ 的加细, 记为 \mathcal{H} . 在引理 B.14 中取 $u := G_{i+1}$, $U := G_i$ 和 $v := H_{j+1}$, $V := H_j$, 遂导出

$$\frac{G_{i,j}}{G_{i,j+1}} = \frac{u(U \cap V)}{u(U \cap v)} \cong \frac{(U \cap V)v}{(u \cap V)v} = \frac{H_{j,i}}{H_{j,i+1}}.$$

当 (i, j) 取遍所有可能, 次正规列 \mathcal{G}, \mathcal{H} 的各个因子群在同构两边都恰好出现一次. 证毕.

推论 B.17 (Jordan–Hölder 定理) 群 G 的任两个合成列皆等价.

因此, 一旦群 G 有合成列, 则其因子群在定义 B.15 的意义下无关合成列的选取.

定义 B.18 对于 $x, y \in G$, 定义换位子

$$[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}.$$

对任意子集 $A, B \subset G$, 置 $[A, B] \triangleleft G$ 为 $\{[a, b] : a \in A, b \in B\}$ 的正规闭包. 递归地定义

- (i) 导出列: $G^{(0)} := G, G^{(i)} := [G^{(i-1)}, G^{(i-1)}] (\forall i \geq 1)$;
- (ii) 降中心列: $G_1 := G, G_i := [G, G_{i-1}] (\forall i \geq 2)$;
- (iii) 升中心列: $Z_0 := \{1\}, Z_i := \{x \in G \mid \forall y \in G : [x, y] \in Z_{i-1}\} (\forall i \geq 1)$.

容易验证以下性质. 设 $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

- (i) $xy = yx \iff [x, y] = 1$, 而 $[x, y]^{-1} = [y, x]$;
- (ii) 对于任意群同态 $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$, 有 $\varphi[x, y] = [\varphi(x), \varphi(y)]$;
- (iii) $G^{(i)} \leq G_i$;

(iv) $G^{(i)} \triangleleft G, G_i \triangleleft G$: 事实上 G 的任何自同构都保持子群 $G^{(i)}$ 和 G_i .

(v) $G_i/G_{i+1} = Z_{G/G_{i+1}}, Z_i/Z_{i+1} = Z_{Z/Z_{i+1}}$.

关于 $G^{(i)}$ 和 G_i 的性质可以递归地证明. 我们也称 $G^{(1)}$ 为 G 的导出子群或换位子群. 若 $N \triangleleft G$, 且 G/N 为阿贝尔群, 则 $G^{(1)} \leq N$, 故 $G^{\text{ab}} := G/G^{(1)}$ 称为 G 的交换化, G 是阿贝尔群当且仅当 $G^{(1)} = \{1\}$.

例 B.19 群 \mathfrak{S}_n 的导出子群 $\mathfrak{S}_n^{(1)}$ 等于 \mathfrak{A}_n . 当 $n \geq 5$ 时 \mathfrak{A}_n 是非交换单群, 因此它必然等于自身的导出子群 $\mathfrak{A}_n^{(1)}$.

当 $n = 1$ 时此为显然. 以下解释 $n \geq 2$ 情形: \mathfrak{S}_n 由对换生成, 每个对换都共轭于 (12), 故交换商 $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}_n^{(1)}$ 由 (12) 的像生成, 这是二阶元. 给出商同态

$$\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}_n^{(1)} \twoheadrightarrow \mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n \cong \{\pm 1\}.$$

比较阶数可见以上同态实为同构.

B.3 可解群

定义 B.20 设 G 为群. 给出如下等价定义:

可解群	幂零群
i) 导出列终止于 $\{1\}$	降中心列终止于 $\{1\}$
ii) 存在正规列使得每个因子群都交换	升中心列终止于 G
iii) 存在次正规列使得每个因子群都交换	存在中心列
iv) 存在次正规列使得每个因子群都为素数阶循环群	存在正规列 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{1\}$ 使得每个 $[G, G_i] \leq G_{i+1}$

若存在正规列使得每个因子群都为素数阶循环群, 则称之为**超可解群**;

若存在次正规列使得每个因子群都为循环群, 则称之为**多循环群**;

设 G 为幂零群, 则对任意 $x \in G$, 映射 $[x, \cdot] : g \mapsto [x, g]$ 迭代有限次后的像落在 $\{1\}$, 故成为平凡映射 $g \mapsto 1$. 这解释了“幂零”一词的来由. 而根据可解群的定义 iv), 非素数阶单群是不可解的.

命题 B.21 幂零蕴涵可解. 事实上, 对于有限群,

循环群 \subset 阿贝尔群 \subset 幂零群 \subset 超可解群 \subset 多循环群 \subset 可解群 \subset 有限生成群.

定义 B.22 性质 \mathcal{P} 称为**可继承的**, 若群 G 具有性质 \mathcal{P} , 则 G 的子群和商群都有性质 \mathcal{P} .

引理 B.23 循环, 阿贝尔, 可解, 超可解, 幂零都是可继承的.

可解群的扩张亦是可解群; 而幂零群的扩张未必是幂零群, 但其中心扩张为幂零群.

命题 B.24 设 $N \triangleleft G$, 则 G 可解当且仅当 $N, G/N$ 皆可解.

下述推论是证明五次以上方程无根式解的群论钥匙.

推论 B.25 当 $n \geq 5$ 时 \mathfrak{S}_n 不可解.

定理 B.26 (Burnside $p^a q^b$ 定理) $p^a q^b$ (p, q 是素数, a, b 是正整数) 阶群是可解群.

关于可解有限群最著名的结果当属英国数学家 Burnside 的猜想, 该猜想于 1963 年由 Walter Feit 和 John Griggs Thompson 证明.

定理 B.27 (Feit–Thompson 定理) 任意奇数阶有限群皆可解.

有限单群的分类是代数学里的一个巨大的工程. 有关的文章大多发表于 1955 年至 2004 年之间, 目的在于将所有的有限单群都给清楚地分类. 这项工程总计约有 100 位作者在 500 篇期刊文章中写下了上万页的文字. 该定理曾经有力地推动了有限单群的分类工作; 作为一篇有限群论的论文, 其 255 页的长度与繁复亦属空前, 然而还远远不是绝后的.

推论 B.28 除素数阶循环群外, 所有有限单群的阶都是偶数.

B.4 多项式补遗

定义 B.29 设 R 是环, R 上以 X 为变元集的多项式环记作 $R[X]$, 包含如下元素

$$f = \sum_{\substack{a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N} \\ x_1, \dots, x_n \in X}} c_{a_1, \dots, a_n} x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}.$$

在其上有自然的加法和乘法. 当 $X = \{x, y, \dots\}$ 时, 也记作 $R[x, y, \dots]$. 当 R 是交换环时, 则称为多项式代数. 设 K 是域, 多项式环 $F[X]$ 的分式域称为有理函数域, 记作 $K(X)$, 当 $X = \{x, y, \dots\}$ 时, 也记作 $K(x, y, \dots)$. 下标稍嫌繁杂, 我们顺势引进方便的多重指标符号, 令 $|X| = n$,

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &:= (a_1, \dots, a_n), \quad |\mathbf{a}| := a_1 + \cdots + a_n, \quad c_{\mathbf{a}} := c_{a_1, \dots, a_n}, \\ \mathbf{x} &:= (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \mathbf{x}^{\mathbf{a}} := x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}. \\ \implies f &= \sum_{\mathbf{a} \in \mathbb{N}^n} c_{\mathbf{a}} \mathbf{x}^{\mathbf{a}}. \end{aligned}$$

定义 B.30 定义多项式 f 的次数为 $\deg f := \max \{|\mathbf{a}| : |c_{\mathbf{a}}| \neq 0\}$. 如果 f 满足于 $c_{\mathbf{a}} \neq 0 \iff |\mathbf{a}| = m$, 则称 f 是 m 次齐次多项式.

例 B.31 若 K 是域, 在定义 0.47 中取 \deg 使得 $K[X]$ 为 ED.

例 B.32 Gauss 整数环定义为

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] := \{x + y\sqrt{-1} : x, y \in \mathbb{Z}\} \quad (\text{作为 } \mathbb{C} \text{ 的子环}).$$

在定义 0.47 中取范数映射

$$N(x + y\sqrt{-1}) = |x + y\sqrt{-1}|^2 = x^2 + y^2 \in \mathbb{N}.$$

使得其为 ED.

注意到 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 对共轭运算 $z \mapsto \bar{z}$ 封闭, $N(z) = z\bar{z}$ 是乘法么半群的同态, 由此不难推得 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times = N^{-1}(\mathbb{Z}^\times) = \{\pm 1, \pm\sqrt{-1}\}$.

命题 B.33 若 R 是 UFD/整环/Noetherian 环, 则 $R[X]$ 亦然. 域上的单元多项式环为 PID. 环上则未必, 如 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$

定义 B.34 称一个多项式 $f \in R[X]$ 为**对称多项式**, 若 $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_X, f(\mathbf{x}) = f(\sigma \mathbf{x})$. 记所有的 n 元对称多项式构成的环为 Λ_n .

定义 B.35 定义第 k 个 n 元**初等对称多项式**为 $e_k := \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_n}$.

定理 B.36 (对称多项式基本定理) 设 R 是环, $f \in \Lambda_n$ 是 R 上的对称多项式当且仅当是一些 n 元初等对称多项式的代数组合. 即 $\Lambda_n \cong R[e_1, e_2, \dots, e_n]$.

索引

兹给出名词索引及其英文翻译, 以供参考. 中文术语按汉语拼音排序.

- 半群 (semigroup), 1
 - 幺半群 (monoid), 1
- 本原元 (primitive element), 9
- 不可约元 (irreducible element), 8
- 乘性子集 (multiplicative subset), 6
- 次数 (degree), 9, 23
- 代数闭包 (algebraic closure), 9
- 单位 (unit), 5
- 导出列 (derived series), 21
- 对称多项式 (symmetric polynomial), 24
 - 初等对称多项式 (elementary symmetric polynomial), 24
- 对换 (transposition), 17
- 多项式环 (polynomial ring), 23
- 分拆 (partition), 17
- 共轭 (conjugation), 4
- 轨道 (orbit), 3
- 核 (kernel), 3
- 合成列 (composition series), 20
- 环 (ring), 5
 - 交换环 (commutative ring), 5
 - 子环 (subring), 5
 - 整环 (integral domain), 6
 - 除环 (division ring), 6
- 阶 (order), 1
- 极小多项式 (minimal polynomial), 9
- 局部化 (localization), 6
- 可分闭包 (separable closure), 10
- 可分多项式 (separable polynomial), 10
- 可继承的 (heritable), 22
- 零因子 (zero divisor), 5
- 理想 (ideal), 5
 - 极大理想 (maximal ideal), 7
 - 素理想 (prime ideal), 7
- 陪集 (coset), 2
- 群 (group), 1
 - 交错群 (alternating group), 2
 - 伽罗瓦群 (Galois group), 11
 - 单群 (simple group), 18
 - 可解群 (solvable group), 22
 - 商群 (quotient group), 3
 - 多循环群 (polycyclic group), 22
 - 子群 (subgroup), 1
 - Sylow p -子群 (Sylow p -subgroup), 4
 - 导出子群 (derived subgroup), 22
 - 正规子群 (normal subgroup), 1
 - 对称群 (symmetric group), 2
 - 幂零群 (nilpotent group), 22

- 循环群 (cyclic group), 1
- 置换群 (permutation group), 2
- 超可解群 (supersolvable group), 22
- 阿贝尔群 (Abel group), 1
- 素元 (prime element), 8
- 特征 (characteristic), 6
- 同构 (isomorphism), 3
 - 自同构 (automorphism), 3
- 同态 (morphism), 3, 5
 - 自同态 (endomorphism), 3
- 稳定化子 (stabilizer), 3
- 轮换 (cycle), 17
- 因子群 (factor subgroup), 19
- 有理函数域 (field of rational functions), 23
- 域 (field), 6
 - 代数闭域 (algebraically closed field), 9
 - 分式域 (field of fractions), 7
 - 分裂域 (splitting field), 10
 - 完全域 (perfect field), 10
- 域扩张 (field extension), 9
 - 二次扩张 (quadratic extension), 9
 - 代数扩张 (algebraic extension), 9
 - 伽罗瓦扩张 (Galois extension), 11
 - 单扩张 (simple extension), 9
 - 可分扩张 (separable extension), 10
- 复合 (compositum), 11
- 子扩张 (subextension), 9
- 平凡扩张 (trivial extension), 9
- 无限扩张 (infinite extension), 9
- 有限扩张 (finite extension), 9
- 有限生成扩张 (finitely generated extension), 9
- 正规扩张 (normal extension), 10
- 超越扩张 (transcendental extension), 9
- 正规闭包 (normal closure), 10
- 正规化子 (normalizer), 2
- 正规列 (normal series), 19
 - 次正规列 (subnormal series), 19
- 正合列 (exact sequence), 19
- 整环 (integral domain)
 - 主理想整环 (PID, principal ideal domain), 7
 - 唯一分解整环 (UFD, unique factorization domain), 8
 - 欧几里得整环 (ED, Euclid Domain), 8
- 中国剩余定理 (CRT, Chinese Remainder Theorem), 7
- 中心化子 (centralizer), 2
- 中心列 (central series), 20
 - 升中心列 (upper central series), 21
 - 降中心列 (lower central series), 21
- 主序列 (chief series), 20

参考文献

- [1] 冯克勤. 近世代数引论. 中国科学技术大学出版社, 合肥, 2009.
- [2] 李文威. 代数学方法 (卷一: 基础架构), volume 67.1 of 现代数学基础丛书. 高等教育出版社, 北京, 2019.
- [3] 林焘, 王理嘉. 语音学教程. 北京大学出版社, 北京, 2013.
- [4] 章璞. 伽罗瓦理论: 天才的激情, volume 37 of 现代数学基础丛书. 高等教育出版社, 北京, 2013.
- [5] 結城浩. 数学ガール: ガロア理論. SB クリエイティブ, 東京, 2012.