



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

রসায়ন

এক্সিড $\rightarrow$ যে সাধারণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে অক্সিডো-
-জন আয়ন (H^+) প্রদান করে, তাকে এক্সিড বলে।

আমি তাকে জৈবিক এক্সিড।


আমি তাকে $\rightarrow$ মিষ্টিক এক্সিড / জৈবিক এক্সিড /
মাইক্রোবিক এক্সিড

ক্ষারক $\rightarrow$ যেসব সাধারণ ^{বাস্তব} মাটি বিক্রিয়া করে
লবন সান উৎপন্ন হয়, তাকে ক্ষারক বলে।


OH^- $\rightarrow$ ক্ষার

অক্লান্ত HCl $\rightarrow$ অম্ল + ক্ষার $\rightarrow$ লবন + সান

বিক্রিয়া



PH




এসিড / অম্লীয় (৭) নিরপেক্ষ ক্ষার / ক্ষারীয়

কোনো তরলীয় দ্রবকে আর্দ্রদ্রোজন আয়নের ঘনত্বের
প্রমাণকে লগাফিথম (-log) ।
মানবদেহের সার্বজনীনভাবে HCl এর $\text{pH} \rightarrow 1.5 - 3.5$

— ক্ষারিকতা বৃদ্ধি + ক্ষারিকতা হ্রাস $\Rightarrow$ নিরপেক্ষ লবন +
 H^+ আয়ন।
 $\downarrow$ H^+ + দুর্বল $\downarrow$ $\rightarrow$ তীব্র লবন + H_2O

দুর্বল + ক্ষারিকতা $\rightarrow$ ক্ষারীয় লবন +
 OH^- আয়ন।



ক্ষারিকতা

৭/ এসিড (H^+)

ক্ষার (OH^-)

$NaCl \rightarrow$ লবন

$NaOH \rightarrow$ -ক্ষার

$HCl \rightarrow$ এসিড $\rightarrow$

$H_2SO_4 \rightarrow$ এসিড $\rightarrow$

H_2SO_3
সালফিউরাস এসিড

PH ***

$H_2CO_3 \rightarrow$

কার্বনিক
এসিড

HNO_3 - নাইট্রিক

$HCl \rightarrow H^+ / H_2SO_4 \rightarrow$ (H^+)

৫৬/১২ অক্টোবর $\rightarrow K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$

F, Cl, Br, I

সুপার-ইক্স $\rightarrow$ হ্যালাজেন

HF HCl
HBr HI


$\uparrow$
 $\downarrow$

$\rightarrow$

ক্ষারকতা হ্রাস পায়

$\rightarrow$

ক্লোরিন হ্রাস পায়।



1502



$$1+1 = 0.01$$

$$\text{pH} = -\log(0.01)$$

$$= 2 \text{ (Ans.)}$$

152

