

# 1 环面簇 (Toric Varieties)

## 1.1 基本定义

在欧式空间  $\mathbb{R}^n$  中一个锥形  $\sigma$  如果是有限个闭半平面的交, 我们谈论的都是顶点在原点的锥形. 我们说  $\sigma$  是严格的锥形如果  $\sigma$  不包含任何直线 (只包含射线).

考虑  $(\mathbb{R}^n)^* \cong \mathbb{R}^n$ . 对于锥形  $\sigma$ , 定义

$$\sigma^\vee = \{f \in (\mathbb{R}^n)^* : \forall x \in \sigma, f(x) \geq 0\}.$$

记  $N = \mathbb{Z}^n \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $M = \text{Hom}(N, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^n \subseteq (\mathbb{R}^n)^*$ . 我们说  $\sigma$  是有理的如果存在  $v_1, \dots, v_k \in N = \mathbb{Z}^n$  使得

$$\sigma = \mathbb{R}_{\geq 0}v_1 + \dots + \mathbb{R}_{\geq 0}v_k$$

我们下面说的锥形都是有理的.

此时定义对应的半群

$$S_\sigma = \sigma^\vee \cap M = \{f \in \text{Hom}(N, \mathbb{Z}) : \forall \sigma, f(x) \geq 0\}$$


对应的仿射环面簇

$$U_\sigma = \text{Hom}_{\text{么半群}}(S_\sigma, \mathbb{C}).$$

其中  $\mathbb{C}$  视作乘法么半群. 上面自然地有一个代数簇的结构. 或者说, 等价地,

$$\mathcal{O}(U_\sigma) = \mathbb{C}[X^{S_\sigma}]$$

这里表示群环  $X^a X^b = X^{a+b}$ .



考虑  $n = 1$ , 锥形是  $\mathbb{R}_{\geq 0}$ , 那么  $S_\sigma = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ . 对任何半群  $X$  都有

$$\text{Hom}_{\text{么半群}}(\mathbb{Z}_{\geq 0}, X) = X$$

即,  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  出发的同态只由 1 的像决定. 因此

$$U_\sigma = \mathbb{C} \quad \text{即} \quad \mathcal{O}(U_\sigma) = \mathbb{C}[X].$$

考虑  $n = 1$ , 锥形是  $\{0\}$ , 那么  $S_\sigma = \mathbb{Z}$ . 对任何半群  $X$  都有

$$\text{Hom}_{\text{么半群}}(\mathbb{Z}, X) = X \text{ 中可逆元}$$

因此

$$U_\sigma = \mathbb{C}^\times. \quad \text{即} \quad \mathcal{O}(U_\sigma) = \mathbb{C}[X, \frac{1}{X}].$$

如果锥形  $\sigma$  有一个面  $\tau$  (差一维的面). 我们可以假设  $\tau = \{\lambda = 0\}$  对某个  $\lambda \in S_\sigma$ . 那么可以直接验证

$$S_\sigma = S_\sigma + \mathbb{Z}_{\geq 0}\lambda \subseteq S_\sigma + \mathbb{Z} \cdot \lambda = S_\tau.$$

所以  $S_\tau$  出发的同态由其限制到  $S_\sigma$  上的同态唯一决定, 换句话说, 可以说

$$\text{Hom}_{\text{么半群}}(S_\tau, \mathbb{C}) = U_\tau \subseteq U_\sigma = \text{Hom}_{\text{么半群}}(S_\sigma, \mathbb{C})$$

实际上, 这是一个开浸入.

**注意 1** 但是反之,  $S_\sigma$  上的同态并不总能延拓到  $S_\tau$  上.


我们说一把扇子 (fan) 是一组严格 (有理) 锥形, 数量有限, 使得每个面都是组内的锥形, 两个组内的锥形的交还是组内的锥形. 对于一把扇子  $\Delta$ , 可以定义其环面簇

$$X(\Delta) = \bigcup_{\sigma \in \Delta} U_\sigma$$

其中包含是上段所说的. 这有 (Hausdorff 的) 代数簇的结构.


考虑下列扇子

{负半轴, {0}, 正半轴}




所以取并实际上是把  $\mathbb{C}$  的无穷远点添上, 所以我们得到  $\mathbb{CP}^1$ .

**习题 1.** 考虑平面上分出的三块区域. 证明得到的环面簇是  $\mathbb{CP}^2$ .



[提示：会算出



但是这个里面的映射得好好算一下。]

## 1.2 几何性质

### 1. 环面作用.

对于一个锥形  $\sigma$ , 对应  $S_\sigma \subseteq \mathbb{Z}^n$ . 在

$$U_\sigma = \text{Hom}_\mathbb{D}(S_\sigma, \mathbb{C})$$

上有  $\text{Hom}_\mathbb{D}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{C}) \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  显然的群作用

$$\begin{aligned} a &\in \text{Hom}_\mathbb{D}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{C}), \\ \varphi &\in \text{Hom}_\mathbb{D}(S_\sigma, \mathbb{C}) \end{aligned} \quad (a \cdot \varphi)(x) = a(x)\varphi(x).$$

例如当  $\sigma = \{0\}$  时

$$\begin{aligned} \sigma_0 &= \{0\} & S_\sigma &= \mathbb{Z}^n \\ U_\sigma &= \text{Hom}_\mathbb{D}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{C}) = (\mathbb{C}^\times)^n \end{aligned}$$

上面的作用就是自然的左乘作用.

一般地, 在一把扇子  $\Delta$  上, 对应的环面簇  $X(\Delta)$  也有  $(\mathbb{C}^\times)^n$  的群作用. 且此时  $U_{\{0\}} \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  是一个稠密开集, 在上面的作用恰好是左乘作用.

### 2. 不动点

考虑一把扇子  $\Delta$ . 对于一个锥形  $\sigma \in \Delta$ , 如果  $\sigma$  是满维数的, 那么记

$$x_\sigma(p) = \begin{cases} 1 & p = 0 \\ 0 & p \neq 0 \end{cases} \in U_\sigma = \text{Hom}_\mathbb{D}(S_\sigma, \mathbb{C})$$

因为此时  $S_\sigma$  没有元素可逆 (严格性).

全体

$$\{x_\sigma : \sigma \in \Delta \text{ 满维数}\}$$

就是所有  $T$  的不动点.

### 3. 极限点

一般地, 对于锥形  $\tau \in \Delta$ , 我们定义

$$x_\tau(p) = \begin{cases} 1 & p \in \tau^\perp \\ 0 & p \in S_\tau \setminus \tau^\perp \end{cases} \in \text{Hom}_\mathbb{D}(S_\tau, \mathbb{C})$$

这里  $\tau^\perp = \{p \in \mathbb{R}^n : \langle \tau, p \rangle = 0\}$ . 这是一个半群同态因为  $S_\tau$  在  $\tau^\perp$  一侧,

$x+y$	$(\tau \text{ 上})$	$(\tau^\perp \text{ 一侧})$	+	1	0
$(\tau^\perp \text{ 上})$	$(\tau^\perp \text{ 上})$	$(\tau^\perp \text{ 一侧})$	1	1	0
$(\tau^\perp \text{ 一侧})$	$(\tau^\perp \text{ 一侧})$	$(\tau^\perp \text{ 一侧})$	0	0	0

对于  $v \in \mathbb{Z}^n \subseteq \mathbb{R}^n$ , 我们定义  $\lambda_v(z) \in U_{\{0\}} \subseteq X(\Delta)$  为

$$(\lambda_v(z))(p) = z^{\langle v, p \rangle}.$$

那么此时

$$\lim_{z \rightarrow 0} \lambda_v(z) = x_\tau$$

其中  $\tau$  表示  $v$  所在的最小的锥形 (即, 在这个锥形的相对内部).

这是因为在  $U_\tau$  上, 点  $\lambda_v$  享有相同的表达式. 回忆,

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^n = \begin{cases} 0 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ \text{不存在} & n < 0 \end{cases}$$

$v$  落在  $\tau$  相对内部的条件是说  $p \in S_\tau$  和  $v$  垂直就和整个  $\tau$  垂直.

### 4. 轨道

对于一把扇子  $\Delta \subseteq \mathbb{R}^n$ , 其每条  $T = (\mathbb{C}^\times)^n$  轨道都经过唯一的一个上面定义的  $x_\tau$ . 轨道可以直接写出来

$$T \cdot x_\tau = \left\{ \lambda \in U_\tau : \begin{aligned} \lambda(\tau^\perp) &\in \mathbb{C}^\times \\ \lambda(S_\tau \setminus \tau^\perp) &= 0 \end{aligned} \right\} \cong \text{Hom}_{\text{群}}(\tau^\perp \cap S_\tau, \mathbb{C}^\times).$$

这里  $\tau^\perp = \{p \in \mathbb{R}^n : \langle \tau, p \rangle = 0\}$ .

因此轨道的维数

$$\dim T \cdot x_\tau = \tau \text{ 的余维数.}$$

且

$$\overline{T \cdot x_\sigma} = \bigcup_{\tau \geq \sigma} T \cdot x_\tau \quad U_\sigma = \bigcup_{\tau \leq \sigma} T \cdot x_\tau.$$

**注意 1** Morse 理论的类比. 每个点  $x \in X(\Delta)$ , 考虑往一个“方向” $v \in \mathbb{Z}^n$  处作用  $\lambda_v(z) \cdot x$ . 假设下列极限存在

$$\lim_{z \rightarrow 0} \lambda_v(z)x \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \lambda_v(z)x.$$

那么他们都是不动点. 但是其中一个稳定, 一个不稳定.

### 5. 紧致性

对于一把扇子  $\Delta$ , 对应的环面簇  $X(\Delta)$ . 那么

$$X(\Delta) \text{ 紧致} \iff \Delta \text{ 铺满了整个 } \mathbb{R}^n.$$

**注意 1** 一般地, 假如有  $\mathbb{Z}^n$  和  $\mathbb{Z}^m$  中的两把扇子  $\Delta_1$  和  $\Delta_2$ . 且  $\varphi: \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^m$  把任何  $\Delta_1$  中锥形的像映到  $\Delta_2$  的某

个锥形里,

$$\begin{array}{ccc} \sigma_1 & \xrightarrow{\varphi} & \sigma_2 \\ \downarrow & & \\ S_{\sigma_1} & \xleftarrow{\varphi^*} & S_{\sigma_2} \\ \downarrow & & \\ U_{\sigma_1} = \text{Hom}_{\mathbb{D}}(S_{\sigma_1}, \mathbb{C}) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}_{\mathbb{D}}(S_{\sigma_2}, \mathbb{C}) = U_{\sigma_2} \end{array}$$

这诱导了  $X(\Delta_1) \rightarrow X(\Delta_2)$ , 此时

$$X(\Delta_1) \rightarrow X(\Delta_2) \text{ 逆紧} \iff \boxed{\Delta_2 \text{ 在 } \varphi \text{ 下的原像被 } \Delta_1 \text{ 铺满.}}$$

**习题 1.** 证明曲面环面簇 (即二维的环面簇), 一定可以通过爆破变成光滑的. [提示: 只需要考虑一个锥形. 这是 **Eulid** 算法, 通过一个  $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$  可以假设其中一个向量是  $(0, 1)$ , 另一个是  $(n, -d)$ , 其中  $n > d > 0$ . 这时用  $(1, 0)$  分割. 假设  $n = kd + r$ , 其中  $0 < r < d$ , 那么通过  $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$   $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & -d \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & r \\ 0 & -d \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & r \\ 1 & r-d \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & r \\ 1 & r-d \end{pmatrix}$ .]

## 6. 光滑性

对于一个锥形  $\sigma$ , 对应的仿射环面簇  $U_\sigma$ . 那么

$$U_\sigma \text{ 光滑} \iff \boxed{\begin{array}{l} \text{存在 } v_1, \dots, v_k \in \mathbb{Z}^n \text{ 使得} \\ \sigma = \mathbb{R}_{\geq 0}v_1 + \dots + \mathbb{R}_{\geq 0}v_k, \\ \text{且 } v_1, \dots, v_k \text{ 可以延拓为 } \mathbb{Z}^n \text{ 的一组基.} \end{array}}$$

在此时,

$$S_\sigma \cong \mathbb{Z}_{\geq 0}^k \oplus \mathbb{Z}^{n-k}.$$

所以

$$U_\sigma = \mathbb{C}^k \times (\mathbb{C}^\times)^{n-k}.$$

**注意 1** 很多情况都不是光滑的.

1. 考虑四个向量  $(\pm 1, \pm 1, 1)$  的非负线性组合, 这是三维却必须用四个向量生成.

2. 平面上考虑  $(1, 2)$  和  $(1, 5)$  的非负线性组合, 因为  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \neq \pm 1$ , 所以也不是光滑的.

## 7. 爆破

考虑一个满维数的锥形  $\sigma$ , 在内部选择一条射线, 这把  $\sigma$  分成  $n$  份满维数的锥形  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ .

$\sigma$	$\sigma = \sigma_1 \cup \dots \cup \sigma_n$	$\sigma_1, \dots, \sigma_n, \sigma_1 \cap \sigma_2, \dots$
$S_\sigma$	$S_\sigma = S_{\sigma_1} \cap \dots \cap S_{\sigma_n}$	$S_{\sigma_1}, \dots, S_{\sigma_n}, S_{\sigma_1 \cap \sigma_2}, \dots$
$U_\sigma$	?	$U_{\sigma_1}, \dots, U_{\sigma_n}, U_{\sigma_1 \cap \sigma_2}, \dots$

此时有映射

$$\bigcup U_{\sigma_i} \longrightarrow U_\sigma.$$

这是  $T$  等变的, 所以我们可以主要分析轨道 (上的代表点  $x_\tau$ ).

不难发现

轨道	原像
$x_\sigma = T \cdot x_\sigma$	$\bigcup_{\sigma' \leq \sigma} T x_{\sigma'}$
$T \cdot x_\tau$	$T \cdot x_\tau \quad (\tau < \sigma)$

所以除了  $x_\sigma$  原像比较大, 其他点原像都是一个点.

如果  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$  都光滑, 那么  $\bigcup_{\sigma' \leq \sigma} T x_{\sigma'} \cong \mathbb{C}P^{n-1}$ , 且上面的

$$\bigcup U_{\sigma_i} \longrightarrow U_\sigma$$

恰是在  $x_\sigma$  处的爆破.