

1 量子群

Lie 代数的标准技巧是“拿 \mathfrak{sl}_2 ”当尺子. 记

$$h = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \quad e = \begin{pmatrix} & 1 \\ 0 & \end{pmatrix} \quad f = \begin{pmatrix} & \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

对于一个 \mathfrak{sl}_2 的不可约表示 V , 记 $V_n = \{x \in V : hx = nx\}$.

熟知最高权为 n 的不可约表示形如

$$0 \xleftarrow{f} V_{-n} \xrightleftharpoons[e]{e} V_{-n+2} \xrightleftharpoons[e]{e} \cdots \xrightleftharpoons[e]{e} V_{n-2} \xrightleftharpoons[e]{e} V_n \xrightarrow{e} 0$$

且 $\dim V_\bullet = 1$.

此时, 任意选取一个非零元 $b_i \in V_i$ 组成 \mathcal{B} . 那么我们可以定义 \mathfrak{sl}_2 这把尺子的刻度

$$\begin{aligned} \epsilon(x) &= \max\{i : e^i x \neq 0\} \\ \varphi(x) &= \max\{i : f^i x \neq 0\} \end{aligned}$$

所以 $x \in V_i$ 其中 $i = \varphi(x) - \epsilon(x)$.

如果我们 \mathcal{B} 选得好, 那么

$$e_i(\mathcal{B}) \subseteq \mathcal{B} \cup \{0\} \supseteq f_i(\mathcal{B}).$$

1.1 \mathfrak{sl}_n 的表示

回忆 \mathfrak{sl}_n 中, Cartan 子代数

$$\mathfrak{h} = \{\text{diag}(x_1, \dots, x_n) : x_1 + \dots + x_n = 0\}$$

将 $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{h}^*$ 视作坐标. 单根取作 $\{\alpha_i = x_i - x_{i+1} : i = 1, \dots, n-1\}$. 那么 \mathfrak{sl}_2 -triple 对应

$$\begin{aligned} h_i &= \text{diag}(\dots, 0, \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}, 0, \dots) \\ e_i &= \text{diag}(\dots, 0, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots) = E_{i, i+1} \\ f_i &= \text{diag}(\dots, 0, \begin{pmatrix} 0 & \\ & 1 \end{pmatrix}, 0, \dots) = E_{i+1, i} \end{aligned}$$

回忆其自然表示 $V = \mathbb{C}^n$. 记 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 为自然基. 那么

$$\mathbb{C}\mathbf{v}_i = V_{x_i} = \{v \in V : \text{diag}(x_1, \dots, x_n)v = x_i v\}.$$

其作用由下表给出

	\cdots	\mathbf{v}_{i-1}	\mathbf{v}_i	\mathbf{v}_{i+1}	\mathbf{v}_{i+2}	\cdots
e_i	\cdots	0	0	\mathbf{v}_i	0	\cdots
f_i	\cdots	0	\mathbf{v}_{i+1}	0	0	\cdots

考虑 $V^{\otimes N}$, 此时

$$\mathfrak{gl}_n \begin{matrix} \curvearrowright \\ \text{左作用} \end{matrix} V^{\otimes N} \begin{matrix} \curvearrowright \\ \text{左作用} \end{matrix} \mathfrak{S}_N$$

对于 N 的一个分拆 $\lambda = \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$, 并填入 1 到 N .

取 Young symmetriser $b_\lambda = c_\lambda r_\lambda$, 其中 c_λ 是列交错和, r_λ 是行和. 记

$$V_\lambda = V^{\otimes N} b_\lambda$$

把 $x_1 \otimes \dots \otimes x_N$ 按照填入的数按顺序记入 Young 表, 并且将 \mathbf{v}_i 在 Young 图中改写为 i .

$$r_\lambda = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{\{1,2,3,4\}} \times \mathfrak{S}_{\{5,6,7\}} \times \mathfrak{S}_{\{8\}}} \sigma \quad c_\lambda = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{\{1,5,8\}} \times \mathfrak{S}_{\{2,6\}} \times \mathfrak{S}_{\{3,7\}} \times \mathfrak{S}_{\{4\}}} (-1)^\sigma \sigma.$$

1	2	3	4
5	6	7	
8			

$$x_1 \otimes \dots \otimes x_8 = \begin{matrix} x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 \otimes x_4 \\ \otimes \quad \otimes \quad \otimes \\ x_5 \otimes x_6 \otimes x_7 \\ \otimes \\ x_8 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \mathbf{v}_4 \otimes \mathbf{v}_2 \otimes \mathbf{v}_4 \otimes \mathbf{v}_1 \\ \otimes \quad \otimes \quad \otimes \\ \mathbf{v}_3 \otimes \mathbf{v}_2 \otimes \mathbf{v}_1 \\ \otimes \\ \mathbf{v}_1 \end{matrix} = \begin{matrix} 4 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & \\ 1 & & & \end{matrix}$$

令 M 是一个 Young 表对应的单项式. 注意到:

- 当列中有重复元素时, $M \cdot b_\lambda = 0$.

[因为列是交错和]

- (非零时) 其权为 $\phi_1 x_1 + \dots + \phi_n x_n$, 其中 ϕ_i 是 Young 表中 i 的使用次数.

回忆 x 在张量积上的作用是逐项作用再相加.

记 M_0 是第 i 行全部填 i 的 Young 表对应的单项式. 注意到:

- 第 i 行全部填 i 时, 记为 M_0 , 那么 $M_0 \cdot b_\lambda = 0$.

因为 M 在 $M \cdot b_\lambda$ 前的系数是 1.

- 任何一个 M , 都可以作用数次 $\{E_{ij}\}$ 进入 $\mathbb{C}M_0$.

看下面的例子.

从上面两点已经足够说明 V_λ 为 \mathfrak{sl}_n 的一个最高权为 $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$ 的不可约表示.

记 $\mathbb{I} = \{1, \dots, n-1\}$, 权格 $\Lambda = \mathbb{Z}x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}x_n / (x_1 + \dots + x_n)$, fundamental weight $\omega_i = x_1 + \dots + x_i$.

我们定义 **Kashiwara 晶体基** 是 \mathcal{B} 伴着下列映射

$$\begin{aligned} \text{作用} \quad e_i, f_i : \mathcal{B} &\rightarrow \mathcal{B} \cup \{0\} \\ \text{尺度} \quad \epsilon_i, \varphi_i : \mathcal{B} &\rightarrow \mathbb{Z} \cup \{0\} \\ \text{权} \quad \text{wt} : \mathcal{B} &\rightarrow \Lambda \end{aligned}$$

我们要求


$$e_i(x) = y \iff f_i(y) = x.$$

$$\text{且此时} \begin{cases} \epsilon_i(y) = \epsilon_i(x) - 1 \\ \varphi_i(y) = \varphi_i(x) + 1 \\ \text{wt}(y) = \text{wt}(x) + \alpha_i. \end{cases} \quad \text{. 还要求}$$

$$\varphi_i(x) - \epsilon_i(x) = \langle h_i, \text{wt}(x) \rangle.$$

$$\begin{aligned} &\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & 2 \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} \\ e_1 = E_{12} &\rightarrow \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & (1) & 3 & 2 \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & (1) \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & 2 \\ \hline (1) & 3 & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} (=0) \\ e_1 = E_{12} &\rightarrow \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 3 & (1) \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} + 0 + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & (1) & 3 & 1 \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} + 0 = 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 3 & 1 \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} \\ E_{13} = [e_1, e_3] &\rightarrow 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & (1) & 1 \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} + 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 3 & 1 \\ \hline 2 & (1) & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} (=0) \\ e_2 = E_{23} &\rightarrow 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & (2) & 4 & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} \quad E_{42} = [e_4, [e_3, e_2]] &\rightarrow 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & 2 & (2) & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array} + 0 \\ e_3 = E_{43} &\rightarrow 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & 2 & 2 & \\ \hline (3) & & & \\ \hline \end{array} \end{aligned}$$

习题 1. 证明列严格递增且行单调递增 (半标准 Young 表) 的 Young 表构成一组基. [提示: 首先他们线性无关, 说明每个半标准 Young 图都被一串 $E_{i < j}$ 提到 M_0 , 且作用在比其小 (某个序下) Young 图上得 0. 再说明张成整个表示, 我们说明任何一个 Young 表对应的单项式都可以. 首先可以假设列严格递增; 找最先 (某个序下) 出现的行递减. 考

虑  中 ``标出位置'' 的对称群 $G \subseteq \mathfrak{S}_N$. 记 g

是他们的交错和. 这是任何列内的置换 σ 都一定存在一个两个 ``标出位置'' 位置出现在同一行. 因此行内变换含有一个 $\sigma^{-1}G\sigma$ 的对换, 因此 $M \cdot g \cdot b_\lambda = 0$. 展开 Mg 归纳.]

1.2 Kashiwara 晶体基

上一节我们虽然说明

任何一个 M , 都可以作用数次 $\{E_{ij}\}$ 进入 $\mathbb{C}M_0$.

但是我们没法确定前面的系数.

以后见之明, 量子群告诉我们

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 2 & 4 \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 3 & & & \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & (1) & 2 & 4 \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 3 & & & \\ \hline \end{array} + q \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & (1) & 4 \\ \hline 2 & 3 & 4 & \\ \hline 3 & & & \\ \hline \end{array}$$

即 $2 = (1+q)|_{q=1}$. 换句话说 Lie 代数作为 $q = 1$ 的特殊情况, 把 Young 图上某种“分次”结构隐藏掉了. Kashiwara 的想法是取 $q = 0$.

注意 1 这里的 e_i, f_i 是 Kashiwara operator 和 Lie 代数中的 e_i 和 f_i 不一样, 虽然有联系, 但是这里仅仅不妨理解为一个记号.

注意 2 实际上不如说 Kashiwara 晶体基是定义了一个带了一些结构的图 (晶体图). 为了画出这个图, 我们可以只标记 f_i , 且可以略去 $f_i(x) = 0$ 的那些. 下图中出现的情况, 都有

$$\begin{aligned} \epsilon_i(x) &= \max\{k : e_i^k x \neq 0\} \\ \varphi_i(x) &= \max\{k : f_i^k x \neq 0\} \end{aligned}$$

例如, 仿照 \mathfrak{sl}_n 的表示, 定义一个 Young 表的权是 $\ell_1 x_1 + \dots + \ell_n x_n$, 其中 ℓ_i 是 i 使用的次数.

下面是一些例子

$$\mathbb{I} = \{1\} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 2 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 2 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 2 & 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\mathbb{I} = \{1, 2, 3\} \quad \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{2} \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{3} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 2 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 2 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 2 & 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\downarrow 2 \quad \downarrow 2 \quad \downarrow 2$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\downarrow 2 \quad \downarrow 2$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 3 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\mathbb{I} = \{1, 2\}$$

$$\downarrow 2$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & 3 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\mathbb{I} = \{1, 2, 3\} \quad \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{1} \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{3} \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{2} \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{2} \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{3} \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{2} \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\downarrow 3 \quad \downarrow 1$$

Kashiwara 晶体基的一个优点是在张量积下非常好. 对于两个晶体基 \mathcal{B}_1 和 \mathcal{B}_2 . 那么可以定义二者的张量积 $\text{wt}(x \otimes y) = \text{wt}(x) + \text{wt}(y)$ 以及

$$f_i(x \otimes y) = \begin{cases} f_i(x) \otimes y & \varphi_i(y) \leq \epsilon_i(x) \\ x \otimes f_i(y) & \varphi_i(y) > \epsilon_i(x) \end{cases}$$

$$e_i(x \otimes y) = \begin{cases} e_i(x) \otimes y & \varphi_i(y) < \epsilon_i(x) \\ x \otimes e_i(y) & \varphi_i(y) \geq \epsilon_i(x) \end{cases}$$

$$\varphi_i(x \otimes y) = \max\{\varphi_i(x), \varphi_j(y) + \langle h_i, \text{wt}(x) \rangle\}$$

$$\epsilon_i(x \otimes y) = \max\{\epsilon_i(x), \epsilon_j(y) - \langle h_i, \text{wt}(x) \rangle\}$$

这样定义是有动机的, 这是经典的 Clebsch–Gordan 公式

$x \otimes y$	y	$\begin{array}{cccc} \boxed{1111} & \rightarrow & \boxed{1112} & \rightarrow & \boxed{1222} & \rightarrow & \boxed{2222} \end{array}$
x	$\epsilon(x)^{\varphi(y)}$	$\begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$
$\boxed{11111}$	0	$\begin{array}{cccc} \boxed{11111} & \rightarrow & \boxed{11111} & \rightarrow & \boxed{11111} & \rightarrow & \boxed{11111} \\ \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes \\ \boxed{1111} & & \boxed{1112} & & \boxed{1222} & & \boxed{2222} \end{array}$
\downarrow		
$\boxed{11112}$	1	$\begin{array}{cccc} \boxed{11112} & \rightarrow & \boxed{11112} & \rightarrow & \boxed{11112} & \rightarrow & \boxed{11112} \\ \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes \\ \boxed{1111} & & \boxed{1112} & & \boxed{1222} & & \boxed{2222} \end{array}$
\downarrow		
$\boxed{11122}$	2	$\begin{array}{cccc} \boxed{11122} & \rightarrow & \boxed{11122} & \rightarrow & \boxed{11122} & \rightarrow & \boxed{11122} \\ \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes \\ \boxed{1111} & & \boxed{1112} & & \boxed{1222} & & \boxed{2222} \end{array}$
\downarrow		
$\boxed{12222}$	3	$\begin{array}{cccc} \boxed{12222} & \rightarrow & \boxed{12222} & \rightarrow & \boxed{12222} & \rightarrow & \boxed{12222} \\ \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes \\ \boxed{1111} & & \boxed{1112} & & \boxed{1222} & & \boxed{2222} \end{array}$
\downarrow		
$\boxed{22222}$	4	$\begin{array}{cccc} \boxed{22222} & \rightarrow & \boxed{22222} & \rightarrow & \boxed{22222} & \rightarrow & \boxed{22222} \\ \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes & \rightarrow & \otimes \\ \boxed{1111} & & \boxed{1112} & & \boxed{1222} & & \boxed{2222} \end{array}$

例如

$x \otimes y$	y	$\begin{array}{cccc} \boxed{1} & \xrightarrow{1} & \boxed{2} & \xrightarrow{2} & \boxed{3} & \xrightarrow{3} & \boxed{4} \end{array}$
x	$\epsilon(x)^{\varphi(y)}$	$\begin{array}{cccc} 100 & 010 & 001 & 000 \end{array}$
$\boxed{1}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{cccc} \boxed{1} \otimes \boxed{1} & \xrightarrow{1} & \boxed{1} \otimes \boxed{2} & \xrightarrow{2} & \boxed{1} \otimes \boxed{3} & \xrightarrow{3} & \boxed{1} \otimes \boxed{4} \\ & & \downarrow 1 & & \downarrow 1 & & \downarrow 1 \end{array}$
$1 \downarrow$		
$\boxed{2}$	$\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{cccc} \boxed{2} \otimes \boxed{1} & \xrightarrow{2} & \boxed{2} \otimes \boxed{2} & \xrightarrow{3} & \boxed{2} \otimes \boxed{3} & \xrightarrow{3} & \boxed{2} \otimes \boxed{4} \\ & & \downarrow 2 & & \downarrow 2 & & \downarrow 2 \end{array}$
$2 \downarrow$		
$\boxed{3}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{cccc} \boxed{3} \otimes \boxed{1} & \xrightarrow{1} & \boxed{3} \otimes \boxed{2} & \xrightarrow{3} & \boxed{3} \otimes \boxed{3} & \xrightarrow{3} & \boxed{3} \otimes \boxed{4} \\ & & \downarrow 3 & & \downarrow 3 & & \downarrow 3 \end{array}$
$3 \downarrow$		
$\boxed{4}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}$	$\begin{array}{cccc} \boxed{4} \otimes \boxed{1} & \xrightarrow{1} & \boxed{4} \otimes \boxed{2} & \xrightarrow{2} & \boxed{4} \otimes \boxed{3} & & \boxed{4} \otimes \boxed{4} \end{array}$

由此出发能够得到经典的 Littlewood–Richardson rule. 具体来说, 考虑自然表示 V_{\square} ,

$$\boxed{1} \xrightarrow{1} \dots \xrightarrow{n-1} \boxed{n}.$$

对每一个 fundamental weight $\omega_i = x_1 + \dots + x_N$ 对应的基本表示 V_i 可以嵌入 $V_{\square}^{\otimes N}$. 对应连通分支的晶体图是 $\boxed{i_1} \otimes \dots \otimes \boxed{i_N}$ 使得 $i_1 < \dots < i_N$. 我们将其记为 $\begin{array}{c} \boxed{i_1} \\ \vdots \\ \boxed{i_N} \end{array}$. 一般地, 假如把任何一个权 λ 写成 ω_i 的和按照 $\omega_1 > \omega_2 > \dots > \omega_{n-1}$ 降序

$$\lambda = \omega_{n-1} + \dots + \omega_{n-2} + \dots$$

可以把对应的表示嵌入到对应

$$V_{n-1} \otimes V_{n-1} \otimes \dots \otimes V_{n-2} \otimes \dots$$

中. 此时记为

$$\boxed{} \otimes \boxed{} = \boxed{ }$$

对应的 Crystal graph 的连通分支恰好对应半标准 Young 表.

参考文献

- Bump, Schilling. Crystal Bases: Representations And Combinatorics
- Nakashima. Crystal base and a generalization of the Littlewood-Richardson rule for the classical Lie algebras.