

E.A.6.7 (HC-VIP)

1.1 Modellazione

Dati i parametri $I, V, G = (I, \text{bus})$ t.c.

- $\text{casa} \in I$
- $V \subseteq I/\{\text{casa}\}$
- $\text{bus} \subseteq I \times I$
- $|V| \leq \frac{|I|}{2}$

Si definiscono le seguenti variabili:

- $P = |I|$ è il numero di *bus* da prendere in un percorso che parte da *casa*, visita tutti gli indirizzi esattamente una volta e ritorna a *casa*
- servono $|I| - 1$ *bus* per visitare tutti gli indirizzi esattamente una volta più 1 *bus* per tornare a casa a fine giornata
- $\mathcal{P} = \{1, \dots, P\}$
- $\mathcal{I} = \{1, \dots, |I|\}$ l'insieme di identificatori per cui esiste una funzione id biettiva t.c. $\text{id} : \mathcal{I} \rightarrow I$ e $\text{id}(1) = \text{casa}$
- $\mathcal{V} = \{i \mid i \in \mathcal{I} \wedge \exists v \in V \wedge \text{id}(i) = v\}$
- $X = \{X_{i,j}^p \mid (i,j) \in \text{bus} \wedge p \in \mathcal{P}\}$ l'insieme di variabili dove
 - $X_{i,j}^p$ è vera se l'arco $(i,j) \in \text{bus}$ è stato percorso al p -esimo passo

$$\begin{aligned}
 \phi = & \phi_{\text{almeno_un_arco_per_passo}} \wedge \\
 & \phi_{\text{al_più_un_arco_per_passo}} \wedge \\
 & \phi_{\text{almeno_un_arco_per_indirizzo}} \wedge \\
 & \phi_{\text{al_più_un_arco_per_indirizzo}} \wedge \\
 & \phi_{\text{client_VIP_nella_prima_metà}} \wedge \\
 & \phi_{\text{partenza_da_casa}} \wedge \\
 & \phi_{\text{arrivo_a_casa}}
 \end{aligned} \tag{1}$$

TODO: non mi piace tanto «passo», ma non è che «istante» sia meglio, stiamo parlando di una lunghezza, non di una durata

$$\begin{aligned}
\phi_{\text{almeno_un_arco_per_passo}} &= \bigwedge_{l \in \mathcal{L}} \bigvee_{(i,j) \in \text{bus}} X_{i,j}^l \\
\phi_{\text{al_più_un_arco_per_passo}} &= \bigwedge_{l \in \mathcal{L}} \bigvee_{\substack{(i_1,j_1),(i_2,j_2) \in \text{bus} \\ i_1 < i_2 \vee \\ (i_1=i_2 \wedge j_1 < j_2)}} X_{i_1,j_1}^l \rightarrow \neg X_{i_2,j_2}^l \\
\phi_{\text{almeno_un_arco_per_indirizzo}} &= \bigwedge_{\substack{j \in I \\ j \neq \text{casa}}} \bigvee_{\substack{i \in I \\ l \in \mathcal{L} \\ (i,j) \in \text{bus}}} X_{i,j}^l \\
\phi_{\text{al_più_un_arco_per_indirizzo}} &= \bigwedge_{\substack{j,i_1,i_2 \in I \\ l \in \mathcal{L} \\ (i_1,j),(i_2,j) \in \text{bus}}} X_{i,j_1}^l \rightarrow \neg X_{i,j_2}^l \\
\phi_{\text{client_VIP_nella_prima_metà}} &= \bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \bigvee_{\substack{i \in \mathcal{I} \\ l \in \mathcal{L} \\ l < \frac{L}{2} \\ (i,v) \in \text{bus}}} X_{i,v}^l \\
\phi_{\text{partenza_da_casa}} &= \bigvee_{\substack{i \in \mathcal{I} \\ i \neq 1 \\ (1,i) \in \text{bus}}} X_{1,i}^1 \\
\phi_{\text{arrivo_a_casa}} &= \bigvee_{\substack{i \in \mathcal{I} \\ i \neq 1 \\ (i,1) \in \text{bus}}} X_{i,1}^L
\end{aligned} \tag{2}$$

1.2 Istanziamento

il bro deve visitare una serie di clienti

- parte da casa sua
- li visita tutti
- torna a casa sua
- usa l'autobus
- l'ordine non conta
- ha solo biglietti per corsa semplice
 - quindi può raggiungere il cliente successivo usando un solo autobus
- trovare un itinerario tale che
 1. parte di casa la mattina
 2. torna a casa a fine giornata
 3. Raggiungere il cliente successivo (o casa sua, a fine giornata) dalla sua postazione corrente utilizzando un unico autobus;
 4. Visita un sottoinsieme V dei clienti nella prima metà del percorso
- ho un mega elenco di tutte le linee autobus della città

- ricavo tutte le coppie (A, B) t.c. esiste un unico autobus che collega A, B

pazzerello, quindi:

- mi devo visitare questo bel grafo diretto
- devo visitare ogni indirizzo al più una volta
- non solo, gli indirizzi in V li devo visitare nella prima metà...

un bel parto, ok, ma forse ci siamo

- forse dovrei creare una variabile per ogni arco di «bus»
- in più devo tenere in considerazione il tempo
- quindi avrei tipo una variabile per ogni arco per ogni istante di tempo
- e supponiamo che il tempo massimo sia $T = |I| + 1$
 - non lo supponiamo, è così, ci deve mettere esattamente questo tempo
 - non ci può mettere di meno, perché vorrebbe dire che non ha visitato tutti
 - non ci può mettere di più, perché vorrebbe dire che ha fatto doppio giro
 - così è facile anche scrivere vincoli del tipo i clienti V stanno nella prima metà $\frac{T}{2}$
 - posso forzare che la casa iniziale sia a true? No, devo forzare che l'arco iniziale sia per forza con la casa a sinistra, tipo $X_{1,v}^1$ è true per ogni v (che poi sarebbe $i \in \mathcal{I}$, non v)

1. in un dato istante di tempo un solo arco è preso
2. in un dato istante di tempo al più un arco è preso
3. devo aver visitato tutti i nodi a fine giornata (hm...)
 - vabbeh, l'idea sarebbe «esiste almeno un arco attivo che porta in quel nodo» per ogni nodo, e non importa quando
 - in più rafforzo dicendo che se questo arco esiste, per i clienti vip deve essere nella prima metà
 - ah, non visito un arco più di una volta (questo va a due a due)
4. mi manca altro?

1.2.1 Variabili

1.2.2 Vincoli

1.3 Codifica SATCodec

1.3.1 ...

1.3.2 ...