

《偏微分方程》学习指导 与习题解答

浙江大学数学系

前 言

《偏微分方程》课程是本科阶段公认的较难学习和掌握的公共数学课程之一，为了帮助学生能更好地学习和掌握偏微分方程的基本概念、基本理论以及基本的求解方法，我们组织部分任课老师编写了这本《偏微分方程学习指导与习题解答》。

本书共分六章，除第一章外每章分为基本要求、内容提要 and 习题解答三部分。基本要求部分主要起教学大纲与教学计划的作用，用“理解、了解和知道”三个术语给出了基本概念和基本内容的不同要求，用“熟练掌握、掌握和会”三个术语给出了求解方法和解题技巧的不同要求；内容提要部分给出相关内容的精讲，供学生复习参考之用；习题解答部分以李胜宏、潘祖梁和陈仲慈编著的《数学物理方程》(浙江大学出版社，2008 年) 的附后练习题为主，这些习题属于掌握偏微分方程知识所必须的基本训练。

本书是多位老师合作的结果，其中第一章和第六章由薛儒英编写，第二章和第三章分别由汪国昭和吴彪编写，王会英和王伟分别编写了第四章和第五章的内容，最后由薛儒英和贾厚玉统稿并补充了每一章的基本要求和内容提要。本书得到浙江大学大类课程教改课题《微分方程》的资助，得到浙江大学数学系各位老师的大力支持，在此表示感谢。

目 录

1	预备知识	2
1.1	一些常用的常微分方程的求解	2
1.2	Sturm-Liouville 本征值 (或固有值) 问题	16
2	方程的导出和定解问题	21
2.1	基本要求与内容提要	21
2.2	习题解答	23
3	行波法	29
3.1	基本要求与内容提要	29
3.2	习题解答	33
4	分离变量法	42
4.1	基本要求与内容提要	42
4.2	习题解答	43
5	积分变换法	66
5.1	基本要求与内容提要	66
5.2	习题解答	68
6	Green 函数法	83
6.1	基本要求与内容提要	83
6.2	习题解答	84

第 6 章 Green 函数法

§6.1 基本要求与内容提要

一. 基本要求

- (1). 理解第一格林公式和第二格林公式;
- (2). 了解 Laplace 方程的基本解;
- (3). 了解 Laplace 方程第一边值问题格林函数的定义, 能用格林函数来表示 Laplace 方程第一边值问题的解;
- (4). 会用镜像法来求解某些特殊区域上 Laplace 方程第一边值问题的格林函数.

二. 内容提要

(1). Ω 是 \mathbb{R}^3 中的 (有界) 区域, 边界为 $\partial\Omega$, \vec{n} 是边界上的单位外法向量, u 和 v 在 Ω 有二阶连续的偏导数. 则第一 Green 公式:

$$\int \int \int_{\Omega} u \Delta v dV = \int \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} dS - \int \int \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV.$$

第二 Green 公式:

$$\int \int \int_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dV = \int \int_{\partial\Omega} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) dS.$$

Ω 是 \mathbb{R}^2 中的 (有界) 区域, 边界为 $\partial\Omega$, \vec{n} 是边界上的单位外法向量, u 和 v 在 Ω 有二阶连续的偏导数. 则第一 Green 公式:

$$\int \int_{\Omega} u \Delta v dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} ds - \int \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV.$$

第二 Green 公式:

$$\int \int_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dV = \int_{\partial\Omega} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) ds.$$

(2). 三维 Laplace 方程的基本解为 $(M_0(x, y, z), M(\xi, \eta, \zeta))$

$$\Gamma(x, y, z; \xi, \eta, \zeta) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} = \frac{1}{4\pi \sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}},$$

二维 Laplace 方程的基本解为 $(M_0(x, y), M(\xi, \eta))$

$$\Gamma(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}}.$$

(3). Ω 是 \mathbb{R}^3 中的一个 (有界) 区域, 边界为 $\partial\Omega$, $M_0(x, y, z), M(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$, 称满足

$$\Delta_M G = \delta(M - M_0), M \in \Omega; G = 0, M \in \partial\Omega$$

的解 $G(M, M_0)$ 是三维 Laplace 方程第一边值条件的 Green 函数. 对于三维 Laplace 方程第一边值问题

$$\Delta u = f(M), M \in \Omega; u = \varphi(M), M \in \partial\Omega$$

的解可表示为

$$u(M_0) = \int \int_{\partial\Omega} \varphi(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS_M + \int \int \int_{\Omega} G(M, M_0) f(M) dV_M.$$

Ω 是 \mathbb{R}^3 中的一个 (有界) 区域, 边界为 $\partial\Omega$, $M_0(x, y, z), M(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$, 称满足

$$\Delta_M G = \delta(M - M_0), M \in \Omega; G = 0, M \in \partial\Omega$$

的解 $G(M, M_0)$ 是二维 Laplace 方程第一边值条件的 Green 函数. 对于二维 Laplace 方程第一边值问题

$$\Delta u = f(M), M \in \Omega; u = \varphi(M), M \in \partial\Omega$$

的解可表示为

$$u(M_0) = \int_{\partial\Omega} \varphi(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} ds_M + \int \int_{\Omega} G(M, M_0) f(M) dV_M.$$

§6.2 习题解答

习题 6.1 设 D 是以光滑曲线 L 为边界的二维的有界区域, 函数 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 以及它们所有的一阶偏导数在闭区域 $D + L$ 上连续, 在 D 内有二阶的连续偏导数. 试证明:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \int_L u \frac{\partial v}{\partial n} ds = \int \int_D u \Delta v d\sigma + \int \int_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma \\ (2) \quad & \int_L \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds = \int \int_D (u \Delta v - v \Delta u) d\sigma \\ (3) \quad & u(M_0) = \frac{1}{2\pi} \int_L \left[\ln \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n_M} - u(M) \frac{\partial}{\partial n_M} \left(\ln \frac{1}{r_{MM_0}} \right) \right] ds_M \\ & \quad - \frac{1}{2\pi} \int \int_D \ln \frac{1}{r_{MM_0}} \Delta u d\sigma_M \end{aligned}$$

解 首先讨论一下 Green 公式. 平面上有界区域 D , 边界闭曲线为 L , $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 是有连续偏导数的二元函数, 则 Green 公式是

$$\int \int_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) d\sigma = \int_L u(x, y) dx + v(x, y) dy \quad (6.1)$$

记 L 的单位切向量 (逆时针方向) 为 $\vec{T} = (\alpha, \beta)$, 单位外法向量 $\vec{n} = (\beta, -\alpha)$ (见图 1). 由 $dx = \alpha ds, dy = \beta ds$, 其中 ds 表示 L 的弧长元素,

$$\begin{aligned} \int \int_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) d\sigma &= \int_L (u(x, y) \alpha + v(x, y) \beta) ds \\ &= \int_{\partial\Omega} (v, -u) \cdot \vec{n} ds. \end{aligned}$$




图 1

特别, 若记 $\vec{w} = (v, -u)$, 则

$$\int \int_D \operatorname{div} \vec{w} d\sigma = \int_L \vec{w} \cdot \vec{n} ds. \quad (6.2)$$

下面我们利用公式 (6.2) 来求解习题 1。

(1). 取 $\vec{w} = u \operatorname{grad} v$ 代入公式 (6.2) 得

$$\int_D \operatorname{div}(u \operatorname{grad} v) d\sigma = \int_L u \operatorname{grad} v \cdot \vec{n} ds,$$

计算得

$$\int_L u \frac{\partial v}{\partial n} ds = \int \int_D u \Delta v d\sigma + \int \int_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma. \quad (6.3)$$

(2). 交换 (6.3) 中函数 u 与 v 的位置得

$$\int_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds = \int \int_D v \Delta u d\sigma + \int \int_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma. \quad (6.4)$$

上式与 (6.3) 式相减得

$$\int_L \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds = \int \int_D (u \Delta v - v \Delta u) d\sigma.$$

(3). 对于 $M_0(x, y) \in D$, 记 K_ϵ 为以 M_0 为中心, ϵ 为半径的圆盘。取

$$u(M) = u(\xi, \eta), \quad v = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}},$$

其中 $r_{M_0 M} = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$ 。由 (2) 中的结论得

$$\begin{aligned} & \int \int_{D-K_\epsilon} -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \Delta u d\sigma \\ &= \int_{L+\partial K_\epsilon} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial n} \right] ds. \end{aligned} \quad (6.5)$$

在 ∂K_ϵ 上有

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \right) = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \right) = \frac{1}{2\pi\epsilon},$$

所以有

$$\int_{\partial K_\epsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \right) ds = \frac{1}{2\pi\epsilon} \int_{\partial K_\epsilon} u ds = u(\bar{\xi}, \bar{\eta}),$$

其中 $(\bar{\xi}, \bar{\eta})$ 是 ∂K_ϵ 上的一个点, 令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 利用函数 u 的连续性得

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial K_\epsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \right) ds = u(M_0) \quad (6.6)$$

再由函数 u 在 D 内有二阶的连续偏导数得

$$\left| \int_{\partial K_\epsilon} \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial n} ds \right| \leq \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\epsilon} \left| \int_{\partial K_\epsilon} \frac{\partial u}{\partial n} ds \right| \leq \epsilon \ln \frac{1}{\epsilon} \max_D |grad u|$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial K_\epsilon} \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0 \quad (6.7)$$

由函数 u 在 D 内有二阶的连续偏导数得, 当 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时广义积分

$$\int \int_{D-K_\epsilon} -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \Delta u d\sigma$$

收敛, 即

$$\int \int_{D-K_\epsilon} -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \Delta u d\sigma = -\frac{1}{2\pi} \int \int_D \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \Delta u d\sigma. \quad (6.8)$$

在 (6.5) 中令 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 利用 (6.6), (6.7) 和 (6.8) 得

$$\begin{aligned} u(M_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_L \left[\ln \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n_M} - u(M) \frac{\partial}{\partial n_M} \left(\ln \frac{1}{r_{MM_0}} \right) \right] ds_M \\ &\quad - \frac{1}{2\pi} \int \int_D \ln \frac{1}{r_{MM_0}} \Delta u d\sigma_M. \end{aligned}$$

习题 6.2 试证明: 在二维的情况下调和函数的表达式为

$$u(M_0) = \frac{1}{2\pi} \int_L \left[\ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) \right] ds$$

其中 L 为一条封闭的光滑曲线, M_0 为 L 所围的区域中的任意一点。

解 在习题 1(3) 中取 u 为调和函数即得。

习题 6.3 在半平面 $y > 0$ 内求解 Laplace 方程 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$, 其边界条件为

$$u(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{当 } x < 0 \text{ 时} \\ u_0 & \text{当 } x \geq 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

解 考虑区域 $D \in \mathbb{R}^2$ 上的定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y) & (x, y) \in D \\ u|_L = \varphi(x, y) \end{cases}$$

取 Green 函数 $G(x, y; \xi, \eta)$ 为

$$G(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} + g(x, y; \xi, \eta)$$

其中 $g(x, y; \xi, \eta)$ 为定解问题

$$\begin{cases} \Delta g = f(x, y) & (\xi, \eta) \in D \\ g|_{(\xi, \eta) \in L} = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}|_{(\xi, \eta) \in L} \end{cases}$$

的解, 则

$$u(x, y) = - \int_L \varphi(\xi, \eta) \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} ds - \int \int_D G(x, y; \xi, \eta) f(\xi, \eta) d\sigma. \quad (6.9)$$

利用“镜像法”求二维上半平面的 Green 函数为

$$G(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \left[\ln \frac{1}{\sqrt{(\xi-x)^2 + (\eta-y)^2}} - \ln \frac{1}{\sqrt{(\xi-x)^2 + (\eta+y)^2}} \right]$$

在 (6.9) 中取 L 为 x 轴, $\varphi(\xi, \eta) = u(\xi, 0)$, $f(\xi, \eta) = 0$, 在 x 轴上有

$$\frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n}|_L = \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial \eta}|_{\eta=0} = -\frac{1}{\pi} \frac{y}{(\xi-x)^2 + y^2}.$$

因此,

$$\begin{aligned} u(x, y) &= - \int_L \varphi(\xi, \eta) \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} ds \\ &= \frac{u_0}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{y}{(\xi-x)^2 + y^2} d\xi \\ &= \frac{u_0}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan(x/y) \right]. \end{aligned}$$

习题 6.4 (1). 试作出上半圆域的 Green 函数;

(2). 试作出上半球域的 Green 函数。

解 (1). 利用“镜像法”来求解. 记圆域为 $B_R(O) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 上半圆域为 $B_R^+(O) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2, y > 0\}$. 设 $P(x, y), Q(\xi, \eta) \in B_R^+(O)$, $P(x, y)$ 关于 $y = 0$ 平面的对称点为 $P^-(x, -y)$, $P(x, y)$ 和 $P^-(x, -y)$ 关于圆域 $B_R(O)$ 的对称点分别为 P_* 和 P_*^- . 在 P 点放置一个单位正电荷, 在 P^- 点放置一个单位负电荷, 在 P_* 点放置 R/r_{OP} 单位负电荷, 在 P_*^- 点放置 R/r_{OP} 单位正电荷. 则

$$\begin{aligned} G(P, Q) &= \frac{1}{2\pi} \left[\ln \frac{1}{r_{PQ}} - \ln \left(\frac{R}{r_{OP}} \frac{1}{r_{P_*Q}} \right) \right] \\ &\quad - \frac{1}{2\pi} \left[\ln \frac{1}{r_{P^-Q}} - \ln \left(\frac{R}{r_{OP}} \frac{1}{r_{P_*^-Q}} \right) \right]. \end{aligned}$$

(2). 利用“镜像法”来求解. 记球域为 $B_R(O) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$, 上半圆域为 $B_R^+(O) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2, z > 0\}$. 设 $P(x, y, z), Q(\xi, \eta, \zeta) \in B_R^+(O)$, $P(x, y, z)$ 关于 $z = 0$ 平面的对称点为 $P^-(x, y, -z)$, $P(x, y, z)$ 和 $P^-(x, y, -z)$ 关于圆域 $B_R(O)$ 的对称点分别为 P_* 和 P_*^- . 在 P 点放置一个单位正电荷, 在 P^- 点放置一个单位负电荷, 在 P_* 点放置 R/r_{OP} 个单位负电荷, 在 P_*^- 点放置 R/r_{OP} 个单位正电荷. 则

$$G(P, Q) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{PQ}} - \frac{R}{r_{OP}} \frac{1}{r_{P_*Q}} \right) - \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{P^-Q}} - \frac{R}{r_{OP}} \frac{1}{r_{P_*^-Q}} \right).$$

习题 6.5 求证圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 的 Green 函数为

$$G(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \left[\ln \frac{1}{r_{PQ}} - \ln \frac{R}{r} \frac{1}{r_{P_*Q}} \right],$$

其中 P_* 是 P 关于圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 的反演点, 并由此推出圆内第一边值问题的解表达式.

解 利用“镜像法”来求圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 的 Green 函数. 记圆域为 $B_R(O) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 设 $P(x, y) \in B_R^+(O)$, $P(x, y)$ 关于圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 的反演点为 P_* . 在 P 点放置一个单位正电荷, 在 P_* 点放置 R/r_{OP} 个单位负电荷. 则

$$G(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{r_{PQ}} - \ln \frac{R}{r_{OP}} \frac{1}{r_{P_*Q}} \right).$$

圆域内第一边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = f_1(x, y), & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ u = \varphi_1(x, y), & x^2 + y^2 = R^2 \end{cases}$$

解的表达式为

$$u(x, y) = - \int_{x^2+y^2=R^2} \varphi_1(\xi, \eta) \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} ds - \int_{x^2+y^2 \leq R^2} f_1(\xi, \eta) G(x, y; \xi, \eta) d\sigma.$$

引进极坐标

$$\xi = r \cos \alpha, \eta = r \sin \alpha; x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta,$$

记

$$f_1(\xi, \eta) = f(r, \alpha), \varphi_1(x, y)|_{x^2+y^2=R^2} = \varphi(\alpha),$$

则各点的坐标为 $P(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$, $Q(r \cos \alpha, r \sin \alpha)$, 以及 $P_*(R^2/\rho \cos \theta, R^2/\rho \sin \theta)$. 直接计算得

$$G(x, y; \xi, \eta) = -\frac{1}{4\pi} \ln \frac{R^4 + \rho^2 r^2 - 2r\rho R^2 \cos(\theta - \alpha)}{R^2(r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha))},$$

$$\frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} \Big|_{r=R} = \frac{\partial}{\partial r} G(x, y; \xi, \eta) \Big|_{r=R} = -\frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - \rho^2}{R(R^2 + \rho^2 - 2\rho \cos(\theta - \alpha))}.$$

因此,

$$\begin{aligned}
 u(x, y) &= - \int_{x^2+y^2=R^2} \varphi_1(\xi, \eta) \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} ds - \int \int_{x^2+y^2 \leq R^2} f_1(\xi, \eta) G(x, y; \xi, \eta) d\sigma \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^R dr \int_0^{2\pi} \ln \frac{R^4 + \rho^2 r^2 - 2r\rho R^2 \cos(\theta - \alpha)}{R^2(r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha))} r f(r, \alpha) d\alpha \\
 &\quad + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - \rho^2}{R^2 + \rho^2 - 2\rho \cos(\theta - \alpha)} d\alpha.
 \end{aligned}$$