

Entrega Final 1er Corte

Punto 1

A. Sea $Z = 3 - 4i$, $W = 6i$, $P = 3 + 2i$

a. Calcule $(2z + w) * p$

a. $(6 - 8i + 6i)(3 + 2i)$

b. $(6 - 2i)(3 + 2i)$

c. $(18 + 12i - 6i + 4)$

Tue 29 Mar 2022 20:51:38 GMT
d. RTA: $(22 - 6i)$

b. Calcule $\frac{P}{Z} - W$
Ms. Jane,

$$\frac{3 + 2i}{3 - 4i} - 6i = \left(\frac{3 + 2i}{3 - 4i} \cdot \frac{3 + 4i}{3 + 4i} \right) - 6i$$

$$\frac{9 + 12i + 6i - 8}{9 + 16} = \frac{1 + 18i}{25}$$

$$\left(\frac{1}{25} + \frac{18}{25}i \right) - 6i = \frac{1}{25} + \frac{132}{25}i$$

B. Escriba en forma polar y en forma Euler los siguientes complejos:

1. $Z = -3 + 5i$

John Doe
Sr. Vice President Engineering
LogRocket
Polar
 $|Z| = \sqrt{34}$

$$\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{5}{3}\right) + \pi = 2.1112$$

RTA: $\sqrt{34} \cdot CIS(2.1112)$

♦ Euler

$$Z = \sqrt{34} \cdot e^{2.112 i}$$

2. $Z = -2 + -i$

♦ Polar:

$$|Z| = \sqrt{5}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \pi = 3.605$$

RTA: $\sqrt{5} \cdot CIS(3.605)$

♦ Euler

$$Z = \sqrt{5} \cdot e^{3.605 i}$$

3. $Z = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

♦ Polar:

$$|Z| = \sqrt{1 + \frac{1}{3}}$$

$$|Z| = \sqrt{\frac{4}{3}}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right) + 2\pi = 5.76$$

RTA: $\sqrt{\frac{4}{3}} \cdot CIS(5.76)$

♦ Euler

$$\sqrt{\frac{4}{3}} \cdot e^{5.76 i}$$


C. Encuentre la imagen de la lineal indicada bajo la transformación $f(z) = z^2$ (realice un bosquejo de la grafica), donde



En este caso, para todos los ejercicios, la transformación es: $Z^2 = U : (x^2 - y^2) V : (2xyi)$


1. $X = 0$

Antes de la transformación




Después de la transformación:

$$U = -V^2$$



2. $X = 4$

Antes de la transformación:




Después de la transformación:

$$U = 16 - Y^2$$

$$V = -8Yi$$


$$Y = \frac{V}{-8}$$

$$U = 16 - \frac{V^2}{64}$$



3. $y = -1$

Antes de la transformacion:




$$U = x^2 - 1$$

$$V = 2x$$

$$\frac{V}{2} = X$$

$$U = \left(\frac{V^2}{4}\right) - 1$$



Punto 2

Para las siguientes funciones, escriba cada $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ y Determine si $f(z)$ es o no, analítica

1. $f(z) = ez + z$

♦ Forma $U + iV$

$$\begin{aligned}
 e^z + z &= e^{x+iy} + (x + iy) \\
 &= e^x \cdot \cos(y) + i \operatorname{Sen}(y) + (x + iy) \\
 &= (e^x \cdot \cos(y) + x) + i(e^x \cdot \operatorname{Sen}(y) + y) \\
 U &= e^x \cdot \cos(y) + x \\
 V &= i(e^x \cdot \operatorname{Sen}(y) + y)
 \end{aligned}$$

♦ Analiticidad

$$\frac{\partial U}{\partial x} = (e^x \cos(y) + 1) = \frac{\partial V}{\partial x} = (e^x \cos(y) + 1) \quad \checkmark$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -e^x \text{Sen}(y) = -\frac{\partial V}{\partial x} = e^x \text{Sen}(y) \checkmark$$

La función es analítica

2. $f(z) = z + \bar{z}$



Uso de la propiedad $Z + \bar{Z} = 2\text{Re}(z)$

- ♦ Forma $U + iV$

$$U = 2X$$

- ♦ Analiticidad

No es analítica, debido a que la ecuación no tiene una parte imaginaria (V)

3. $f(z) = z^2 + i$

- ♦ Forma $U + iV$

$$(x + iy)^2 + i = x^2 + 2xyi - y^2 + i$$

$$U = X^2 - Y^2$$

$$V = 2xyi + i$$

- ♦ Analiticidad

$$\frac{\partial U}{\partial x} 2x = \frac{\partial V}{\partial y} = 2x \checkmark$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} - 2y = -\frac{\partial V}{\partial y} = 2y \checkmark$$

La función es analítica

Punto 3

Evalúe el limite que se indica

1. $\lim_{Z \rightarrow (6-8i)} \frac{Z^3 - Z^2(6+i) + Z(30+30i) + (252-136i)}{Z^3 - Z^2(16-16i) + Z(8-164i) + 216 + 312i}$

$$\begin{cases} (6-8i)^3 &= 216 - 864i - 1125 - 512 = -936 + 352i \\ (6-8i)^2 &= -28 - 96i \end{cases}$$

$$\lim_{Z \rightarrow (6-8i)} \frac{(-936 + 352i) - (-28 - 96i)(6+i) + (6-8i)(30+30i) + (252-136i)}{(-936 + 352i) - (-28 - 96i)(16-16i) + (6-8i)(8-164i) + 216 + 312i}$$

$$\frac{(-936 + 352i) - (-264 - 548i) + (150 - 150i) + 252 - 136i}{(-936 + 352i) - (-1088 - 1088i) + (-1264 - 1012i) + 216 + 312i} \quad (1)$$

$$\frac{-270 + 614i}{-896 + 740i} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{-270 + 614i}{-896 + 740i} &= \frac{-270 + 614i}{-896 + 740i} \cdot \frac{-896 - 740i}{-896 - 740i} \\ &= \frac{696280 - 350344i}{1360416} = \frac{696280}{1360416} + \frac{350344i}{1360416} \quad (3) \end{aligned}$$

$$R = 0.512 + 0.258i$$

2. $\lim_{Z \rightarrow (1-i)} \frac{5Z^2 - 2Z + 2}{z+1}$

$$\lim_{Z \rightarrow (1-i)} \frac{5Z^2 - 2Z + 2}{z+1}$$

$$\frac{5Z^2 - 2Z + 2}{z+1} = \frac{-10i - (2 - 2i) + 2}{2 - i} = \frac{8i}{2 - i}$$

$$\frac{8i}{2 - i} \cdot \frac{2 + i}{2 + i} = \frac{16i - 8}{5} = R = \frac{-8}{5} + \frac{16}{5}i$$

Punto 4

Para los siguientes valores de z , exprese a $\text{Ln } z$ en la forma $a + bi$

1. $\sqrt{2} + \sqrt{16}i$

$$|Z| = \sqrt{8}$$

$$\theta^\circ = \tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{6}{2}}\right) = 60^\circ$$

$$Rta = \text{Ln}(\sqrt{8}) + (60^\circ + 2n \cdot 180^\circ)$$

2. $-\sqrt{3} + i$

$$|Z| = 2$$

$$\theta^\circ = \tan^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + 180^\circ = 150^\circ$$

$$Rta = \text{Ln}(2) + (150^\circ + 2n \cdot 180^\circ)$$

3. $-2 + 2i$

$$|Z| = \sqrt{8}$$

$$\theta^\circ = \tan^{-1}(-1) + 180^\circ = 135^\circ$$

$$Rta = \text{Ln}(\sqrt{8}) + (135^\circ + 2n \cdot 180^\circ)$$

Exprese la cantidad indicada de la forma $a + bi$

1. $Sec = \left(\frac{1}{\cos(\pi+i)}\right)$

$$\begin{aligned} Sec &= \left(\frac{1}{\cos(\pi+i)}\right) = \frac{1}{e^{\pi i-1} + e^{-\pi i+1}} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2e^{\pi i-1} + 2e^{-\pi i+1}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{e^{-1}\cos(\pi) + i\text{Sen}(\pi) + e^1\cos(\pi) - i\text{Sen}(\pi)} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{e^{-1}\cos(\pi) + e^1\cos(\pi)} = \frac{1}{-e^{-1} - e^1} \\ Rta &= \frac{1}{-3.08616127 + 0i} \end{aligned}$$

2. $Senh(1 + \frac{\pi}{3}i)$

$$\begin{aligned} \frac{e^z - e^{-z}}{2} &\rightarrow \frac{e^{1+\frac{\pi}{3}i} - e^{-1-\frac{\pi}{3}i}}{2} \\ \frac{e^1\cos(\frac{\pi}{3}) + i\text{Sen}(\frac{\pi}{3}) - e^{-1}\cos(\frac{\pi}{3}) - i\text{Sen}(\frac{\pi}{3})}{2} &= \dots \\ \dots &= \frac{\cos(\frac{\pi}{3})(e^1 - e^{-1}) + i\text{Sen}(\frac{\pi}{3})(e^1 - e^{-1})}{2} = \dots \\ \dots &= \frac{\cos(\frac{\pi}{3})(e^1 - e^{-1})}{2} + \frac{i\text{Sen}(\frac{\pi}{3})(e^1 - e^{-1})}{2} \\ \dots Rta &= 0.587601 + 1.01776i \end{aligned}$$

3. $Cos(2 - 4i)$

$$\begin{aligned} \frac{e^{i(2-4i)} + e^{-i(2-4i)}}{2} &= \frac{e^{4+2i} + e^{-4-2i}}{2} = \dots \\ \dots &= \frac{e^4\cos(2) + i\text{Sen}(2) + e^{-4}\cos(-2) - i\text{Sen}(-2)}{2} = \dots \\ \dots &= \frac{\cos(2)(e^4 - e^{-4})}{2} + \frac{i\text{Sen}(2)(e^4 - e^{-4})}{2} = Rta = -11.3642 + 24.8146i \end{aligned}$$

Punto 5

Determine una serie de Furier para la función

1. Primer caso

$$f(x) \begin{cases} x-1, & -\pi < x < 0 \\ x+1, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

Desarrollo:

a. a_0

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x-1) dx + \int_0^{\pi} (x+1) dx \right] = \dots \\ \dots &= \frac{1}{\pi} \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_{-\pi}^0 + \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{1}{\pi} \left[-2\pi^2 \right] = \text{Rta} = -2\pi \end{aligned}$$

b. a_n

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x-1) \cdot \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} (x+1) \cdot \cos(nx) dx \right] = \dots \\ \dots &= \left[\frac{1}{n} \sin(nx) (x-1) - \int \frac{1}{n} \sin(nx) dx \right]_{-\pi}^0 = \dots \\ \dots &= \left[\frac{1}{n} \sin(nx) (x-1) + \frac{1}{n^2} \cos(nx) \right]_{-\pi}^0 = \dots \\ \dots &= \left[\frac{1}{n^2} - (-1)^n \frac{1}{n^2} + \int_0^{\pi} (x+1) \cdot \cos(nx) dx \right] = \dots \\ \dots &= \left[\frac{1}{n} \left(\sin(nx) (x+1) - n \cdot \int \frac{1}{n} \sin(nx) dx \right) \right]_0^{\pi} = \dots \\ \dots &= \left[\frac{1}{n} \left(\sin(nx) (x+1) - n \left(-\frac{1}{n^2} \cos(nx) \right) \right) \right]_0^{\pi} = \dots \\ \dots &= \left[\frac{1}{n} \left(\sin(nx) (x+1) + \frac{1}{n} \cos(nx) \right) \right]_0^{\pi} = \dots \\ a_n &= \left[\frac{1}{n^2} - (-1)^n \frac{1}{n^2} + \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \right] = \frac{0}{n^2 \pi} = 0 \end{aligned}$$

c. b_n

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x-1) \cdot \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} (x+1) \cdot \sin(nx) dx \right] = \dots$$

$$\begin{aligned}
\ldots &= \left[-\frac{(x-1) \cdot \cos(nx)}{n} + \frac{1}{n} \int \cos(nx) \cdot dx \right] = \ldots \\
\ldots &= \left[-\frac{(x-1) \cdot \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_{-\pi}^0 = \ldots \\
\ldots &= \frac{1}{n} - \left[-\frac{(-\pi-1)(-1)^n}{n} \right] = \frac{\pi(-1)^n}{n} \\
\ldots &= \left[-\frac{(x+1) \cdot \cos(nx)}{n} + \frac{1}{n} \int \cos(nx) \cdot dx \right] = \ldots \\
\ldots &= \left[-\frac{(x+1) \cdot \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} = \ldots \\
\ldots &= \left[-\frac{\pi+1(-1)^n}{n} - \frac{(-1)}{n} \right] = \frac{-\pi(-1)^n}{n} \\
\ldots b_n &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\pi(-1)^n}{n} + \frac{\pi(-1)^n}{n} \right] = 0
\end{aligned}$$



Formula general del primer caso

Para pares e impares

$$f(x) = -2\pi \sum_{n=1}^{+\infty} [0 + 0] = -2\pi$$

2. Seguzazando caso

$$f(x) \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 2-x & 1 < x < 2 \end{cases}$$

a. a_0

$$\frac{1}{2} \left[\int_0^1 dx + \int_1^2 2-x dx \right] = \frac{1}{2} \left[x \Big|_0^1 + 2x - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 \right] = \frac{1}{4}$$

b. a_n

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \left[\int_0^1 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx + \int_1^2 (2-x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \right] = \dots \\
& \frac{1}{2} \left[\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_0^1 + \left[\frac{2(2-x)}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) + \frac{2}{n\pi} \int \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \right] \right] \\
& \dots + \left[\frac{2(2-x)}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) - \frac{4}{n^2\pi^2} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right] = \dots \\
& = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi} \left[-(2-x) \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) + \frac{2\cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)}{n\pi} \right] \Big|_1^2 \right] \\
& = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_0^1 - \frac{4}{n^2\pi^2} \left[(-1)^n - \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \frac{2\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi} \right] \right] \\
& = \frac{1}{2} \left[\frac{2\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi} - \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} + \frac{4\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2\pi^2} + \frac{8\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^3\pi^3} \right] = \dots \\
a_n = & \begin{cases} \text{Pares,} & \frac{1}{2} \left[-\frac{4}{n^2\pi^2} + \frac{8(-1)^n}{n^3\pi^3} \right] \rightarrow -\frac{4}{n^2\pi^2} \left[1 - \frac{2(-1)^n}{n\pi} \right] \\ \text{Impares,} & \frac{1}{2} \left[\frac{2(-1)^n}{n\pi} + \frac{4}{n^2\pi^2} + \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} \right] \rightarrow \frac{1}{n\pi} \left[(-1)^n + \frac{4+4(-1)^n}{n\pi} \right] \end{cases}
\end{aligned}$$

c. b_n

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{2} \left[\int_0^1 \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx + \int_1^2 (2-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \right] \\
b_n &= \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_0^1 + \int_1^2 (2-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \right] = \dots \\
b_n &= \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{n\pi} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + 1 \right) + \int_1^2 (2-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \right] = \dots \\
&= \dots + \left[-(2-x) \frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) + \frac{4}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_1^2 \right] = \dots \\
&= \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{n\pi} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + 1 \right) + \frac{2\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi} - \frac{4\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2\pi^2} \right] = \dots \\
&= \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{n\pi} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + 1 \right) + \frac{2\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi} - \frac{4\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2\pi^2} \right] = \\
&\dots = -\frac{1}{n\pi} \left[1 + \frac{2\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi} \right]
\end{aligned}$$

$$b_n = \begin{cases} Pares, & -\frac{1}{n\pi} \\ Impares, & -\frac{1}{n\pi} \left[1 + \frac{2(-1)^n}{n\pi} \right] \end{cases}$$



Formula general de Fourier para el segundo caso

$$\begin{cases} Pares, & \frac{1}{8} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[-\frac{4\cos(\frac{n\pi}{2})}{n^2\pi^2} \left[1 - \frac{2(-1)^n}{n\pi} \right] - \frac{\sin(\frac{n\pi}{2})}{n\pi} \right] \\ Imprar, & \frac{1}{8} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{\cos(\frac{n\pi}{2})}{n\pi} \left[(-1)^n + \frac{4+4(-1)^n}{n\pi} \right] - \frac{\sin(\frac{n\pi}{2})}{n\pi} \left[1 + \frac{2(-1)^n}{n\pi} \right] \right] \end{cases}$$