

免疫组化步骤:

1. 切片常规脱蜡水化: 62℃烤片 40min; 二甲苯脱蜡二次, 每次 5min; 再一次浸入梯度醇(无水乙醇-无水乙醇-95%-85%-75%乙醇)和蒸馏水中各 5min 水化。
石蜡切片的热修复:
修复液的配置: 0.01M 枸橼酸盐缓冲液 (PH0=0.6), 即 3g 枸橼酸三钠, 0.4g 枸橼酸, 1000ml 蒸馏水。
热修复: 将枸橼酸盐缓冲液置于微波炉中高热 10min 加热至沸腾, 再将切片置于缓冲液中, 中火 5min 两次。取出后, PBS 洗涤 3min, 3 次, 慢摇床。
2. 滴加适量 solutionA 白色溶液, 即内源性过氧化物酶封闭液室温封闭 10min, 多余液体吸收重利用。PBS 洗涤 3min, 3 次, 慢摇床。
3. 滴加适量 solutionB 白色溶液, 及封闭用正常羊血清工作液, 室温孵育 10min, 多余液体吸收重利用。PBS 洗涤 3min, 3 次, 慢摇床。
4. 滴加适量一抗工作液(按商品要求适当比例稀释, 每块切片滴加约 50ml), 过夜, 多余液体吸收重利用。PBS 洗涤 3min, 3 次, 慢摇床。
5. 滴加适量 solutionC 黄色溶液, 即生物素标记羊抗兔/鼠二抗工作液, 37℃孵育 15min, 多余液体吸收重利用。PBS 洗涤 3min, 3 次, 慢摇床。
6. 滴加适量 solutionD 红色溶液, 即 HRP 标记的链霉亲和素, 室温 10min, 多余液体吸收重利用。PBS 洗涤 3min, 3 次, 慢摇床。
7. DAB 显色液配置: 根据需求量, 将 DAB-A, DAB-B 以 1:19 的体积比混匀后即成为 DAB 显色工作液。
8. 显色: 将适量的 DAB 显色液置于组织切片上(约每块 50ml), 等待 1-5min, 观察显色效果, 以到达最佳显色效果, 自来水冲洗终止显色。
9. 苏木素复染, 约 5s, 自来水冲洗终止显色。
10. 脱水透明: 置于 75%乙醇-85%乙醇-95%乙醇-无水乙醇-无水乙醇-二甲苯 II-二甲苯 I, 每次 5min。
11. 封片
12. 风干后, 电子扫描仪观察。