

细胞传代

1、实验试剂：培养基、PBS、终止液、trypsin

2、实验材料：培养皿、离心管、移液枪、废液缸、75%酒精、5 ml 离心管

3、实验仪器：显微镜、超净台、CO₂培养箱、离心机、吸液泵、37℃恒温水浴箱

4、操作步骤：

1、从培养箱拿出细胞，在显微镜下，观察细胞状态及密度，并判断其是否达到可传代的要求；

2、将细胞拿至超净台中，吸去培养基，加1-2 ml PBS，轻微摇动培养基润洗细胞，吸去PBS；

3、向细胞培养皿中加入1 ml左右trypsin，轻微摇动使trypsin浸润所有细胞；

4、放入37℃培养箱中，开始消化并倒计时，不同细胞消化时间不同，hela细胞消化时间一般为2min；

5、消化过后细胞用2 ml左右终止液终止，通过反复吹打使细胞脱离培养皿底部；

6、收集细胞悬液于5ml离心管中，放入离心机，室温下800 rmp, 离心5 min, 离心完全后弃上清液；

7、在离心管中加入培养基，反复吹打使细胞混匀，将细胞接种到新培养基中，摇晃混匀；

8、放入37℃培养箱。

5、注意事项：

1、在实验开始前和结束后，应将超净台紫外照射灭菌，戴好灭菌手套及口罩。

2、使用超净台前应用75%酒精棉球擦拭超净台，若有物品进入超净台应喷75%酒精消毒，并同样用75%酒精消毒双手。

3、实验所用试剂应放入冰箱中保存，待实验开始前用袋子装好试剂放入水浴锅温热30 min左右，取出使用时应用75%酒精棉球擦拭盖口以免污染。

4、实验过程中，双手及衣袖不可在培养皿及装有试剂的试管上方掠过，培

养皿与装有试剂的试管在开盖使用后应及时盖上盖子，以免细菌掉落污染培养皿及试剂。

5、使用trypsin消化细胞要把握好时间，切勿消化过度，及时终止消化。

6、弃上清液的动作需一次完成，切忌抬起管口，让液体流回底部后，又一次倾倒。

7、养成在培养皿上做标记的习惯，注明传代时间，细胞种类，操作者名称。