VERY TV STORY UNDERGROUND MAGAZINE
Vol.1
Minpaku

KIRARA

E3 2014 ピックアップ

5

一同、時越時空吧…！

六億年的博物旅行

みなぱか 泉賢太郎

表紙カバー 制作エッチング まめ猫

第1回 特殊のハントラ 日代くりぼっち 竹田竹かし イールドコハマランオアフー 日BDい

第2回 ハンドメイド マウンテンクイン アーティスト 日方国 [illegible] はなれ

是有打工吗？

是的

是水族馆来拜托我们的呢

说是让我们帮忙捕获一些触摸池的鱼

要去的时代是泥盆纪大家感兴趣吗？

工作还算是挺划算的哦

6億年の博物旅

みなぱか
監修：泉 賢太郎
翻译：院长
校对：千叶和菓子
嵌字：柯蓝
监修：千叶和菓子
尾页文案：院长
尾页制作：柯蓝

泥盆纪就是所谓的「鱼类的时代」没错吧？

请务必让我参加！

3亿6700万年前—
泥盆纪后期

扑通…

如此这般

泥盆纪

クラ…

我们来了！

感觉这里既幽静又神秘呢

明莉很兴奋啊

其实我一直都很想来泥盆纪看看呢

这样吗？

因为这里有最古老的森林有最古老的陆地生物在地面上爬行生长嘛

感觉地球突然间变得热闹起来了呢～

那孩子是那种下了雪就一定要去踩个脚印的类型呢

好——耶

更像是会一头扎进雪里把自己整个人都印上去的类型呢

穿上涉水裤
大概是这个样子？

半奈
好适合你！

半奈是
第一次穿呢

那我来教你
捕获的方法吧

看好了





※译注：咔沙咔沙（ガサガサ）使用渔网等在水中制造很大的动静来使小鱼小虾受惊而逃出，趁此机会一网打尽。

那么

我也开始吧




是含肺鱼的幼鱼


カシャ

拍张照片吧…


扑通…
扑通…


チャポ

一小时过后—
还真不愧是「鱼类的时代」呢

只在一个地方就把肉鳍鱼、盾皮鱼、棘鱼、
辐鳍鱼、软骨鱼、还有无颌鱼全都捕齐了呢
太棒了……！

既能拿到钱
又能来体验采集

浮现

感谢您
栗山学姐…

喂—
伊野知—

欸？
半奈
怎么了吗？

哎呀
我腰有点疼了

疼疼疼…

啊哈哈
采集过程中
常有的事呢

来稍微
歇会儿吧

明莉呢？

刚才跑去追
什么东西了…

你们两个快看！

我抓到了一条
好大的沟鳞鱼

哦哦
真不错

有点
猎奇呢……

你们看
这脸～

不觉得
有点可爱嘛～

大家要不要
尝尝它的味道？

欸

…明莉虽然
十分喜欢动物
但在这方面真是
一视同仁呢

一码归一码嘛～

你就不好奇
盾皮鱼纲的味道吗？

盯——

不是

就算你们这么看着我

真是的

呱

那就交给你俩了

太好啦——

那接下来的任务就是

耶——钓鱼咯——

准备晚饭了呢

我说

你们在侏罗纪的时候也是这样的吗？

这样是指？

就是钓鱼来吃之类的

没有哦

我们有好好地带着干粮

不过鱼还是实地去准备才更有意思！

对了对了
之前钓到了雀鳝呢~

半奈有听说过吗？

雀鳝这鱼用刀完全切不动哦

是因为有什么来着

好像是有Cosine那样子的东西吧…？

你是想说Ganoine鳞吧

※Ganoine鳞：又名硬鳞。通常欠缺柔软性，十分坚硬。

所以最后做成整条的烤鱼了

味道很不错哦~

烤整条雀鳝

※由于雀鳝的卵有毒要记得把它和内脏一起清除干净哦！

嘿嘿听起来很开心呢

有点羡慕啊

说什么呢
半奈

扑腾
今天不也很开心嘛

啊
上钩啦
半奈
欸
骗人的吧!?
紧
收
紧
原来是
你啊
而且钩子
都没挂在嘴上…
计胜
嗯嗯
这个尺寸的话
看起来还有点可爱
喷喷
喷喷



つづく

次号6月号は
4月24日発売!!

泥盆纪

泥盆纪(英语:Devonian,符号D)是地球地质历史中显生宙古生代中的第四个纪,开始于4.19亿年前(同位素年龄419.2 Ma),结束于3.59亿年前(358.9 Ma),上承志留纪,下启石炭纪。因为泥盆纪是水生脊椎动物——特别是各种有颌鱼类——开始繁荣并压倒泛节肢动物和软体动物占据水域环境中优势生态位的时期,因此也被古生物学家称为鱼类时代。

从古地理学的角度上来看,泥盆纪的地理环境主要由南方的冈瓦那大陆与北方的西伯利亚大陆两个超大陆组成,之间则有古特提斯洋与刚形成的欧美大陆。此期间的全球气候温暖干燥,极地与赤道的温差小于今天。

泥盆纪在英语中的名称“Devonian”来自于该时期地层被最早研究的英国德文郡,其他语言的称呼与英文大同小异。中文名称源自旧时日本人使用汉字音读的音译名“泥盆紀”(音读:デーボンき,罗马字:dēbonki)。



古蕨(古羊齿)

古蕨属(学名:Archaeopteris),又名古羊齿属,是一属已灭绝的树状植物,具有蕨类型的叶片。生存于晚泥盆纪至早石炭纪。其化石分布于全世界,是有用的指相化石。古蕨属的发现,加强了真蕨纲和裸子植物之间在系统发育上的联系,它们可能在之后演化成最早的裸子植物。古蕨的学名"Archaeopteris"是来自于古希腊文ἀρχαῖος(archa ī os,意指“古代”),以及另一希腊字πτέρις(pt é ris,意指“蕨类”)。古蕨结合了木本树木和草本蕨类的特征,具有类似裸子植物的木质树干,却利用孢子繁殖,而非种子。它们的植株外观看似一颗头重脚轻的圣诞树,能长到大约30米的高度,某些物种的树干直径超过1.5米。树冠由大片的二回羽状复叶组成,在一个平面上排列著羽片状的小叶,孢子囊着生在小叶的轴上,孢子异型。

咔沙咔沙(ガサガサ)

一种捕鱼方法,大致操作方式如漫画中所示,使用渔网等在水中制造很大的动静来使小鱼小虾受惊而逃出,趁此机会一网打尽。由于工具等因素限制,这种方式的规模通常很小,娱乐、科研等目的捕获一些小型鱼虾类时才会使用这种方式,生产性质的捕捞则很难采取这种方式。



含肺鱼

又名海纳鱼属(学名:学名:Hyneria)也称海肺鱼属,是一种史前的掠食性鱼类,生存于3亿6000万年前的泥盆纪法门阶。它们体长约2.5—3.7米(8.2—12.1英尺)并重达2吨,是目前发现第二大的肉鳍鱼,仅次于根齿鱼属。其骨骼显示它们的鳍很强壮,有可能可以走到陆地上。

海纳鱼的化石是于1968年在美国宾夕法尼亚州发现,包括了牙齿、骨骼及尾鳍。自此以后就发现了更多的标本,但却未有完整的骨骼。含肺鱼是一种肉鳍鱼,属于三列鳍鱼科,与新翼鱼一样于泥盆纪都非常普遍。

肉鳍鱼



肉鳍鱼(英语:lobe-finned fish)是肉鳍鱼总纲(学名:Sarcopterygii)下所有脊椎动物的统称,是硬骨鱼类的一个重要演化支,与辐鳍鱼互为姐妹群。肉鳍鱼的特点是鳍的主体是一个内有多关节内骨骼(附肢骨骼)和骨骼肌的附肢(而不像辐鳍鱼那样是仅有皮肤覆盖棘骨的折扇形鳍),在胸鳍和腹鳍的基部有胛骨和强劲的肌肉与肋骨相连,和之后四足动物的四肢同源。

肉鳍鱼总纲下包括基群的腔棘鱼纲(现仅存矛尾鱼属一支共两个物种)和冠群的肺鱼四足纲,而所有陆地脊椎动物都演化自肺鱼四足纲中的四足形类。

肉鳍鱼最早出现在距今4.23亿年前的志留纪晚期,在石炭纪和二叠纪时期兴盛并成为淡水生态系统的顶级物种,但在二叠纪末大灭绝中受到重创,大部分于距今6500万年前的晚白垩纪绝种。其中的腔棘鱼曾被认为完全灭绝,直到1938年才在非洲东南的印度洋深海捕捉到现生的活体,之后并在印度等地区多次被发现而证实仍然存活于深海中,目前仅存一目二种,即矛尾鱼,被认为是鱼类中的活化石。分子遗传学表明,包括人类在内的陆生脊椎动物(四足动物)都属于这一演化支,依据化石研究推测,有可能是在大约 3.6 亿年前从肉鳍鱼类中的类似蝶柱鱼的祖先演化而来。



辐鳍鱼纲

辐鳍鱼纲(学名:Actinopteri),台湾作条鳍鱼纲,是脊索动物门、辐鳍鱼总纲下的一纲,包含所有亲缘关系与新鳍亚纲较近而与多鳍鱼目较远的辐鳍鱼。在不同的分类系统中,其分类层级也被设定为亚纲或下纲等。

盾皮鱼



盾皮鱼纲(学名:Placodermi)是一类已经灭绝的史前鱼类,出现于4.39亿年前的古生代志留纪早期,在泥盆纪成为水域生态系统的优势物种,共繁衍了近7000万年,最终于3.59亿年前的泥盆纪晚期灭绝事件中全部绝灭。盾皮鱼类是最早占据顶级生态位的脊椎动物,因头部和胸部覆盖骨甲故得名。盾皮鱼类也是最原始的有颌鱼类,其颌骨是由嘴部后方的第一对鳃弓演化而来的。

2005年8月,约翰·A·朗(John A. Long)及其野外考察队对戈戈(Gogo)站高地草地的考察中,发现带有矿化脐带及胚胎的盾皮鱼化石,这个发现颠覆了以往对繁殖和体内受精起源的认识。

最早的可确认的盾皮鱼生活在晚期志留纪。盾皮鱼在泥盆纪末全部灭绝。最早一批志留纪盾皮鱼化石发现于中国,主要是节颈鱼目和胴甲鱼目。显然盾皮鱼起源分化于泥盆纪以前,可能在志留纪早期或中期,尽管更早的盾皮鱼化石还没有被发现。志留纪的盾皮鱼化石往往是一些骨甲碎片,有些种的分类命名也十分不可靠。

有些古生物学家认为志留纪盾皮鱼的生活环境可能不利于化石保存,并不是真的很少。这个假说也解释了在泥盆纪早期大量盾皮鱼的出现。

与志留纪形成反差的是,在泥盆纪,盾皮鱼在各种水生生态系统中占优势,包括海水和淡水。尽管如此,盾皮鱼在泥盆纪末全部灭绝,没有一个种存活到石炭纪。



棘鱼

棘鱼纲(学名:Acanthodii)是一类早已绝灭、仅存在于古生代的有颌鱼类。有颌鱼类在漫长的历史演化中形成了两大主支一真口鱼类和板鳃类。过去,鱼类学家认为,棘鱼类和硬骨鱼类共同组成了真口鱼类,它们有着共同的祖先,在真口鱼类中代表了两条独立的进化路线,然而,近年的研究发现棘鱼纲更接近传统定义上的软骨鱼纲,属于软骨鱼干群,为并系群。来自贵州石阡大约4.39亿年前的新塑梵净山鱼(Fanjingshania renovata)是迄今最古老的具有关联身体构造的棘鱼属种,指示软骨鱼类干群在志留纪兰多维列世就已经演化出典型的栅棘鱼形态。同层位的双列黔齿鱼(Qianodus duplicis)也隶属软骨鱼干群,保存了最古老的牙齿。来自中国重庆秀山大约4.36亿年前的蠕纹沈氏棘鱼(Shenacanthus vermiformis)是迄今所知最早的保存完好的软骨鱼,确证了鲨鱼是从"披盔戴甲"的祖先演化而来。

软骨鱼



软骨鱼纲(学名:Chondrichthyes)是现存有颌类脊椎动物中最基干的类群,除了牙齿为硬骨外,内骨骼全部由软骨组成,因而得名。软骨鱼不具有鳔,体外无鳞或覆盖有盾鳞;每侧具有5-7个鳃裂分别开口于体外,或4个外被一膜质鳃盖;雄性的腹鳍里侧具有鳍脚;尾鳍呈歪尾型;肠具有螺旋瓣。软骨鱼类的生殖方式是体内受精,卵生、卵胎生或胎生。

无颌类



无颌总纲（学名:Agnatha）是脊索动物门下的一个总纲，包括现存的圆口纲（盲鳗和七鳃鳗）以及已灭绝的牙形石纲和各种甲胄鱼类（包括鳍甲鱼纲、花鳞鱼纲、缺甲鱼纲、盔甲鱼纲、茄甲鱼纲和骨甲鱼纲）。无颌纲动物是非常基群的脊椎动物，特点是口部没有颌骨，并且没有任何偶鳍，主要以滤食、寄生和食腐为生，有些种类会洄游。

大多数鱼类的嘴具有铰合的双颚，但是无颌总纲的所有物种都没有下颌。

间脑背面突出，有着结构类似眼睛的颅顶器。

属于此总纲的动物演化历史已有五亿二千万多年，是迄今所知地层中最早出现的和最原始的脊椎动物。当中能存活至今的只剩圆口纲下的盲鳗亚纲和七鳃鳗亚纲。

沟鳞鱼



生活于泥盆纪沿海和河道口的一种盾皮鱼类，身体前部有一个六边形的头盾，口小，位于腹面，胸鳍分为两节，中间有关节相连。后部是一个体盾，并有一对像蟹脚的附肢。在其咽部有着沿腹中线向背外侧扩展的成对的囊状结构。它们的头部、躯干部和胸鳍覆盖着由多块甲片组成的骨甲，躯干部的甲片特别发达，好象由一只骨片做成的匣子套在鱼体的外面。头部和胸部的外面，套着一个和蟹壳有些相像的小壳。这个小壳是由许多块小骨板合成的，上面有弯曲的细沟。沟鳞鱼没有真正的鳍，仅在胸部长有一对套着硬壳的“翅膀”。

沟鳞鱼的躯干后部是裸露的，身体前部被包裹在骨质甲片里；头甲六边形，具有“V”字形的感觉沟。有些沟鳞鱼化石还保留着软体部分的印模，科学家通过这些印模发现，它的食道两侧有一对与咽喉相通的气囊，很可能是具有呼吸功能的雏形的肺。这样的构造在早期的一些硬骨鱼类中也曾发现，因此科学家推测，肺在脊椎动物起源时就存在，只是在后来的一些鱼形脊椎动物动物中发生了次生性退化。



雀鳝

雀鳝科(学名:Lepisosteidae)又名鳞骨科,是雀鳝目(Lepisosteiformes; 又名鳞骨目)的唯一一科,属于辐鳍鱼纲新鳍亚纲全骨下纲,现存只有2属7种,都生活在北美洲和加勒比海岛屿的淡水中。雀鳝目是新鳍亚纲的基群之一,是弓鳍鱼目的姐妹群,化石可以追溯到侏罗纪时代。原产于北美洲。雀鳝是大型凶猛鱼类,肉食性。雀鳝肉可以食用,但内脏和卵有毒。

雀鳝目的短吻雀鳝等种类在1980年代后期作为观赏鱼引入中国后,开始流入天然水体,在一些地方对淡水渔业构成了一定危害。

Ganoine(硬鳞质)

硬鳞质(Ganoine 或 Ganoin)是辐鳍鱼纲鱼类鱼鳞、鱼头和鱼鳍上的闪亮的组织,常有许多层。包含一些杆状的磷灰盐结晶,只有少于5%的成分是有机物质。 现存的有硬鳞质的鱼类包括多鳍鱼和雀鳝,一些已灭绝物种也有硬鳞质。是硬鳞的主要组成部分。

硬鳞质是一种古老的结构,在许多基干类群中都有发现。常被认为是辐鳍鱼的共源性状,已灭绝的棘鱼纲鱼类也有硬鳞质。

硬鳞质被认为与脊椎动物的牙釉质同源, 亦或可能根本就是一种釉质。因为它含有类似牙釉蛋白的蛋白质,并含有同四足动物的牙釉质相同的矿物质。

雀鳝词条图中斑点雀鳝鳞片表面的闪光就是硬鳞质造成的。

第10巻
好評
発売中!
第10巻の
発売
発売

最近玩switch
手残党！
精灵五朵梅迪斯！
水族馆不会跳舞
吸烟室
大象房间的美女生活
姐姐梦想cosplay club
直到午休时间结束
便利店上夜班的小恶魔
开始当吸血鬼
大怪兽的冒险旅行
男朋友
求求
校园
恋爱
翻译：会想
·日语N2或同等水平；
·精良的文章表达能力。
校对：
·日语N1或同等水平；
·能发现翻译错误并适当润色。
校子：会想
·精通日本语；
·善于学习，有耐心修图。
图源：
提供技术支持；
或者可以提供先行扫图。
招募群：468138159
读者群：762072988
*组三次请来百合漫画
会收新人！会招翻译！
欢迎大佬莅临指导!!!